

Nya svenska Siphonaptera-fynd.

Af

Einar Wahlgren.

Till den förteckning öfver svenska loppor, jag förut (Ent. tidsk. 1907) meddelat, är jag nu i tillfälle att lägga ytterligare några nya arter jämte uppgifter om nya fyndorter eller värdjur för de redan kända. För flertalet af dessa bidrag har jag att tacka intendenten vid Göteborgs museum, d:r L. A. JÄGERSKIÖLD, som godhetsfullt lämnat mig de af muséets konservator, herr H. SKOOG, tillvaratagna arterna till bestämning.

Chaetopsylla trichosa KOH.

Funnen i Göteborgstrakten på gräfling, *Meles meles* L. Till denna art hör äfven den i min förutnämnda uppsats under namnet *Chaetopsylla vulpes* anförda loppan från gräfling från Grytstorp. När jag undersökte denna art (Arkiv f. zoologi 1903), hade jag icke kännedom om KOHAUTS samma år utgifna arbete, där han uppdelar *Chaetopsylla globiceps* (= *vulpes*) i tvenne arter.

Ctenocephalus canis KOL.

Arten, hvars egentliga värdjur är hunden, har vid Göteborg äfven träffats på räf, *Vulpes vulpes* L.

Ceratophyllus melis WALK.

Ett ex. på räf, *Vulpes vulpes* L., Göteborg. Ny för Sverige. Arten är förut känd från gräfling eller räf från Danmark, Finland, Tyskland, Holland och England.

Ceratophyllus sciurorum SCHR.

Utom från ekorre från Göteborg har jag erhållit arten från samma håll fångad på räf, *Vulpes vulpes* L. Lektor S. EKMAN har sändt mig ex. från Jönköpingstrakten och meddelar, att den äfven där är ytterst allmän på ekorrar. Man behöfver blott hålla handen ett par sekunder i hvilket ekorrbo som helst, så har man en eller annan krypande på handen, som den dock icke sticker. Jag har äfven erhållit arten från ekorre från Orust i Bohuslän af studeranden E. KLEFBECK.

Ceratophyllus uralensis WAGN.

Utom på dess egentliga värddjur, ekorren, är denna art i Göteborgstrakten äfven träffad på tofsmes, *Parus cristatus* L., hvilket naturligtvis sammanhänger med att äfven tofsmesen bygger i trädhål.

Ceratophyllus hirundinis CURT.

Funnen på hussvala, *Hirundo urbica* L. Ny för Sverige. Artan är förut känd från hus- och ladusvala i Tyskland, Ryssland, England och Holland.

Ceratophyllus columbæ GERV.

En ♀ funnen på tamdufva, *Columba livia* L., i Malmö hör säkerligen till denna art (♀-ex. äro svåra att med full säkerhet skilja från följande art). Ny för Sverige. Den är förut känd från tamdufvor i Tyskland, England och Holland.

Ceratophyllus gallinæ SCHR.

Träffad i stor mängd på kycklingar, *Gallus gallus* L., i Vickleby, Öland.

Ceratophyllus vagabundus BOH.

Flera ex. af denna art äro af konservator SKOOG funna i bo af jaktfalk, *Falco rusticolus* L., från Nopakte i Lule lappmark. Den är förut blott uppgifven från Spetsbergen, där den anträffats på Spetsbergsgåsen. Emellertid hör säkerligen till samma art den af mig uppställda *C. monedulæ* från kaja.¹

Ceratophyllus styx ROTSCH.

Af denna art har jag af lektor G. ADLERZ erhållit talrika ex. från backsvala, *Clivicola riparia* L., från Mogata socken i Östergötland. Lektor ADLERZ meddelar, att de i mängd kröpo omkring i sanden till ett tiotal cm. från ingången till bona, och att, om man närmade handen till dem, de alla samtidigt, liksom på kommando, hoppade upp på densamma, som de emellertid strax lämnade igen.

Ctenophthalmus agyrtoides WAHLGR.

Funnen på skogsmus, *Mus sylvaticus* L., Göteborgstrakten. Arten är förut blott känd från fjällemmel från Norge,

Hystrihopsylla talpæ CURT.

Träffad på åkersork, *Microtus agrestis* L., i Jämtland af G. ADLERZ.

¹ *Ceratophyllus monedulæ* WAHLGR. scheint mit *C. vagabundus* BOH. identisch zu sein. Der männliche Haftapparat der ersteren Art hat nicht immer die schlanke Form wie auf der Figur in Ent. Tidskr. 1907, p. 91, sondern ist mit demjenigen von *C. vagabundus* ganz übereinstimmend.