

Anteckningar om några fynd af Parasitsteklar under 1911 och 1912.

(Syd-Halland och s. ö. Östergötland.)

H. Nordenström.

Några för Sverige sannolikt nya fynd torde först böra omnämnas, nämligen bland *Pimplariae*: *Acenitus dubitator* (PANZ.), ♀, Hall., Karup, 23. 6. 1912, vid buskar, i en trädgård (i flykten); l. 12 mm., en prydlig art med abdomen tecknad i rött, svart och hvitt, karakteriserad från närstående af de svaga parapsiderna, terebrans läng, pikturen af abdomen m. m., enl. SCHMIEDEKNECHT, som upptager arten i ett särskildt subgenus *Acenitus* s. str.), »in Süd- u. hie und da in Mittel-Europa, überall selten». — Bland *Tryphonidae*: *Eclytus praeclarus* (SCHMIED.), ♂, Hall., Hasslöf, Dömostorp, 25. 7. 1911; större art (10 mm.), hufvud mycket stort och bredt, metanoti parapsider fullständiga, areola alar. väl utvecklad; stigma stort, mörkt; utom den ljusa pikturen å hufvud, thorax, abdom-segm:s bakkanter och sidor äfven skutell och postskutell hvitgula. — *Saotis nigriventris* (THOMS.), ♀ (determ. A. ROMAN), Ög., St. Lars, 17. 6. 1911, buskmark, i flykten; enligt THOMS. funnen i Tyskland. — *Prometheus scutellaris* (BRIDGM.), ♀, Hall., Skummeslöf, stränderna af Stensån, 12. 8. 1911; enligt THOMS. funnen i Tyskland och England.

Tvenne för Sverige sannolikt nya *Hemiteles*-arter: *H. palpator* (GRAV.), ♂, Hall., Karup, 19. 7. 1908 och *H. limbatus* (GRAV.), ♂, Hall., Karup, strandskogen vid hafvet 27. 7. 1907, enligt SCHMIED. funnen i Tyskland, stämma fullständigt med hans beskrifning (Opusc. p. 855 o. 823), upptagas dock med reservation, då bestämningen af hannarna i detta släkte är mer eller mindre vanskelig, särdeles då honan ej blifvit funnen.

Bland mera sällsynta följande: *Ichneumonidæ*: *Amblyteles indocilis* (MESM.), ♀, Ög., S:t Lars 12. 12. 1911, under mossa på stenar; enl. THOMS. sällsynt i mellersta och södra Sverige. *Celichneumon biannulatus* (GRAV.), ♂, Ög., Kärna; utkläckt 29. 5. 1911 ur fjärilpuppa tagen 3. 5. 1911; sällsynt i södra och mellersta Sverige enligt THOMS. *Orotylus mitis* (GRAV.) ♂ Hall., Hasslöf, 29. 7. 1911. *Gnathoxys (Stenodontus) marginellus* (GRAV.), ♂, Hall., Hasslöf, 26. 7. 1911.

Cryptidæ: *Nematopodius formosus* (GRAV.), ♀, Hall., Karup, på samma ställe som *Acænitus dubitator*; mig veterligt ej beskrifven i sv. faunistiska arbeten, men af D:r ROMAN meddelats, att den af honom funnits i Uppsalatrakten, dessutom af THOMS. i Skåne och D:r HAGLUND i Östergötland. *Brachycryptus fusciventris* (THOMS.), ♂, nu äfven funnen i Ög. S:t Lars 17. 6. 1911, förut vid Kulla-Gunnarstorp, Skåne, 1908; enl. THOMS. vid Esperöd i Skåne och i Danmark.

Tryphonidæ: *Syndipnus atricornis* (THOMS.), ♂, Ög. och Hall., 1911, enl. THOMS. antagligen identisk med *Trematopygus varius* (HOLMGR.), funnen i Lappland. *Syndipnus punctiscuta* (THOMS.) (= *S. lateralis* (GRAV.), ♀, Ög. och Hall.; ♂, Ög. på kärmark; THOMS.: »Sk. Ilstorp; Tyskland.» *Mesoleptus Holmgreni* (THOMSON), ♀, (= *M. neglectus* (HOLMGR.), Hall., Hasslöf, juli 1911 o. 1912; THOMS.: »Sk.: Pålsjö.» *Delotomus laticeps* (GRAV.), ♀, Hall., Hasslöf, juli 1911 o. 1912. *Zootrephus rufiventris* (GRAV.), ♀, Hall., Karup, 8. 8. 1911, enligt THOMS. ett ex. funnet vid Ringsjön i Sk.

Pimplariæ: *Theronia levigata* (TSCHEH.), ♀, Ög. Bjärka 8. 9. 1912; förut en gång funnen i Sverige af D:r A. ROMAN (E. T. 1904 p. 118).