

*Chortophila discreta* MG. (*Aricia trapezoides*) Stockholm, Lidingön <sup>29</sup>/<sub>7</sub> 06.

*Chortophila dissecta* MG. Ny för Sverige. Skåne, Värpinge <sup>19</sup>/<sub>7</sub> 04, Falsterbo <sup>20</sup>/<sub>7</sub> 04; Öland, södra alvaret <sup>15</sup>/<sub>6</sub> 08.

*Chortophila intersecta* MG. Ny för Sverige. Härnösands-trakten: Gådeå <sup>12</sup>/<sub>6</sub> 09.

*Chortophila latipennis* ZETT. (*Aricia*). Stockholmstrakten: Ulriksdal <sup>12</sup>/<sub>8</sub> 06.

*Chortophila longula* FALL. (*Aricia l.* + *A. punctiventris*). Öland, Södra alvaret <sup>29</sup>/<sub>6</sub> 08.

*Lasiops Roederi* KOW. Ny för Sverige. Härnösand, gran-skog <sup>23</sup>/<sub>8</sub>, 08, <sup>29</sup>/<sub>8</sub> 09.

*Coenosia lineatipes* ZETT. (*Anthomyza*). Kalmar, tallskog <sup>19</sup>/<sub>6</sub> 04.

*Coenosia longicauda* ZETT. (*Aricia*). Skåne, Bökeberg <sup>13</sup>/<sub>7</sub> 04; Kalmar <sup>1</sup>/<sub>7</sub> 04.

*Coenosia pygmaea* ZETT. (*Anthomyza*). Kalmar, tallskog <sup>12</sup>/<sub>7</sub> 03.

*Coenosia rufipalpis* MG. Ny för Sverige. Stockholmstrakten: Experimentalfältet <sup>12</sup>/<sub>7</sub> 06. Bergianska trädgården <sup>30</sup>/<sub>7</sub> 03.

Einar Wahlgren.

**Nya fyndorter för några svenska fjärilar.** Ur studeranden vid Kgl. Skogsinstitutet EFR. WRETLINDS insamling sistlidne sommar torde förtjäna att antecknas:

*Pamphila silvius* KNOCH. Vstm. Bjurfors (nära Avesta), (äfven träffad 1907 af oss i Dal. vid Säter). — *Odontosia carmelita* ESP. Jmtl. Bispgården. — *Agrotis sobrina* GN. Dal. Söderbärke. — *Plusia microgamma* HB. Vstm. Djurfors. — *Helotropha leucostigma* HB. Dal. Söderbärke. — *Lobophora virotata* HB. Sthlm Öfverjärva, Vstm. Bjurfors. — *Psyche Standfussi* HS. 3 ♂-larvhus med lefvande puppor, anträffade å kullfallna träd-stammar i Lidens-Bodas kronopark i Mpd. (nära Bispgården), öfverlämnades till undertecknad och gifvo fjärilar <sup>24</sup>/<sub>6</sub>.

**Rättelse.** I Entom. Tidskrift 1912, h. 1—2, sid. 131 å notis om *Psyche hirsutella* HB. står på 4:de raden tryckfelet kantig i st. f. *hanlig* (kokong).

E. G. Wretlind.

**Notiser angående Hemiptera.** — Under exkursioner i Uppsalatrakten ha gjorts en del fynd af hemipterer och bland dem äfven några af allännare intresse. Här må endast anföras några ur utbredningssynpunkt anmärkningsvärda förekomster af arter, som förut ej påträffats i Uppland.

**Fam. Corisida:** Af *Macrocorisa geoffroyi* LEACH. ha ett par exemplar erhållits i en torfdamm vid Uppsala. — Af *Callicorisa socia* DOUGL. & SCOTT har ett exemplar funnits vid Uppsala. Af

WALLENGREN uppgifven blott för södra och västa Sverige. — *Corisa sahlbergi* FIEB. är den vanligaste corisiden i trakten af Uppsala. Vidare böra anmärkas fynd af de sällsyntare *limitata* FIEB., *semistriata* FIEB. och *fabricii* FIEB.

*Fam. Capsidæ: Calocoris roseomaculatus* DEGEER förekommer i Vassunda socken, Uppland. — *Pycnopterna striata* L. är ganska allmän på samma lokal.

*Fam. Hydrometridæ: Af Gerris aspera* FIEB. äro några exemplar tagna vid Uppsala. — I åtskilliga dammar förekommer där i stor mängd äfven *Mibrovelia schneideri* SCHOLZ, som enligt REUTER förut blott är funnen vid Lund.

*Fam. Reduviidæ: Reduvius annulatus* L. träffas ej så sällsynt i Vassunda, Uppland. — Af *Opsicetus personatus* L., hvilken förut är känd från Gottland och Stockholm, är ett exemplar erhållet i Uppsalatrakten.

*Fam. Lygæidæ: Berytus clavipes* FABR. träffas sällsynt i Vassunda. — *Scolopostethus affinis* SCHILL. förekommer som föregående art. — *Gastrodes abietis* L. träffas ej så sällsynt vid Uppsala om våren i öfvervintrande exemplar. — *Pterometus staphylinoides* BURM. finnes vid Uppsala, men är mycket sällsynt. — *Trapezonotus anorus* FLOR är däremot talrikt förekommande, särskildt i skogsbyn och ljungbackar bland mossa.

*Fam. Coreidæ: Rhopalis capitatus* FABR. och *parumpunctatus* SCHILL. äro båda erhållna i Vassunda socken, ehuru sparsamt.

*Fam. Pentatomidæ: Tritomegas bicolor* L. är funnen sällsynt vid Sigtuna och Vassunda. — Af *Eurygaster maurus* L. är ett exemplar taget i Uppsalatrakten. — *Carpocoris nigricornis* FABR. är på samma lokal synnerligen allmän öfverallt. — *Cimex bidens* L. träffas sparsamt i Uppsalatrakten.

O. Lundblad.

*Platypsyllus castoris* RITS. fandt jeg i 3 eksemplar, to levende og et dødt paa bæver (*Castor fiber*) skudt ved Risør 11:te juni iaar.

H. Warloe.

**Egendomlig varietet af *Chrysomela lapponica* L. —** Undertecknad erhöill i fjol i en sändning coleoptera insamlade i Kwickjocks Lappmark bl. a. ett exemplar af *Chrysomela lapponica* L., som till sin färgteckning betydligt afviker från denna art. I THOMSON: Skandinavians Coleoptera upptagas 3:ne varieteter, men beskrifningarna på dessa passa icke in på det anträffade exemplaret. Från hufvudformen skiljer sig detsamma därigenom, att elytras blåbronserade tvärband saknas, skulderfläcken samt