

WALLENGREN uppgifven blott för södra och västa Sverige. — *Corisa sahlbergi* FIEB. är den vanligaste corisiden i trakten af Uppsala. Vidare böra anmärkas fynd af de sällsyntare *limitata* FIEB., *semistriata* FIEB. och *fabricii* FIEB.

*Fam. Capsidæ: Calocoris roseomaculatus* DEGEER förekommer i Vassunda socken, Uppland. — *Pycnopterna striata* L. är ganska allmän på samma lokal.

*Fam. Hydrometridæ: Af Gerris aspera* FIEB. äro några exemplar tagna vid Uppsala. — I åtskilliga dammar förekommer där i stor mängd äfven *Mibrovelia schneideri* SCHOLZ, som enligt REUTER förut blott är funnen vid Lund.

*Fam. Reduviidæ: Reduvius annulatus* L. träffas ej så sällsynt i Vassunda, Uppland. — Af *Opsicetus personatus* L., hvilken förut är känd från Gottland och Stockholm, är ett exemplar erhållet i Uppsalatrakten.

*Fam. Lygæidæ: Berytus clavipes* FABR. träffas sällsynt i Vassunda. — *Scolopostethus affinis* SCHILL. förekommer som föregående art. — *Gastrodes abietis* L. träffas ej så sällsynt vid Uppsala om våren i öfvervintrande exemplar. — *Pterometus staphylinoides* BURM. finnes vid Uppsala, men är mycket sällsynt. — *Trapezonotus anorus* FLOR är däremot talrikt förekommande, särskildt i skogsbyn och ljungbackar bland mossa.

*Fam. Coreidæ: Rhopalis capitatus* FABR. och *parumpunctatis* SCHILL. äro båda erhållna i Vassunda socken, ehuru sparsamt.

*Fam. Pentatomidæ: Tritomegas bicolor* L. är funnen sällsynt vid Sigtuna och Vassunda. — Af *Eurygaster maurus* L. är ett exemplar taget i Uppsalatrakten. — *Carpocoris nigricornis* FABR. är på samma lokal synnerligen allmän öfverallt. — *Cimex bidens* L. träffas sparsamt i Uppsalatrakten.

O. Lundblad.

*Platypsyllus castoris* RITS. fandt jeg i 3 eksemplar, to levende og et dødt paa bæver (*Castor fiber*) skudt ved Risør 11:te juni iaar.

H. Warloe.

**Egendomlig varietet af *Chrysomela lapponica* L. —** Undertecknad erhöill i fjol i en sändning coleoptera insamlade i Kwickjocks Lappmark bl. a. ett exemplar af *Chrysomela lapponica* L., som till sin färgteckning betydligt afviker från denna art. I THOMSON: Skandinavians Coleoptera upptagas 3:ne varieteter, men beskrifningarna på dessa passa icke in på det anträffade exemplaret. Från hufvudformen skiljer sig detsamma därigenom, att elytras blåbronserade tvärband saknas, skulderfläcken samt