

Några fynd af Coleoptera.

Af

G. A. Ringselle.

Åtskilliga år ha gått, sedan undertecknad lämnade lokal-uppgifter till öfverste GRILLS förträffliga, för hvarje coleoptersamlare outhärliga *Catalogus Coleopterorum* etc. Jag har fortfarande haft den turen att ehuru blott amatör på området göra åtskilliga fynd, som torde kunna förtjäna meddelas i vår tidskrift. I allmänhet har jag i det följande endast nedskrivit anteckningar om fynd utanför det förut kända utbredningsområdet, men har dock, när det gällt mera sällsynta former, antecknat dessas fyndorter äfven inom landskap, från hvilka de förut varit kända.

För att slippa upprepa provins och socken onödigtvis ofta har jag i fråga om mina fynd i Uppland, Vällnora i Knutby och Bennebol i Bladåker, endast angifvit resp. V. och B. Dessa båda nedlagda järnbruk ligga på $\frac{1}{8}$ mils afstand från hvarandra. Sommaren 1902 vistades jag vid Bennebol och besökte trakten sedermera under kortare tider af 1903 och 1906. Somrarne 1910, 1911 och 1912 tillbragte jag vid Vällnora, 1910 med understöd af Vetenskapsakademien och alla tre somrarne med understöd (fri bostad) af öfverste GRILL.

Vid upprättandet af fynden etc. har jag följt GRILLS »*Catalogus*», hvarför jag ej anser nödigt utsätta auktorsnamn.

Cicindela maritima: ymnig vid hafsstranden i Stafsinge s:n (Arvidstorp) i Hall.

Calosoma auropunctatum: Hall., Arvidstorp i Stafsinge.

Pelophila borealis: Morastrand i Dlr.

- Nebria livida*: Vänersborg; Dahlsgård i Alfshög (HI),
N. brevicollis: Vänersborg; Äsplunda i Nerike.
N. Gyllenhali: Dlr.: Backa vid Hedemora (ymnig).
N. nivalis: Nära Riksgränsens station i Lappland.
Dyschirius æneus: Hedemora.
Panagæus quadripustulatus: Ner. (Äsplunda).
Lebia cyanocephala: Uppsala.
Dromius marginellus: Arvika; Hedemora.
D. nigriventris: Uppl.
Trechus discus: Hall.; Ner. (Örebro samt Nedergårda i Glanshammar).
T. obtusus: Falkenberg.
T. secalis: Hedemora.
Bembidium argenteolum: Morastrand i Dlr. (Äran af detta fynd tillkommer dock min följeslagare, kassör J. E. SANDIN från Göteborg).
B. varium: Hedemora.
B. femoratum: Hedemora och Mora.
B. pallidipenne: Falkenbergstrakten, flerstädes vid hafstrand.
B. gilvipes: Hedemora.
Stomis pumicatus: Dalarne.
Pocilus lepidus: har jag endast funnit i Halland.
Pterostichus minor: Dalarne; Uppland.
Amara aulica: Bennebol.
A. convexiuscula: Stockholms skärgård: Runmarö (ERIK HAHR).
A. municipalis: Falkenberg.
A. familiaris: Bennebol.
A. ænea: Hedemora.
Sphodrus leucophthalmus: Skrea prästgårds ladugård i Halland tillsammans med *Læmostenus terricola* och *Blaps similis*.
Anchomenus longiventris MANNH.: 1 ex. vid Brunna nära Hedemora, bestämd af J. E. SANDIN, i hvars ägo det befinner sig.
A. viduus v. moestus: Hedemora.
Brosicus cephalotes: Hedemora.
Anisodactylus binotatus: Hedemora; Arvika.
Harpalus tardus: Hedemora.

- Stenolophus dorsalis*: Arvika.
St. flavicollis: Arvika.
Chlœnius nigricornis: Hedemora; Arvika.
Macrodytes lapponicus: Halland, »Falkagårdssjö» vid Falkenberg.
Gaurodytes chalconotus: Mora.
Philydrus testaceus: Arvika.
Helophorus aquaticus: Arvika.
Hydrochus elongatus: Arvika.
H. brevis och *carinatus*: Skytteholm på Ekerön i Mälaren.
Trichoderma pubescens: Halland, flere lokaler (Falkenberg, Hjärtared, Sibbarp, Vinberg).
Ocytus ophthalmicus: Uppl.: mellan Vällnora och Bennebol, således långt från kusten.
O. œneocephalus: Falkenberg.
Philonthus concinnus: Hedemora.
Velleius dilatatus: Halland; Äspenäs i Ullared.
Othius fulvipennis: Växjö.
Xantholinus tricolor: Arvika.
Stenus guttula: Falkenberg.
Pæderus riparius: Bennebol.
Dinarda dentata: Örebro, (hos *Formica exsecta*).
Hesperophilus arenarius: Falkenberg.
Oxyporus rufus: Dlr: Brunnaön vid Hedemora.
Tachyporus abdominalis: Falkenberg.
T. hypnorum: Hedemora.
T. solutus: Hedemora.
Tachinus subterraneus: Gate vid Arvika.
Bryocharis analis: Arvika.
Br. cingulata: Vänersborg.
Geodromicus pagiatus: Arvika.
Bryaxis sanguinea: Skytteholm på Ekerön.
Necrophorus humator: Falkenberg, på död igelkott.
Silpha undata: Vänersborg.
 » *quadripunctata*: Smål. (Ingelstad, HUGO ANDERSSON).
Sciodrepa fumata: Uppl.: Björkö i Knutby; Arvika.
Scaphidium quadrimaculatum: Halland, Äspenäs i Ullared s:n.
Ips ferrugineus: Arvika.

- Omosita Colon*: Hedemora.
O. discoidea: Falkenberg.
Cryptarcha strigata: Falkenberg.
Peltis grossa: Bennebol och Vällnora.
Dermestes lanarius: Vällnora på skatkadaver; Falkenberg.
Ctesias serra: Vällnora; Hedemora.
Hister succicola: Arvika (vid Gate).
Cetonia marmorata: Bennebol och Vällnora; Lennäs s:n i Nerike.
Melolontha vulgaris: Gottl. sälls. (ARNBERG).
Psammodius sulcicollis: Falkenberg.
Aegialia sabuleti: Falkenberg.
Lucanus Cervus: Uppl.: Rungarn (förvaltare ÖSTMAN); numera finns den ej där.
Cucujus cinnabarinus: Bennebol och Vällnora under barken på döda aspar och ekar.
Silvanus surinamensis: Rotebro jästfabrik i Uppland.
S. bidentatus: Arvika.
S. unidentatus: Arvika!
Trogosita mauritanica: Rotebro jästfabrik.
Niptus hololeucus: Falkenberg.
Anobium paniceum: Hedemora.
Sphindus hispidus: Arvika.
Telmatophilus caricis: Arvika.
T. Schönherri: Norrsjön och Vällnora (på *Typha angustifolia*).
Triplax russica: Arvika.
Mycetina cruciata: Ekdalen vid Bennebol.
Mycetophagus quadripustulata: Arvika.
Poecilnota variolosa: Bennebol (1 ex. vid Ekdalen 1902, borttät tjoget 1912).
Chrysobothrys chrysostigma: Bennebol, Vällnora och Rungarn i Knutby.
Chr. affinis: Bennebol.
Melanophila acuminata: Krylbo i Dlr; Ingelstad i Smål. (HUGO ANDERSSON).
M. cyanea: Bennebol (endast 1906).
Agrilus betuleti: Vällnora, Arvika.

- Throscus carinifrons*: Arvika.
Corymbites nigricornis: Arvika.
C. cruciatus: Hedemora; Mora.
Athous undulatus: Vällnora.
A. subfuscus: Arvika; Hedemora.
Elater cinnabarinus: Värml.: Fiskevik i Jösse-Ny.
Cryptohypnus (Negastrius) pulchellus v. arenicola: Falkenberg.
C. quadriguttatus: Arvika.
Cardiophorus ruficollis: Hedemora.
C. ebeninus: Hedemora.
C. cinereus: Falkenberg.
Dolichosoma lineare: Hedemora.
Malachius viridis: Vänersborg.
Anthocomus fasciatus: Vällnora.
Tillus elongatus: Falkenberg; Vällnora; Hedemora.
Clerus rufipes: Falkenberg, Arvika, Hedemora, dock endast 1 ex. från hvarje lokal.
Opilo mollis: Halland; Kumla i Nerike.
Corynetes coeruleus: Falkenberg.
Hylecoetus dermestoides: Dylta bruk i Ner.; Arvika.
Blaps similis: Falkenberg i källare; Skrea prästgårds ladugård i Hall. (i hundratals).
Microzoum tibiale: Falkenberg.
Uloma culinaria: Hertings såg vid Falkenberg.
Hoplocephala hæmorrhoidalis: Bennebol.
Hypophloeus castaneus: Halland.
H. bicolor: Vällnora.
H. linearis: Arvika.
Allecula morio: Björkönen i Hjälmarén.
Mycetochara flavipes: Bennebol och Vällnora.
M. bipustulata: Vällnora (1 ex.).
Cistela ceramboides: Bennebol och Vällnora.
Eryx ater: Hall.: Äspenäs i Ullared.
Mordella fasciata: Bennebol.
M. maculosa: Bennebol; Arvika; Ramstena i Ringkarleby s:n, Nerike.
Abdera affinis: Arvika.
Xylita lævigata: Småland; Nerike; Hedemora; Arvika.

Hapalus bimaculatus: återfunnen vid Uppsala af ROMAN.

Calopus serraticornis: Bennebol; Ner.: Örebro och Dylta.

Oedemera flavipes: Särö i Halland.

Notoxus monoceros: Hedemora.

Anthicus floralis: Hedemora.

A. bimaculatus: Falkenberg (Stafsinge).

Bruchus atomarius: Arvika.

Platyrhinus resinosus: Hall.: Sjö i Ullared.

Tropideres undulatus: Ner.: Ryninge vid Örebro.

Rhinomacer attelaboides: Dalarne: Kullsveden. J. E. SANDIN fann den först.

(*Apoderus Coryli*: Arvika).

Attelabus nitens: Falkenberg.

Rhynchites cupreus: Arvika.

Apion sanguineum: Arvika.

Sitona hispidulus: Falkenberg.

Polydrusus flavipes: Arvika, nära Kattviken.

P. cervinus: Hedemora.

Phyllobius pyri: Hedemora.

Ph. argentatus: Hedemora.

Ph. maculicornis: Hedemora.

Otiorrhynchus scaber: Hedemora.

O. raucus: Hedemora.

O. rugifrons: Bennebol.

Brachysomus echinatus: Vällnora på smultron.

Lepyryrus capucinus: Falkenbergstrakten (Arvidstorp).

Hylobius pineti: Vg.: Älfsered nära Hallandsgränsen.

Cleonus fasciatus: Falkenberg i spergelåkrar.

C. glaucus: Falkenberg.

Hydronomus Alismatis: Arvika (Kattviken).

Tanysphyrus lemnæ: Arvika (Kattviken); Hedemora.

Erirhinus acridulus: Arvika; Hedemora.

E. scirrhosus: Arvika (Kattviken).

Balaninus nucum: Hall.: Äspenäs i Ullared (ymnig); an-norstädes förgäfves eftersökt.

B. cerasorum: Särö i Hall.

Orchestes quercus: Halland (Särö).

Anthonomus pubescens: Hedemora.

A. varians: Hedemora (stadsberget på vedupplag).

Rhyncolus turbatus: Vällnora.

Dendroctonus micus: Arvika.

Tomicus dispar: Äspenäs i Ullared (Hall.), äfven ♂♂.

Scolytes destructor: Vällnora; Arvika.

Callidium coriaceum: Bennebol och Vällnora.

Clytus mysticus: Borgholms slott (på blommande oxel).

Cl. pantherinus: Bennebol 1902. Enda ex. af denna art, som hittills påträffats i Sverige. Uppträdde tillsammans med *rusticus*. Under somrarne 1910—12 insamlades flera hundra *rusticus*, men intet nytt ex. af *pantherinus*. Exemplaret är öfverlämnadt åt Riksmuseum.

Cl. arcuatus: Bennebol och Vällnora.

Cl. detritus: likaså. Dessa båda arter träffades på ekvedkastar under soliga dagar.

Necydalis major: Bennebol och Vällnora.

Pachyta Lamed: Särna i Dlr.; Arvika; Bennebol och Vällnora.

Acmæops marginata: Morastrand.

Cartodera femorata: Arvika.

Leptura sexguttata: Bennebol.

L. sexmaculata: Bennebol.

L. nigripes: Bennebol.

L. maculata: Uppl.: ön Yxlan i skärgården 1908.

L. melanura: Dlr.

Acanthocinus griseus: Bennebol.

Liopus nebulosus: Bennebol.

Liopus punctulatus, hvars förekomst i Sverige betviflats, har af mig i två exemplar påträffats vid Bennebol 1902. Vintern förut hade afverkats diverse ädla löfträd, bl. a. lind, på hvilket trädslag detta djur påträffades.

Acanthoderes clavipes: Bennebol och Vällnora.

Monochammus sartor: Bennebol 1902, flere exemplar. Ej återfunnen de senare åren.

Saperda phoca: Arvika.

Saperda perforata: Bennebol och Vällnora (hvarje år något eller några exemplar).

Tetrops præusta: Arvika.

Oberea oculata: Arvika (flera ex.); Dlr.: Mora (Kommissioner K. G. SKOGLUND).

Donacia cinerea: Vällskärret och Norrsjön i Uppl. (på *Typha* ymnig).

D. vulgaris: Arvika.

D. limbata: Vällskärret och Vällnora (på *Sparganium*).

D. bicolora: Arvika (Kattviken, ymnig på *Sparganium*).

Hæmonia mutica: Falkenberg.

Orsodacna cerasi: Hunneberg.

Agelastica halensis: Skåne, mellan Landskrona och Helsingborg på *Picris hieracioides*.

Phyllobrotica quadrimaculata: Arvika.

Luperus longicornis: Arvika; Lima i Dalarne.

L. flavipes: Arvika.

Aphthona coerulea: Arvika.

Sphæroderma cardui: Nerike.

Crepidodera ferruginea: Hedemora.

C. rufipes: Bennebol.

Mantura rustica: Arvika.

Psylliodes hyoscyami: Falkenberg.

Chrysomela sanguinolenta: Falkenberg.

Lina cuprea: Arvika.

L. lapponica: Arvika.

L. saliceti: Arvika (Uppträdde endast på asparnes rot-skott).

Clytra tridentata: Arvika.

Cryptocephalus distinguendus: Arvika.

C. nitidus: Arvika.

C. coerulescens: Arvika (ymnig).

C. pallifrons: Arvika (1 ex.).

Cassida rubiginosa: Vänersborg.

Hippodamia tredecimpunctata: Hedemora.

Halysia ocellata: Arvika.

H. vigintiduopunctata: Arvika.

H. conglobata: Arvika.

H. quatuordecimpustulata: Vänersborg; Uppsala; Arvika; Hedemora.

Cynegetis impunctata: Falkenberg.

Chilocorus renipustulatus: Arvika; Mora.