

- Chrysomela haemoptera* L. — Gbg: Askim.
 » *sanguinolenta* L. — Hl.: Falkenberg.
Cryptocephalus IV-pustulatus GYLL. — Boh.: Orust.
 » *exoletus* DE G. — Boh.: Orust.
Coccidula rufa HERBST. — Uppsala.
 » *scutellata* HERBST. — Sdml.: Strängnäs.
Micraspis XII-punctata L. — Gbgs skärgård.
Cynegetis impunctata L. — Gbgs skärgård.
Scymnus suturalis THUNB. — Uppsala.

Lepidoptera.

- Mamestra dentina* var. *Latenai* PIERR. — Vg.: Hindås.
Dianthecia proxima HÜBN. — Boh.: Orust.
Himera pennaria L. — Uppsala, allmänt flygande kring
 lyktorna t. ex. i Engelska parken 1900—1910.
Phigalia pedaria FABR. — Uppsala, $\frac{3}{5}$ 1909 ett ex.

Diptera.

- Eristalis pertinax* SCOP. — Sthlm: Bergianska tr.; Uppl.:
 Linnés Hammarby, Uppsala.

Hymenoptera.

- Bombus derhamellus* KIRB. — Boh.: Orust; Stockholm.
Ammophila affinis KIRB. — Gtl.: Ljugarn.

Einar Klefbeck.

Tre sällsynta fjärilar från Jämtland. — Under min vistelse i Sunne socken i Jämtland sommaren 1911 påträffade jag följande tre, för nämnda landskap sällsynta fjärilar: *Hepialus humuli*, *Agrotis cuprea* och *Plusia macrogamma*, hvilka fynd äro värda att antecknas. Den sistnämnda fjärilen är ju för öfrigt endast funnen å få ställen i Skandinavien.

Andor Lundström.

Sorgmantelns, vinbärsfuksens och amiralens förekomst i Hernösandstrakten 1912. — Som bekant uppträda de flesta arter af *Vanessa*-släktet i olika talrikhet under olika år. Så har *V. antiopa* i år förekommit allmänt i aug. och sept., hvaremot den föregående sommar ej alls var synlig; äfvenså flera somrar förut. (Den 13 juni påträffades tvenne exemplar i Viksjö socken.) *V. c-album* har äfven förekommit i ovanlig talrikhet, och den 1 sept. infångades en *V. atalanta*, hvilken art ej förut är känd från Ångermanland.¹

Löfudden, Hernösand d. 20 dec. 1912.

Andor Lundström.

¹ Jfr sid. 22 d. å. — Red.