

fyndorter för Diptera.

Av

O. Ringdahl.

I det följande har undertecknad sammanställt en del lokaluppgifter för ett antal tvåvingar, tillhörande familjerna Stratiomyidæ, Xylophagidæ, Tabanidæ, Leptididæ, Asilidæ, Bombylidæ, Therevidæ, Empididæ, Dolichopodidæ och Syrphidæ. Somliga av de upptagna arterna äro mer eller mindre sällsynta. Åtskilliga av dem äro ej förut kända från Skåne. Såsom nya för vårt land kan jag förmodligen beteckna följande 15: *Tabanus Mühlfeldi* BRAUER, *Hilara quadrifaria* STROBL., *Hilara æronetha* MIK., *Dolichocephala guttata* HAL., *Tachydromia varia* WALK., *Tachytrechus insignis* STANN., *Chrysotus cupreus* MACQ., *Argyra confinis* ZETT., *Porphyrops spinicoxa* LW., *P. riparia* MG., *Xiphandrium auctum* LW., *Teuchophorus monacanthus* LW., *T. signatus* ZETT., *Criorrhina oxyacanthæ* MG. och *C. berberina* FABR. Samtliga fynden äro gjorda av undertecknad, de flesta kring Häl-singborg (Hbg) och Höganäs på Kullahalvön, många även vid Ringsjön i mellersta Skåne o. s. v.

Nemotelus nigrinus FALL. Höganäs ⁹/₆ 12.

» *pantherinus* L. Råå kärr invid havet, juni, juli.

» *uliginosus* L. Torekov ²⁰/₇ 12. På strandängar vid havet.

Oxycera Fallénii STÆG. Hbg. Jordbodalen vid ett källsprång ⁷/₈ 11.

» *formosa* MG. Råå ²¹/₇ 13.

- Stratiomyia potamida* MG. Ringsjön $\frac{4}{7}$ 10 på umbellatblommor.
Odontomyia argentata FABR. Av ZETTERSTEDT endast känd från Uppland. Arten uppträder om våren. Fångade denna art den 3 maj 13 vid ett litet skogskärr. ♂♂ svävade i luften likt *Chilosia*-arterna, ♀♀ suto på kärrväxter.
- Beris clavipes* L. Ringsjön $\frac{3}{6}$ 06.
- Xylophagus ater* MG. Söderåsen $\frac{14}{6}$ 09, Hbg i slutet av maj på stubbar.
- Tabanus Mühlfeldi* BRAUER. Ny för Sverige. Höganäs $\frac{13}{6}$ 12. Professor LUNDBECK, Köpenhamn, har välvilligt bestämt arten.
- » *sudeticus* ZELLER. I Svensk Insektfauna nämnd fr. Ög. Funnen vid Hbg $\frac{1}{8}$ 07 i en furuplantering samt vid Torekov $\frac{20}{7}$ 12.
- » *maculicornis* ZETT. Söderåsen $\frac{10}{7}$ 11, Ringsjön $\frac{12}{7}$ 12.
- » *cordiger* MG. Söderåsen $\frac{10}{7}$ 11.
- Chrysops sepulcralis* FABR. Hbg $\frac{16}{6}$ 10, Ringsjön $\frac{12}{7}$ 12.
- » *quadratus* MG. Torekov $\frac{20}{7}$ 12, Kristianstad $\frac{20}{7}$ 10.
- Leptis annulata* DEG. Skåne. Lokal?
- Chrysopilus nubecula* FALL. Ringsjön $\frac{12}{7}$ 12, Kristianstad $\frac{20}{7}$ 10. Arten skulle enligt ZETT. vara allmän. Jag har aldrig lyckats träffa den allmänt utan endast i enstaka ex.
- » *luteolus* FALL. Ringsjön $\frac{29}{6}$ 10.
- Symphoromyia crassicornis* PANZ. Torekov $\frac{10}{7}$ 08, Ringsjön $\frac{29}{6}$ 10. Tämmligen sällsynt i Skåne. I Undersåkersdalen i Jämtland fann jag förra året arten vara allmän. Den syntes dagligen i slutet av juni och början av juli på gärdesgårdar och buskar.
- Ptiolina obscura* FALL. Hbg i slutet av juni på stengärdesgård i skog; sällsynt.
- Leptogaster guttiventris* ZETT. Höganäs $\frac{2}{6}$ 11.
- Leptarthrus breviostris* MG. Ringsjön $\frac{2}{7}$ 10; sällsynt.
- Cyrtopogon lateralis* FALL. Hbg $\frac{6}{7}$ 07, $\frac{16}{6}$ 09, $\frac{22}{6}$ 12, Höganäs $\frac{4}{6}$ 13.

- Laphria flava* L. Söderåsen $16/6$ 08, $10/7$ 11, tämligen allmän; Åsljunga $18/8$.
- » *ephippium* FABR. Söderåsen $26/6$ 09, $10/7$ 11.
- Asilus crabroniformis* L. Bökeberg $8/9$ 07, Råå $9/8$ 10. Sällsynt.
- Rhadiurgus variabilis* ZETT. I Raus furuplantering söder om Hbg finnes arten ej så sällsynt under juni—aug. Även i östra Skåne vid Åhus har jag tagit den i en furuskog $28/7$ 10. Den sätter sig gärna på marken.
- Eutolmus rufibarbis* MG. I nv. Skåne under juli o. aug. ej allmän.
- Epitriptus cingulatus* FABR. Hbg $2/8$ 10 bland ljung; sällsynt.
- Anthrax fenestratus* FALL. Viken $21/7$ 11, Raus plantering $6/8$ 09; tämligen sällsynt.
- » *paniscus* ROSSI. Raus plantering $6/7$ — $1/9$; allmän.
- Bombylius major* L. Hbg $1/5$ 11, Kullaberg $7/5$ 11 på sälgblommor.
- » *minor* L. Ängelholm $31/7$ 13. Vid klitterna på *Thymus*.
- Phthiria pulicaria* MIKAN. Raus plantering $23/7$ 07. Förekom i stort antal på *Thymus*.
- Thereva subfasciata* SCHUM. Ej sällsynt kring Hbg och Höganäs. Det ser ut, som om vissa *Thereva*-arter hysa en viss kärlek till nässlor. Denna art har jag flera gånger fångat på *Urtica dioica*.
- » *bipunctata* MG. Hbg $3/8$ 07, Viken $21/7$ 11, Höganäs $24/7$ 13.
- Rhamphomyia nigripes* FABR. Tämligen allmän kring Hbg om våren.
- » *spissirostris* FALL. Viken $13/5$ 13, där arten svärmade talrikt ovan vattenytan vid en liten bäck.
- » *spinipes* FALL. Hbg 9 okt. 12; sällsynt.
- » *simplex* ZETT. På strandängar vid Skelder-viken $24/5$ 12; allmän. Råå $17/5$ 13.
- » *plumipes* FALL. Råå $17/5$ 13.
- » *dentipes* ZETT. Höganäs $23/5$ 12, Hbg $21/5$ 13; sällsynt.

- Rhamphomyia tibiella ZETT. Hbg $^{21/5}$ 13.
 » hybrida ZETT. Ängelholm $^{31/7}$ 13.
 Empis punctata MG. Ringsjön $^{3/6}$ 06, $^{12/7}$ 12.
 » nitida MG. Under hävning på en fuktig äng vid Råå-
 ån $^{25/5}$ 13.
 » aetiva L.W. Hbg $^{24/7}$ 12, Ängelholm $^{18/8}$ 12.
 » caudatula L.W. Höganäs $^{9/6}$ 12.
 Hilara clypeata MG. Råå $^{17/5}$ 13 på en fuktig äng.
 » quadrifaria STROBL. Ny för Sverige. Hbg $^{2/8}$ 13,
 1 ♂ 1 ♀.
 » nigrina FALL. Hbg $^{13/7}$ — $^{7/9}$ vid bäckar.
 » aëronetha MIK. Ny för Sverige. Denna den största
 av våra *Hilara*-arter, l. omkr. 6 mm., fann jag
 vid en uttorkad bäck i bokskog på Söderåsen
 den $^{10/7}$ 11, 2 ♂.
 » pubipes L.W. Ringsjön $^{12/7}$ 12.
 » Beckeri STROBL. Hbg i slutet av juli, Ringsjön $^{15/8}$ 13.
 » flavipes MG. Ringsjön $^{12/7}$ 12, $^{15/8}$ 13.
 Leptopeza flavipes MG. Hbg $^{24/5}$ 13.
 Clinocera stagnalis HAL. Höganäs 29 mars 11 vid en bäck,
 Hbg $^{25/5}$ 13.
 » Wesmaelii MACQ. Hbg 19 mars, 1 april; jordbo-
 dalen vid ett källsprång.
 » fontinalis HAL. Ängelholm $^{18/8}$ 12 vid en skogsbäck.
 Hemerodromia precatória FALL. Höganäs $^{13/6}$ 12 under häv-
 ning bland vegetationen vid en bäck.
 » raptoria MG. Råå $^{27/6}$ 12.
 Dolichocephala irrorata FALL. Hbg $^{4/8}$ 13.
 » guttata HAL. Ny för Sverige. Hbg $^{24/8}$ 13,
 1 ♂. Liknar föregående art men har färre
 klara fläckar på vingarna och har radial- och
 cubitalribborna ej vågiga.
 Gloma fuscipennis MG. Hbg $^{6/6}$ 11, $^{4/6}$ 13.
 Phyllodromia albisetä ZETT. Ängelholm $^{31/7}$ 13.
 Tachydromia varia WALK. Ny för Sverige. Hbg slutet av
 juli och början av aug., 2 ♂, 1 ♀. Skiljes
 lätt på sin gulröda abdomen från alla våra
 övriga T.-arter med pudrad torax, vilka ha
 svartglänsande abdomen.

- Sciapus contristans* WIED. Hbg $\frac{4}{7}$ 07, $\frac{4}{6}$ 13, Höganäs $\frac{18}{6}$ 11.
Neurigona pallida FALL. Hbg $\frac{10}{6}$ 06, $\frac{6}{8}$ 11, Ringsjön $\frac{2}{7}$
 10, Torekov $\frac{20}{7}$ 12, Ängelholm $\frac{16}{6}$ 13.
Dolichopus planitarsis FALL. Råå $\frac{17}{5}$ 13, 1 ♀.
 » *campestris* MG. Råå $\frac{27}{6}$ 12, $\frac{5}{8}$ 13, Torekov
 $\frac{20}{7}$ 12.
 » *lepidus* STÆG. Torekov $\frac{20}{7}$ 12, Ängelholm $\frac{16}{6}$
 13.
 » *picipes* MG. Ringsjön $\frac{28}{6}$ 10, Ängelholm $\frac{9}{6}$ 11,
 $\frac{16}{6}$ 13.
 » *claviger* STANN. Höganäs $\frac{2}{6}$ 12, Ringsjön $\frac{15}{8}$ 13.
 » *discifer* STANN. Ängelholm $\frac{9}{6}$ 11, $\frac{16}{6}$ 13, täm-
 ligen allmän, Hbg $\frac{14}{6}$ 13.
 » *Wahlbergi* ZETT. Hbg $\frac{30}{7}$ 13 vid en skogsäck.
 » *urbanus* MG. Råå $\frac{12}{7}$ 11.
 » *trivialis* HAL. Ringsjön $\frac{15}{8}$ 13.
 » *griseipennis* STANN. Hbg $\frac{3}{8}$ 13, $\frac{1}{9}$ 13.
 » *acuticornis* WIED. Hbg $\frac{15}{6}$ 10, Höganäs $\frac{10}{6}$ 12.
 » *linearis* MG. Hbg $\frac{4}{6}$ — $\frac{4}{8}$ 13.
 » *notabilis* ZETT. Råå $\frac{27}{6}$ 12.
 » *caligatus* WAHLB. Råå $\frac{12}{7}$ 11, $\frac{21}{7}$ 13.
 » *longitarsis* STANN. Råå, juni, juli, tämligen allmän.
Tachytrechus ammobates WALK. Ringsjön $\frac{27}{6}$ 10, $\frac{12}{7}$ 12.
 » *notatus* STANN. Tämligen allmän på flera stäl-
 len vid kusten invid Höganäs, Råå $\frac{5}{8}$ 13.
 » *insignis* STANN. I Dipt. Danica håller prof.
 LUNDBECK förtroligt, att den art ZETTERSTEDT
 i Dipt. Scand. upptager som *insignis* i stället
 är *ripicola* Lw.; *insignis* skulle i så fall ej
 förut vara funnen i vårt land. Den 1 sept.
 13 fann jag arten vid Sofero nära havsstran-
 den på ett fuktigt ställe men även på den
 torra, sandiga marken i närheten, där han-
 narna flögo och sprungo omkring livliga och
 skygga. Ännu den 14 sept. såg jag vid ett
 besök på platsen några exemplar. Arten skil-
 jes lätt från *ammobates*, vad ♂ beträffar, på
 frambenens metatarsus, som är mycket tunn
 och dubbelt så lång som de övriga tarslederna
 tillsammans.

- Hercostomus cupreus* FALL. Hbg slutet av maj—juli tämligen allmän, Ringsjön $^{27/6}$ 10.
- » *angustifrons* STÆG. Hbg $^{22/6}$ 12.
- » *celer* MG. Ängelholm $^{18/8}$ 12, Hbg $^{14/6}$, $^{28/7}$ 13.
- » *chalybæus* WIED. Råå $^{12/7}$ 11, $^{27/6}$ 12.
- » *metallicus* STÄNN. Ängelholm $^{9/6}$ 11, Hbg $^{21/5}$, $^{14/6}$ 13.
- Hypophyllus obscurellus* FALL. Ängelholm $^{18/8}$ 12, Hbg $^{25/7}$ — $^{17/9}$ tämligen allmän.
- Chrysotus pulchellus* KOW. Höganäs $^{18/6}$ 12.
- » *cupreus* MACQ. Ny för Sverige. Hbg $^{28/5}$, $^{14/6}$ 13. Arten igenkännes på de mer eller mindre gula framhäfterna och svarta benen.
- Diaphorus oculatus* FALL. Hbg $^{3/8}$ 12, Råå $^{21/7}$ 13.
- Argyra argyria* MG. Hbg $^{6/7}$ 11.
- » *confinis* ZETT. Ny för Sverige. Hbg $^{23/6}$ 12, $^{4/6}$ 13. Ryggsidan av torax otydligt silverpudrad, epistoma svart, bakbenens metatarsus med talrika borsthår.
- » *auricollis* MG. Ej sällsynt kring Hbg under juli, Ringsjön $^{29/6}$ 10, $^{12/7}$ 12.
- Leucostola vestita* WIED. Torekov $^{20/7}$ 12, Råå $^{21/7}$ 13.
- Porphyrops spinicoxa* LW. Ny för Sverige. Denna art var på försommaren förra året tämligen allmän kring Hbg. Även vid Lund och på Söderåsen i slutet av maj och vid Ringsjön i slutet av juni har jag fångat den. Arten har svart ansikte och svart kindskägg, tydlig tagg på de mellersta höfterna, yttre parningsbihangen hos ♂ gaffelkluvna, ben till större delen svarta.
- » *elegantula* MG. Ringsjön $^{15/8}$ 13.
- » *nemorum* MG. Ängelholm $^{16/6}$ 13, Hbg $^{2/8}$, $^{1/9}$ 13.
- » *crassipes* MG. Tämligen allmän kring Hbg från medlet av maj, Söderåsen $^{14/6}$ 09.
- » *consobrina* ZETT. Tämligen allmän vid Höganäs invid havsstranden på fuktiga ställen från slutet av maj t. o. m. juli.

- Porphyrops riparia* MG. Ny för Sverige. Prof. LUNDBECK har godhetsfullt bestämt arten. Hannens inre bihang äro korta och ha i spetsen ett litet stift, de yttre äro breda, trekantiga, på utsidan naggade och försedda med ett bakåtriktat utskott. Fångade arten vid samma tid och på samma lokaler som *crassipes*; den var dock sällsyntare än *crassipes*.
- Syntormon punctatus* ZETT. Råå ¹²/₇, 11, ²⁷/₆ 12.
 » *pumilus* MG. Höganäs ²⁶/₅ 11, ⁷/₆ 12.
- Xiphandrium fasciatum* MG. Höganäs ¹/₆ 12.
 » *monotrichum* LW. Höganäs, slutet av maj och början av juni.
 » *auctum* LW. Ny för Sverige. Råå ²¹/₇ 13, 1 ♂. Arten är något större än de övriga X-arterna, l. nära 4 mm. Parningsbihangen likna dem hos *monotrichum*. De yttre sakna dock det långa särställda spetsborstet, de inre ha längre utskott undertill vid basen.
 » *appendiculatum* ZETT. Hbg ²⁴/₆ 11, ²¹/₅ 13.
- Medeterus muralis* MG. Hbg ²²/₆ 12, ⁴/₆ 13, Ringsjön ¹⁵/₈ 13.
 » *apicalis* ZETT. Hbg ¹⁴/₉ 13.
 » *pallipes* ZETT. Hbg ²⁴/₈ 13.
 » *infumatus* LW. Höganäs ⁶/₅ 11, ⁶/₅ 12, Hbg ²⁵/₅ 12.
 » *truncorum* MG. Hbg ¹/₉ 13.
- Hydrophorus balticus* MG. Höganäs i slutet av mars 11.
 » *præcox* LEHM. Ringsjön ²⁷/₆ 10, Hbg ¹³/₅ 13, Råå april 13.
 » *litoreus* FALL. Tämligen allmän kring Hbg och Höganäs om våren. De tidigaste ex. äro tagna i slutet av mars.
 » *borealis* LW. Höganäs 24 mars 12. Att *binotatus* ZETT. skulle vara identisk med denna art, vilket uppges i flera verk, synes tvivelaktigt. Åtminstone tillhöra ex. i ZETT:s samling i Lund, som äro tagna i Jämtland, en annan art än *borealis* LW.
- Campsicnemus loripes* HAL. Höganäs ²¹/₃ 12, Hbg ¹⁷/₄ 08.

- Teuchophorus monacanthus* LW. Ny för Sverige. Hbg $30/7$, $2/8$ 13 vid en skogsbäck. ♂ igenkännes lätt på de bakre skenbenen, som mot spetsen äro förtjockade och, där förtjockningen börjar, beväpnade med ett sporreliknande borst.
- » *signatus* ZETT. Ny för Sverige. Förekom tillsammans med föregående. ♂ till denna art har ej baktibierna förtjockade mot spetsen. På mitten finnes en samling tätliggande borst och nedanför denna borstpensel synas några längre, böjda hår.
- Xanthochlorus tenellus* WIED. Ringsjön $12/7$ 12, Ängelholm $31/7$ 13.
- Pipizella flavitarsis* MG. Höganäs $9/6$ 12, Råå $5/8$ 13.
- Chrysogaster splendida* MG. Råå $12/7$ 11.
- » *chalybeata* MG. Råå $3/7$ 09.
- Chilosia illustrata* HARR. Ej sällsynt på umbellater kring Hbg under juli och aug. Ringsjön slutet av juni och början av juli 10.
- » *grossa* FALL. Viken $14/4$ 12, Höganäs $20/4$ 11, Hbg $1/5$ 11; på sälblommor.
- » *albipila* MG. Kullaberg $21/4$ 12, Hbg $5/4$ 13.
- » *chloris* MG. Hbg $24/5$ 06, Råå $17/5$ 13.
- Pyrophaena granditarsa* FORST. Ringsjön $28/6$ 10, $12/7$ 12, Höganäs $12/8$ 11.
- » *rosarum* FABR. Ringsjön $30/6$ 10.
- Xanthandrus comtus* HARR. Höganäs $27/8$ 12.
- Ischyrosyrphus glaucius* L. Ej sällsynt i nv. Skåne på umbellater under juli och aug. Ända så sent som i medlet av sept. har jag tagit den på Angelica.
- Didea fasciata* MACQ. Kullaberg $14/5$ 06.
- » *intermedia* LW. Tämligen sällsynt kring Hbg $14/6$ — $1/9$. Oftast enstaka på korgblomstriga växter såsom *Leontodon* och *Hypochæris*.
- Syrphus lunulatus* MG. Höganäs $13/5$ 06, $21/5$ 11.
- » *annulipes* ZETT. Hbg $14/6$ 13, $1/9$ 13, Höganäs $21/5$ 11.
- » *lineola* ZETT. Hbg maj, juli.

- Syrphus nitidicollis* MG. Kring Hbg och Höganäs; maj, juni.
- » *auricollis* MG. Om hösten kring Hbg på ljungblommor.
 - » *euchromus* KOW. Ringsjön $26/5$ 10.
 - » *triangulifer* ZETT. Hbg $17/6$ 06, $10/5$ 13.
 - » *lasiophthalmus* ZETT. Om våren tämligen allmän på sälgblommor. Detta är sannolikt den av *Syrphus*-arterna, som visar sig tidigast på våren. Redan i början av april i fjol fångade jag ett par hannar, som en solskensdag kretsade inne bland träden i en furuplantering.
- Sphærophoria Loewii* ZETT. Höganäs $1/6$ 12.
- Xanthogramma ornatum* MG. Hbg $3/8$ 12.
- Doros conopseus* FABR. Hbg $10/6$ 06.
- Baccha obscuripennis* MG. Höganäs $15/6$ 08, $10/6$ 12.
- Sphegina clunipes* FALL. Hbg, maj, juni, Ängelholm, juli.
- Brachyopa bicolor* FALL. Lund (seminarieträdgården) $26/5$ 07, Ringsjön $3/6$ 06.
- Hammerschmidtia ferruginea* FALL. Ängelholm $16/6$ 13.
- Eristalis antophorinus* FALL. Hbg $4/8$ 07, Ringsjön $2/7$ 10.
- » *rupium* FABR. Söderåsen $10/7$ 11, Ringsjön $15/8$ 13.
- Helophilus trivittatus* FABR. Höganäs $2/8$ 11.
- » *versicolor* FABR. Hbg, maj, juni, juli.
 - » *transfugus* L. Hbg $2/6$ 06, Ringsjön $15/8$ 13.
- Tropidia scita* HARR. Råå $3/7$ 09, Höganäs $9/6$ 12.
- Criorhina asilica* FALL. Hbg $23/6$ 12.
- » *oxyacanthæ* MG. Ny för Sverige. Hbg $6/6$ 11, $14/6$ 13; båda åren på samma lokal på hallonbuskar.
 - » *berberina* FABR. Ny för Sverige. Hbg $26/7$ 07, 1 ♀. Båda arterna äro, fränsett hårfärgen, mycket lika och kanske endast färgvariationer; liknande färgfördelning finnes hos t. ex. *Merodon equestris* F.
- Brachypalpus laphriformis* FALL. Skåne. Lokal?
- Eumerus sabulonum* FALL. Råå $12/7$ 11, Viken $21/7$ 11.
- » *ornatus* MG. Hbg $26/7$ 13.
- Sericomyia lappona* L. Tämligen sällsynt. Kullaberg $21/7$ 07, Söderåsen $10/7$ 11.
- Temnostoma vespiforme* L. Tämligen sällsynt på umbellater. Ringsjön $4/7$ 10, Hbg $7/7$ 11, Ängelholm $16/6$ 13.