

Nya svenska Empidider (Diptera).

Av

Richard Frey.

1. *Rhamphomyia dentata* OLDENBG.

OLDENBERG, Annal. Musei Nationales Hungarici, VIII, p. 344, 1910.

Två exemplar av denna art stå i BOHEMANS diptersamling i Riksmuseet i Stockholm bland exemplar av *Rh. dentipes* ZETT. De äro etiketterade Östergötland och Dalarne. — Vidare finnes ett exemplar i den allmänna ZETTERSTEDT'ska diptersamlingen i Lund tillsammans med exemplar av *Rh. dentipes* och etiketterat: »Grimnäs, Jämtland, 19. VI, 1840».

2. *Rhamphomyia albissima* FREY.

FREY, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, XXXVII, N:o 3, p. 17, 1913.

Ett ♂-Exemplar från Thynäs, Nordland, står tillsammans med exemplar av *Rh. niveipennis* ZETT. i ZETTERSTEDT's samling i Lund. Ett annat ♂-exemplar, samlat av prof. J. SAHLBERG i Jämtland, finnes i Universitetets i Hälsingfors zoologiska museum.

3. *Rhamphomyia breviventris* FREY.

FREY, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, XXXVII, N:o 3, p. 21, 1913.

Ett ♂-exemplar, samlat av författaren den 16. juli 1911 vid Karesuando kyrkoby i Luleå lappmark (zool. museet i Hälsingfors).

4. *Rhamphomyia unguiculata* FREY.

FREY, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, XXXVII, N:o 3, p. 24, 1913.

Ett exemplar, etiketterat Västergötland, BOHEMAN, står bland *Rh. albipennis* FALL. i BOHEMAN's samling i Stockholm.

5. *Rhamphomyia conformis* KOW.

KOWARTZ, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII, p. 321, 3, 1867.

Flera exemplar (♂ ♀) av denna karaktäristiska art stå åtskilda i en särskild rad, men obestämda, i BOHEMAN's samling i Stockholm. De äro etiketterade: »Dlc. alp. Bhn.».

6. *Rhamphomyia tibialis* MEIG.

MEIGEN, S. B., III, 44, 4, 1822.

Flera exemplar i BOHEMAN's samling i Stockholm bland exemplar av *Rh. sulcata* MEIG.

7. *Rhamphomyia attenuata* FREY.

FREY, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., XXXVII, N:o 3, p. 33, 1913.

Ett ♂-exemplar, samlat av prof J. SAHLBERG i Jämtland, i Universitetets i Hälsingfors zoologiska museum. Detta exemplar uppvisar en icke fullt normal vingribbförgrening, i det att M_1 och M_2 äro förenade ett stycke vid basen och sålunda komma att gemensamt utgå från diskoidalcellen.

8. *Hilara lundbecki* FREY.

LUNDBECK, Diptera danica, III, p. 171, 1910 (*Hilara pilipes* LUNDB. nec ZETT.) — FREY, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., XXXVII, N:o 3, p. 54, 1913.

Flera exemplar från södra Sverige i ZETTERSTEDT's allmänna diptersamling i Lund under namnet *H. pilipes* ZETT. Typen till *H. pilipes* ZETT. befinner sig emellertid, såsom jag l. c. har påvisat, sannolikt i en äldre diptersamling, som legat till grund för ZETTERSTEDT's arbete »Insecta lapponica», och detta exemplar tillhör en annan i norra Skandinavien förekommande, närstående art.

9. *Trichopeza albicincta* FREY.

FREY, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., XXXVII, N:o 3, p. 66, 1913.

Flera exemplar i BOHEMAN's samling i Stockholm under namn av *Brachystoma albicincta* WAHLB. in litt.

10. *Tachydromia sahlbergi* FREY.

FREY, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., XXXI, N:o 9, p. 7, 1908.

Ett ♂-exemplar från Esperö i ZETTERSTEDT's samling i Lund bland exemplar av *T. femoralis* ZETT. — Flera exemplar, tagna av förf. vid Karesuando kyrkoby den 13—16 juli 1911 (Zool. museet i Hälsingfors).

Var. *nigricollis* FREY — Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., XXXVII, N:o 3, p. 82, 1913.

Samlad av förf. vid Karesuando kyrkoby den 13—16 juli 1911 (Zool. museet i Hälsingfors).

11. *Tachydromia laestadianorum* FREY.

FREY, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., XXXVII, N:o 3, p. 83, 1913.

Arten förekom allmänt sommaren 1911 i Muonionalusta och Karesuando i Luleå lappmark (Zool. museet i Hälsingfors).