

## Bidrag till kännedomen om den svenska skalbaggsfaunan.

Av

Anton Jansson.

I nedanstående uppsats äro sammanförda anteckningar över fynd av *coleoptera* gjorda av mig under ferie- och semesterresor i skilda delar av Sverige och särskilt under exkursioner i min födelseprovins Nerike, ett landskap, som varit ofullständigt undersökt i coleopterologiskt hänseende men som rymmer så mycket av intresse i insektgeografiskt avseende, att det nog förtjänar sina särskilda kapitel. Anteckningarna äro gjorda som tillägg till GRILLS Förteckning över Skandinavians, Danmarks och Finlands Coleoptera och omfatta lokaluppgifter dels för ett antal för Sverige nya arter, dels för redan förut som svenska kända sällsyntare arter. Dessa bidrag till kännedomen om den svenska skalbaggsfaunan utökas med en del fynd av *coleoptera*, vilka gjorts av andra coleopterologer, vilkas samlingar jag haft tillfälle se. Mera kritiska arter ha varit underställda herr EDM. REITTERS i Paskau granskning.

### Fam. Carabidæ.

*Nebria brevicollis* FABR.: Gottland, vid Visby och Etelhem.

*Dyschirius thoracicus* FABR.: Gottland, Klintehamn.

» *politus* DEJ.: Närke, Östra Mark i Almby socken.

*D. æneus* DEJ.: Gottland, Etelhem.

*Panagæus crux major* L.: Gottland, Etelhem.

*Cymindis angularis* GYLL.: Närke, kalktrakterna vid La-  
torp i Tysslinge socken samt Valön i Stora Hjälmaren.

*Lebia cyanocephala* L.: Närke, Örebrotrakten, endast 1 ex.  
anträffat under mer än 20-årigt samlande.

*Odacantha melanura* L. Herr EMIL SANDINS förmodan  
i Entomologisk Tidskrift, att detta vackra djur har en  
vidsträcktare förekomst i Sverige än äldre uppgifter angifva,  
kan jag bestyrka, i det jag anträffat *Odacantha* så väl i  
Östergötland vid sjön Tåkern som i Närke flerstädes vid  
Hjälmaren, dock endast Stora Hjälmaren, såsom vid Björk-  
sundet och på Valön.

*Dromius marginellus* FABR.: Närke, Halsbergs socken  
(KALEB JANSSON).

*D. linearis* OL.: Gottland, Visby vid Snäckgärdet.

*Trechus discus* FABR.: Anträffades flera år i sträck lokalt  
talrik i Örebrotrakten, särskilt på de sank genom Hjälmar-  
sänkningen nyvunna ängarna kring Hemfjärden, men har på  
senare år ej återfunnits.

*T. rivularis* GYLL.: Förekommer i Närke dels på ett  
litet område i Markkärret i Almby socken, dels vid Svartåns  
utlopp i Hemfjärden. I Markkärret, en skarpt avskild forma-  
tion med — såsom dessa anteckningar giva en antydning om —  
rik och intressant skalbaggsfauna och rikt lägre djurliv för övrigt,  
lever arten djupt ned i mossan, som kantar en liten skogstjärn.  
På den senare lokalen träffas den under nedfallna löv vid den  
buskklädda stranden av en vik.

*Bembidium quadriguttatum* FABR.: Gottland, Åkelösa myr.

*B. quatuordecimstriatum* THOMS.: Närke, Alnängarna vid  
Örebro.

*B. Schüppelii* DEJ. Denna nordligare art som WÄNGDAHL  
förut funnit i Hammar i Närke, har jag anträffat vid Svartåns  
utlopp i Hjälmaren.

*Licinus depressus* PAYK.: Gottland, i trakten av Visby.

*Amara patricia* DUFT.: Gottland, Visbytrakten.

*A. municipalis* DUFT.: Småland, Virserums socken, och  
Närke flerstädes kring Örebro och även i staden, i träd-  
gårdar.

*A. fumelica* ZIMM.: Närke, Östra Mark i Almby socken.

*A. ovata* FABR.: Närke, 1 ex. i Örebrotrakten.

*A. montivaga* STURM. Av denna lättskilda, praktfullt mörkt grönskimrande art fann jag i juni månad 1904 1 ex. söder om Örebro. Ny för Sverige. Känd bland annat från Tyskland och flera lokaler i Finland.

*A. convexior* STEPH.: Småland, Virserums socken, och Södermanland, Fiskeboda i Julita socken.

*A. curta* DEJ.: Gottland, 2 ex. i trakten av Visby.

*Calathus piceus* MARSH.: Skåne i Kulla-Gunnarstorps-parken.

*Synuchus nivalis* PANZ.: Gottland, Visby i Palissaderna.

*Anchomenus ruficornis* FABR.: Gottland, Visby.

*A. parumpunctatus* FABR.: Gottland.

*A. quadripunctatus* DE GEER: Gottland, 1 ex. vid Visby.

*A. dorsalis* PONT.: Gottland, Etelhem.

*Harpalus rubripes* DUFT.: Gottland flerstädes och Närke i kalktrakterna vid Latorp i Tysslinge socken samt vid Örebro.

*H. anxius* DUFT. Denna i Sverige endast från Skåne, Öland och Gottland förut kända art har en märklig isolerad förekomst på Vinön i Stora Hjälmarén. Den träffas här under stenar i gruset på en lokal, som med sina lågvuxna tallar och enar och xerofila växtlighet för övrigt rätt mycket erinrar om en bit öländsk eller gottländsk natur.

*Acupalpus flavicollis* STURM.: Närke, vid lergropar söder om Örebro.

#### Fam. Haliplidæ.

*Haliplus obliquus* FABR.: Gottland, Etelhem.

*H. lapponum* THOMS. Ett litet ex. av en *Haliplus*, som företer de för *H. lapponum* utmärkande kännetecknen, har jag funnit i en pöl vid Etelhem på Gottland. REITTER, som i sin katalog upptar *lapponum* endast som varietet till *H. fulvus* FABR., anser också exemplaret vara *H. lapponum*.

#### Fam. Dytiscidæ.

*Hygrotus decoratus* GYLL.: Närke, Örebrotrakten.

*Coelambus Marklini* GYLL.: Öland, Borgholm.

*Bidessus unistriatus* ILL.: Närke, Markkärret.

*Deronectes Halensis* FABR. Synes vara en art, som på senare decennier utbrett sig allt mera. Den är numera ytterst allmän i Närke i bäckar och dammar med lerbotten i Örebrotrakten, och jag har dessutom funnit den talrikt flerstädes på Gottland och i Skåne.

*Hydroporus notatus* STURM.: Öland, Borgholm.

*H. scalesianus* STEPH.: Närke, ett par ex. i en pöl vid Svartåns utlopp i Hemfjärden.

*H. vittula* ER.: Närke, allmän vårtiden i Örebrotrakten.

*Colymbetes Grapei* GYLL.: Östergötland i sjön Tåkern.

*Rantus conspersus* GYLL.: Öland i brackvatten vid Stora Rör.

*Ilybius angustior* GYLL.: Småland i Virserumssjön.

*Liopterus ruficollis* SHALLER: Gottland, Etelhem.

#### Fam. Hydrophilidæ.

*Philydrus Sahlbergii* FAUV. Uppgives av THOMSON leva i skogskärr, men jag har funnit den i öppna havsvattnet vid långgrunda stränder på Gottland.

*Laccobius decorus* GYLL.: Gottland, allmän i brackvatten vid Klinte.

*Limnebius picinus* MARSH.: Närke, Björksundet i Hjäl-maren.

*L. sericans* MULS. Denna för Sverige nya art fann jag talrikt i slammet i ett dike vid Rälla på Öland juli månad 1914. Förut funnen i Danmark.

*Spercheus emarginatus* FABR.: Östergötland i Tåkern.

*Helophorus æqualis* THOMS.: Öland, allmän i brackvatten vid Borgholm och Stora Rör.

*Hydrochus carinatus* GERM.: Närke, Björksundet i Hjäl-maren.

#### Fam. Georyssidæ.

*Georyssus crenulatus* ROSSI: Östergötland vid Tåkern.

#### Fam. Staphylinidæ.

*Emus hirtus* L.: Öland, Stora Rör.

*Trichoderma pubescens* DE GEER: Närke vid Örebro.

*Platydracus stercorarius* OL.: Öland vid Borgholm.

- Ocyptus olens* MÜLL.: Gottland, 1 ex. vid Etelhem.
- O. æneocephalus* DE GEER: Gottland, Klintehamn.
- O. compressus* MARSH.: Gottland, talrikt vid Visby i Pålissanderna under stenar i juni månad.
- Philonthus lepidus* GRAV.: Närke, Latorp i Tysslinge socken.
- Othius fulvipennis* ER.: Närke, i skogar kring Örebro.
- Xantholinus atratus* HEER: Närke, i en *Formica rufa*-stack i skogen Reträtten vid Örebro.
- Lathrobium fovulum* STEPH.: Närke, Markkärret.
- L. longulum* GRAV.: Närke, Markkärret.
- Cryptobium fracticorne* PAYK.: Närke, allmän i Markkärret.
- Stilicus rufipes* GERM.: Närke, Örebrotrakten.
- S. affinis* ER.: Närke, Halsbergs socken (KALEB JANSSON).
- S. orbiculatus* PAYK.: Närke, Örebrotrakten. Vinön i Stora Hjälmaren.
- Myrmedonia limbata* PAYK.: Närke, Örebrotrakten.
- Zyras collaris* PAYK.: Närke, enstaka ex. i Markkärret och vid Hjälmarstranden i Almby socken.
- Microglossa nidicola* FAIRM.: Småland, fyra ex. i ett bo av *Hirundo riparia*. Ny för Sverige. Allmän i strand-svalans bo i Torneå lappmark i Finland enligt J. SAHLBERG.
- Phlæopora angustiformis* BAUDI: Närke, Östra Mark i Almby socken, 2 ex. under barken av tall. Ny för Sverige. Funnen i Finland vid Hälsingfors och Ladoga-Karelen.
- P. teres* GRAV.: Närke 1 ex. på samma plats som föregående. Småland, Virserums socken, 1 ex. Ny för Sverige.
- Encephalus complicans* ER.: Närke, Markkärret.
- Falagria obscura* GRAV.: Närke, Örebrotrakten.
- Calodera uliginosa* ER.: Närke, Markkärret.
- C. aethiops* GRAV.: Närke, vid Svartåns utlopp i Hjälmaren, 1 ex. 17 okt. 1915.
- Ichnopoda leucopus* MARSH.: Småland i Virserums socken. Uppgiften i GRILLS katalog om artens förekomst i Närke grundar sig på ett enda ex. funnet för många år sedan av v. häradshövding J. HULTGREN på Stora Holmen vid Örebro. På senare år har jag funnit den talrikt i maj och juni månader löpande på den fuktiga marken i lergropar söder om Örebro.

**I. umbratica** ER.: Närke, 2 ex. i Markkärret. Ny för Sverige. Funnen i Danmark på Seeland och i Jylland.

*Gnypeta carbonaria* MANNH.: Närke, funnen talrikt på lerbotten i diken vid vattenkanten i Örebrotrakten.

*Aloconota currax* KRAATZ: Skåne, Kulla-Gunnarstorp. Upptagen bland de för Sverige nya *coleoptera* som D. L. UIJTENBOOGAART funnit på Kinnekulle.

*A. sulcifrons* STEPH.: Närke, Markkärret, 1 ex.

*A. gregaria* ER.: Närke, Markkärret, 2 ex.

*Ocyusa maura* ER.: Närke, Markkärret.

*Myllena intermedia* ER.: Närke, funnen flerstädes såsom Markkärret, i Kvistbro socken och vid Björksundet i Stora Mellösa socken.

*Myllena minuta* GRAV.: Närke, allmän i Markkärret.

**Disochara funebris** KRAATZ: Närke, några ex. i Markkärret. Ny för Sverige. Funnen i Norge vid Tromsø och i Finland.

**D. obscura** KRAATZ: Närke, 1 ex. i Markkärret. Ny för Sverige. Funnen i Finland och Tyskland.

*Sphenoma abdominalis* MANNH.: Närke, vid Svartåns utlopp i Hjälmaren, talrik under nedfallna löv.

*Placusa complanata* ER.: Närke, Östra Mark i Almby socken under barken av tall.

*Pseudosipalia cæsula* ER.: Av denna art, som enligt THOMSON lever hos lilla svarta myran, har jag funnit 1 ex. i Markkärret.

*Schistoglossa viduata* ER.: Närke, Markkärret.

*Atheta incognita* SHARP.: Skåne, 1 ex. vid Kulla-Gunnarstorp.

**A. triangulum** KR.: Närke, talrikt i multnande agnar i Örebrotrakten. Ny för Sverige. Känd från Italien, Frankrike, Tyskland.

*A. pilicornis* THOMS.: Närke, i skogar söder om Örebro talrikt i svampar.

*Metaxya islandica* KRAATZ: Närke, 1 ex. i Markkärret.

*M. punctulata* J. SAHLB.: Närke, Markkärret, många ex. tagna i mossan vid kärrkanten. Av L. HAGLUND förut påvisad som svensk.

*Dimetrota villosula* KRAATZ: Närke, Markkärret.

*Traumaecia nigricornis* THOMS.: Närke, Örebrotrakten och Markkärret.

*Philhygra palustris* KIESW.: Öland, Stora Rör.

*Anopleta corvina* THOMS.: Närke, Ormesta i Almby socken i svampar.

*Thectura cuspidata* ER.: Närke, Ormesta i Almby socken under barken av björk.

*Dinaræa æquata* ER.: Närke, skogen Reträtten söder om Örebro i en stack av *Formica exsecta*.

*Aleuonota macella* ER.: Närke, i ex. i Markkärret.

*Liogluta microptera* THOMS.: Närke, Markkärret.

*Alaobia scapularis* SAHLB.: Södermanland, Fiskeboda i Julita socken.

*Trichophya pilicornis* GYLL.: Närke, Östra Mark i Almby socken.

*Euæsthetus scaber* GRAV.: Närke, Markkärret, där den förekommer sparsammare än *E. læviusculus* MANNH.

*Astycops talpa* GYLL.: Här och där på den sandiga stranden av Hjälmarén, i Närke vid Hjälmarsberg i Almby socken.

*Bryocharis analis* PAYK.: Närke, Örebrotrakten och Almby socken.

*Acidota rufa* GYLL.: Närke, Örebrotrakten.

*Pycnoglypta lurida* GYLL.: Närke, vid lergropar söder om Örebro samt i Markkärret. Träffas i gräset vid vattenkanten.

***Anthobium Marshami*** FAUV. Ett ex., som sänts till mig från herr B. VARENIUS i Hälsingborg och tagits i trakten av denna stad, tillhör denna art. Ny för Sverige.

*Phlæostiba plana* PAYK.: Närke, Östra Mark i Almby socken under barken av barrträd.

*Xylodromus monilicornis* GYLL.: Närke, på samma lokal som föregående och i sällskap med denna.

*Proteinus atomarius* ER.: Närke, Reträtten och Adolfsberg vid Örebro.

#### Fam. Pselaphidæ.

*Euplectus ambiguus* REICHB.: Närke, Markkärret i enstaka ex.

*Bythinus puncticollis* DENNY: Närke, endast få ex. i Markkärret, där *B. bulbifer* REICHB. däremot förekommer i största ymnighet.

*Bryaxis sanguinea* L.: Närke, på en liten holme vid Vinön i Stora Hjälmaren.

#### Fam. Silphidæ.

*Oiceoptoma undata* MÜLL.: Närke, Sannahed i Halsbergs socken (KALEB JANSSON).

*Xylodrepa quadripunctata* L.: Närke, Essön i Hjälmaren (D. LINDBERG); Södermanland, Fiskeboda i Julita socken.

#### Fam. Anisotomidæ.

*Anisotoma cinnamomea* PANZ.: Närke, 1 ex. på en vägg i Örebro.

*Liodes orbicularis* HERBST: Närke, Halsbergs socken (KALEB JANSSON).

*Agathidium nigripenne* KUG.: Närke, under barken av asp vid Guttersboda söder om Örebro.

#### Fam. Catopidæ.

*Choleva intermedia* KR.: Närke, 2 ex. flygande över ett åkerfält söder om Örebro.

*C. cisteloides* FR.: Närke, 1 ex. vid Vretstorp i Viby socken (J. HULTGREN).

**C. Sturmii** BRIS.: En ♀ i Örebrotrakten juni 1896. Ny för Sverige. Funnen förut i Spanien, Frankrike och Österrike.

*Sciodropa scitula* ER.: Närke, 1 ex. i en ruttan svamp i skogen Reträtten söder om Örebro sept. 1915.

*Catops nigrita* ER.: Gottland, Etelhem.

#### Fam. Scydmenidæ.

*Eutheia plicata* GYLL.: Södermanland, Fiskeboda i Julita socken.

*Neuraphes elongatulus* MÜLL.: Närke, vid Svartåns utlopp i Hjälmaren, 1 ex. i oktober 1915.



*Euconnus rutilipennis* M. et K.: Närke, Markkärret  
1 ex. sommaren 1915. Ny för Sverige. Förut funnen nord-  
ligast i Danmark på Seeland.

*Stenichnus exilis* ER.: Närke, Hjärsta vid Örebro, 1 ex.  
under barken av asp. Vid Björksundet vid Hjälmarens även-  
ledes 1 ex.

#### Fam. Trichopterygidae.

*Trichopteryx sericans* HEER: Närke, Markkärret.

*Aderces suturalis* HEER: Närke, Markkärret bland multnad  
bark vid foten av träd.

#### Fam. Clambidae.

*Clambus minutus* STURM: Närke, Örebrotrakten.

#### Fam. Nitidulidae.

*Meligethes maurus* STURM: Närke, Almby socken.

*Nitidula carnaria* SCHALLER: Småland, Virserums socken.

*Epuræa thoracica* TOURN. och *E. thoracica* v.  
*suturalis* REITTER, 1 ex. av vardera i en skog söder om  
Örebro. Såväl huvudarten som varieteten nya för Sverige.  
Förut funna bl. a. i Finland.

*E. obsoleta* FABR. v. *x-nigrum* J. SAHLB.: Småland,  
Virserums socken. Varieteten ny för Sverige.

*E. terminalis* MANNH.: Närke, Björkönen i Stora Hjälmarens.

*E. variegata* HERBST: Närke, Björkönen i Stora Hjälmarens.

*E. pygmæa* GYLL.: Närke, allmän i barrskogar söder om  
Örebro.

*E. pusilla* ILL.: Närke, allmän i barrskogar söder om  
Örebro. Om våren under bark, på hösten i ruttnande svampar.

*E. boreella* ZETT.: Närke, många ex. under barken av  
gran i maj 1913 vid Östra Mark i Almby socken.

*E. angustula* ER.: Några ex. under barken av gran i maj  
månad på samma plats som föregående.

*Cryptarcha imperialis* FABR.: Närke, Björkönen i Stora  
Hjälmarens; Södermanland, Fiskeboda.

Fam. **Dermestidæ.**

*Dermestes atomarius* ER. THOMSONS uppgift att denna art lever under tång vid havskusten och GRILLS lokaluppgifter: Sk., Hall., Boh., Bl., Sm., Öl., Uppl., skulle låta en förmoda, att arten har speciellt marin förekomst. Den finnes emellertid även inuti landet, nämligen vid Stora Hjälmaren, där jag funnit den så väl på Valön på ruttnande torskyngel, som uppkastats på stranden, som vid Fiskeboda, där den är allmän på den sandiga sjöstranden.

*Dermestes lanarius* ILL.: Gottland vid Visby.

Fam. **Histeridæ.**

*Hister funestus* ER.: Närke, Örebrotrakten.

*Atholus quattuordecimstriatus* GYLL.: Närke, Örebrotrakten.

*Saprinus rugifrons* PAYK.: Närke, Vinön i Stora Hjälmaren; Södermanland, allmän på den sandiga stranden vid Fiskeboda.

*Gnathoncus punctulatus* THOMS.: Närke, Örebro.

*Dendrophilus punctatus* HERBST: Närke, funnen dels vid Hjälmarsberg i Almby socken i utsipprande almsaft samt en gång i mängd i multnande agnar söder om Örebro.

Fam. **Cucujidæ.**

*Dendrophagus crenatus* PAYK.: Närke, Skallerudsdalen i Halsbergs socken (KALEB JANSSON).

*Silvanus bidentatus* FABR.: Närke, Örebro.

Fam. **Trogositidæ.**

*Nemosoma elongatum* L.: Närke, 1 ex. flygande i maj månad på Stora Holmen vid Örebro.

Fam. **Colydiidæ.**

*Cerylon deplanatum* GYLL.: Närke, ej sällsynt under bark flerstädes.

*Colydium elongatum* FABR.: Gottland, 1 ex. på en granstubbe i skogen vid Åkelösa myr.

*Cicones variegatus* HELLW.: Skåne, under bark av bok vid Kulla-Gunnarstorp.

#### Fam. Anobiidæ.

*Dryophilus pusillus* GYLL.: Närke, Skallerudsdalen i Halsbergs socken (KALEB JANSSON).

*Anitys rubens* HOFFM.: Närke, en gång funnen i mängd i en gammal ek vid Rynninge i Stora Mellösa socken.

#### Fam. Sphindidæ.

*Aspidiphorus orbiculatus* GYLL.: Närke, Sommarro söder om Örebro.

#### Fam. Lathridiidæ.

*Lathridius Bergrothi* RTTR.: Närke, ett år anträffad i mängd på uthusväggar i Örebro.

*Cartodere filiformis* GYLL.: Närke, Örebro, talrik i insektslådor (J. HULTGREN).

*Enicmus minutus* L. v. *minutissimus* MOT.: Skåne, Viken, i agnar. Varieteten ny för Sverige.

*Enicmus hirtus* GYLL.: Närke, i en murken rönn vid Hjälmarsberg i Almby socken.

*Corticaria impressa* OLIV.: Skåne, Viken, bland agnar; Närke, Örebrotrakten.

#### Fam. Cryptophagidæ.

*Telmatophilus typhae* FALLÉN: Skåne vid Hälsingborg på *Typha* (KALEB JANSSON).

*Cryptophagus populi* PAYK.: Gottland, Etelhem, 1 ex. flygande mot solnedgången.

*C. bimaculatus* PANZ.: Gottland.

*Atomaria subfasciata* RTTR.: Öland, 1 ex. i juli 1914 vid Rälla under tång. Ny för Sverige. Förut funnen i Finland.

*A. procerula* ER.; Småland, Virserums socken.

*A. prolixa* ER. v. *pulchra* ER. I min svenska samling har jag ett ex. av denna varietet, tyvärr utan lokaluppgift.

Arten är förut ej funnen i Sverige och ej heller varieteteten. Båda förut funna i Danmark.

*Anchicera clavigera* GANGLB. På samma plats på Öland, nämligen Rälla, där MJÖBERG fann 2 ex. av denna då för Sverige nya art, lyckades jag i juli 1914 anträffa 2 ex., likaledes under på stranden uppkastad tång. Sedermera, maj 1915, fann jag i sällgods från Markkärret i Närke 1 ex. av arten.

*A. nigripennis* PAYK.: Närke, Örebro.

*A. terminata* COMOLLI: Närke, 1 ex. i Örebrotrakten.

#### Fam. Endomychidæ.

*Mycetina cruciata* SCHALL.: Södermanland, Fiskeboda; Närke, Örebro.

#### Fam. Buprestidæ.

*Melanophila acuminata* DE GEER: Gottland, Visby.

*Agrilus pratensis* RATZB.: Närke, Reträtten vid Örebro.

*Trachys troglodytes* GYLL.: Närke, Rynninge i Stora Mellösa socken, 1 ex. i maj månad 1899.

#### Fam. Eucnemidæ.

*Microrrhagus pygmæus* FABR.: Närke, Björksundet i Stora Mellösa socken, Latorp i Tysslinge socken, Trumön i Kvistbro socken.

*Throscus dermestoides* L.: Närke, Örebrotrakten.

#### Fam. Elateridæ.

*Corymbites serraticornis* PAYK.: Närke, Östra Mark i Almby socken.

*Adrastus pallens* FABR.: Närke, i en trädgård i Örebro.

*Elater præustus* FABR.: Södermanland, Tockenön i Stora Hjälmarén.

*E. sanguinolentus* SCHRANK: Närke, Björksundet i Stora Mellösa socken (J. HULTGREN).

*Megapenthes tibialis* LAC.: Västergötland, Hunneberg (J. HULTGREN).

*Negastrius pulchellus* L.: Närke, Almby och Långbro socknar.

*Cardiophorus ebeninus* GERM.: Närke, på en sandsluttning vid Skråmsta i Ånsta socken, många individer en varm solskensdag i maj 1911.

#### Fam. Dascillidæ.

*Cyphon variabilis* THUNB. v. *nigriceps* KIESW.: Närke, allmän i Markkärret.

#### Fam. Lampyridæ.

*Platycis minuta* FABR.: Närke, Skallerudsdalen i Halsbergs socken (KALEB JANSSON).

#### Fam. Cantharidæ.

*Cantharis pellucida* FABR.: Tämligen allmän i västra Närke, saknas i Hjälmrområdet.

*Rhagonycha elongata* FALLÉN: Närke, Örebro.

*R. atra* L.: Närke, Almby och Långbro socknar.

*Malthinus frontalis* MARSH.: Närke, Björkönen i Hjälmaren.

*Malthodes atomus* THOMS.: Öland, Ekerum; Närke, Hjälmarsberg i Almby socken, Trumön i Kvistbro socken.

#### Fam. Cleridæ.

*Opilo mollis* L.: Öland.

*Corynetes cæruleus* DE GEER: Gottland, Visby.

*Necrobia violacea* L.: Gottland, Visby.

#### Fam. Tenebrionidæ.

*Tenebrio opacus* DUFT.: Öland, Halltorp 1900, många ex. på en eksvamp.

*Penthaphyllus testaceus* HELLW.: Närke, Rynninge i Stora Mellösa socken.

*Hypophlæus fasciatus* FABR.: Gottland, under barken av en gammal ek nära Løjsta kyrka.

*H. linearis* FABR. Småland, Virserums socken på tallstockar.

Fam. **Alleculidæ.**

*Mycetochara axillaris* PAYK.: Södermanland, Fiskeboda.

*Ernocharis linearis* ILLIG.: Gottland, Etelhem.

*E. obscura* ZETT.: Närke, 1 ex. på en vägg i Örebro.

*Eryx ater* FABR.: Närke, Björkönen i Hjälmarenen i en gammal ask.

*Hymenalia rufipes* FABR.: Öland, Borgholm.

Fam. **Mordellidæ.**

*Tomoxia biguttata* GYLL.: Öland, Halltorp.

*Mordella maculosa* NAEZEN: Närke, flerstädes under torra grantickor på stubbar.

*Mordellistena abdominalis* FABR.: Södermanland, Fiskeboda.

*Orchesia micans* PANZ.: Närke, Myrö i Ringkarleby socken; Stockholm vid Marieberg.

*Clinocara undulata* KRAATZ: Närke, 1 ex. på en vägg i Örebro.

*C. fasciata* PAYK.: Närke, Skallerudsdalen i Halsbergs socken (KALEB JANSSON).

Fam. **Melandryidæ.**

*Serropalpus barbatus* SCHALL.: Närke, 1 ex. på en gata i Örebro.

*Abdera flexuosa* PAYK.: Småland, Virserums socken; Södermanland, Fiskeboda.

*Zilora ferruginea* PAYK.: Närke, Östra Mark i Almby socken, en gång tagen vintertid, en annan gång i maj månad under barken av tall.

*Melandrya caraboides* L.: Skåne, Kulla-Gunnarstorp (KALEB JANSSON).

Fam. **Pythidæ.**

*Salpingus foveolatus* LJUNGH: Närke, Hjälmarsberg i Almby socken; skogen Reträtten vid Örebro.

*Rhinosisimus planirostris* FABR.: Närke, i parker i Örebro.

*Pytho depressus* L.: Skåne, Hälsingborgstrakten (KALEB JANSSON).

Fam. **Oedemeridæ.**

*Nacerdes melanura* L.: Gottland, Visby.

*Asclera cærulea* L.: Öland, Halltorp.

Fam. **Anthicidæ.**

*Anthicus gracilis* PANZ.: Öland, 2 ex. vid Ekby på Ölands ostkust, under tång, som här var uppkastad på stranden på vidlyftiga sträckor. Ny för Sverige. Funnen bl. a. på Hankö i Norge.

*A. luteicornis* SCHMIDT: Skåne, 1 ex. på havsstranden vid Viken. Ny för Sverige. Förut funnen bl. a. i Finland.

*A. ater* PANZ.: Närke, på den sandiga stranden av Vinön i Stora Hjälmarén.

*Euglenes nigrinus* GERM.: Öland, 1 ex. under håvning i alskogen nedom Rälla.

Fam. **Anthribidæ.**

*Anthribus albinus* L.: Gottland, Etelhem.

*Tropideres niveirostris* FABR.: Södermanland, Fiskeboda.

Fam. **Rhinomaceridæ.**

*Rhinomacer attelaboides* FABR.: Närke, Karlslund i Långbro socken.

Fam. **Curculionidæ.**

*Rhynchites purpureus* L.: Öland, Borgholm.

*Apion rufirostre* FABR.: Gottland, Visby, i mängd på *Malva silvestris*.

*A. æneum* FABR.: Tillsammans med föregående.

*A. craccæ* L.: Närke, Örebrotrakten.

*A. violaceum* KIRBY: Närke, Örebrotrakten.

*Polydrusus flavipes* DE GEER: Närke, Björksundet i Stora Mellösa socken.

*Otiorrhynchus nodosus* FABR.: Närke, Östra Mark i Almby socken; Ekeby socken.

*Trachyphlæus digitalis* GYLL.: Småland, Virserums socken.

*Foucartia squamulata* HERBST: Öland, 1 ex. på alvaren vid Borgholm; Gottland, 1 ex. vid Visby på Snäckgården.

*Tropiphorus obtusus* BONSD.: Närke, skogen Retträten vid Örebro på albuskar.

*Cleonus glaucus* FABR.: Närke, Örebrotrakten.

*Hypera trilineata* MARSH.: Närke, Örebrotrakten.

*Bagous limosus* GYLL.: Öland, i närheten av Borgholm.

*B. encaustus* GYLL.: Öland, i närheten av Borgholm.

*B. lutulentus* GYLL. v. *nigritarsis* THOMS: Tillsammans med föregående.

*Lixus bardanæ* FABR.: Närke, Hjälmarsberg i Almby socken.

***Dorytomus lapponicus*** J. SAHLB. I min förteckning över i Abisko nationalpark anträffade *Coleoptera* i Entomologisk Tidskrift 1914, sid. 101, hade jag upptagit *Dorytomus salicinus* GYLL. Uppgiften berodde emellertid på felbestämning, i det att samtliga på platsen insamlade *Dorytomus*-individer visat sig tillhöra *D. lapponicus*, endast anträffad av J. SAHLBERG på Pallastunturi fjäll i Finska lappmarken. Vid Abisko förekom arten talrikt på *Salix lapponum* i bäckdalarna.

*Pissodes Gyllenhaali* GYLL.: Närke, Sörby i Almby socken.

*Balaninus villosus* FABR.: Södermanland, Fiskeboda; Närke, Hjälmarsberg i Almby socken.

*Phytobius velatus* BECK.: Närke, vid Svartåns utlopp i Hjälmarén.

*Rhinoncus bruchoides* HERBST: Nerike, Örebrotrakten.

***Ceutorrhynchidius pulvinatus*** GYLL.: Skåne, Häl-singborgstrakten, talrik på cruciferer. Ny för Sverige. Funnen bl. a. i Finland.

*Tapinotus sellatus* FABR.: Skåne, Ängelholm.

*Ceutorrhynchus melanostictus* MARSH.: Skåne, Kulla-Gunnarstorp.

*C. pleurostigma* MARSH. Denna art lever som bekant på cruciferer. På Öland förekommer den emellertid, t. ex. utefter hela havskusten mellan Stora Rör och Ekerum, på bladen av al och hassel. På förstnämnda platsen angrep den också cruciferer, t. ex. bladen av pepparrot.



*C. timidus* WEISE: Bland *C. contractus* MARSH., som jag insamlade från kålplantor vid Virserum i Småland, var 1 ex. av denna art. Ny för Sverige. Förut funnen i Europa till Livland.

*C. hirtulus* GERM.: Närke, Örebro.

*Miarus micros* GERM.: Småland, Virserums socken.

*Anthonomus pubescens* PAYK.: Närke, Östra Mark i Almby socken.

*A. varians* PAYK.: Närke, Östra Mark i Almby socken.

#### Fam. Cossonidæ.

*Cossonus parallelepipedus* HERBST. En kullblåst gammal *Populus nigra* i Slottsparken i Örebro befanns i sitt inre vara helt sönderminerad av denna art. Trädet hade blåst omkull på en vinterdag i februari och hyste tusentals individer, imagines och larver, i full livaktighet.

*Rhyncolus turbatus* SCHÖNH.: Närke, Örebro, i stor mängd i en gammal lönn i Oskarsparken; Södermanland, Fiskeboda.

*R. Thomsoni* GRILL: Öland, talrikt i murkna almar nedanför Borgholms slottsruin.

#### Fam. Scolytidæ.

*Hylastes cunicularius* ER.: Närke, Almby socken.

*Hylesinus crenatus* FABR.: Gottland, Etelhem.

*Polygraphus pubescens* FABR.: Närke, Hjälmarsberg i Almby socken.

*Cryphalus tilie* PANZ.: Närke, anträffad flygande flerstädes vid Hjälmaran, såsom vid Hjälmarsberg och Björksundet, där åldriga lindar finnas.

*Tomicus micrographus* L.: Närke, Hjälmarsberg i Almby socken.

*T. villosus* FABR.: Öland, i närheten av Borgholm.

*Scolytus destructor* ER.: Gottland, Etelhem.

#### Fam. Lamiidæ.

*Pogonochærus ovatus* GOEZE: Närke, Latorp i Tysslinge socken; Värmland, Bäckhammar.

*Pogonochærus hispidus* L.: Närke, Örebro.

Fam. **Chrysomelidæ.**

*Donacia cinerea* HERBST: Närke, Sottern i Svennevads socken (KALEB JANSSON).

*D. semicuprea* PANZ.: Närke, Frösvidal i Kils socken.

*D. vulgaris* ZSCHACH: Värmland, Bäckhammar.

*Luperus flavipes* L.: Närke, flerstädes.

*Haltica lythri* AUBÉ: Gottland, Hemse, på hassel.

*Sphæroderma cardui* GYLL.: Närke, skogen Reträtten söder om Örebro på *Cirsium heterophyllum*.

*Crepidodera aurata* MARSH.: Närke, Markkärret.

*Mantura rustica* L.: Närke, Örebrotrakten.

*Psylliodes dulcamaræ* KOCH: Närke, Markkärret på *Solanum dulcamara*.

*P. cucullata* ILL.: Närke, Östra Mark i Alby socken; Latorp i Tysslinge socken.

*Lina tremulæ* FABR.: Uppträdde vid midsommartid 1915 i mängd jämte *L. populi* L. på aspbuskar i »Djurgården» vid Eskilstuna. Även i Närke vid samma tid på Alnängarna vid Örebro.

*Plagioderia salicis* DE GEER: Småland, Virserums socken.

*Cryptocephalus pini* L.: Skåne, Ängelholm i barrplanteringen.

*Cassida rubiginosa* MÜLL.: Närke, Örebrotrakten.

*C. vibex* L.: Närke, Örebrotrakten; Garphyttan i Tysslinge socken.

Fam. **Coccinellidæ.**

*Halysia sedecimguttata* L.: Gottland, Hemse på hasselbuskar tillsammans med *H. duodecimguttata* PODA.

*Platynaspis luteorubra* GOEZE: Närke, Valön i Stora Hjälmarens.

*Scymnus minimus* PAYK.: Öland, Halltorp.

\*

Dessutom två arter, som REITTER anser vara nya för vetenskapen: en *Helophorus* i 2 ex. från Markkärret i Närke, en *Adimonia* i ett fåtal ex. från Öland.