

## Bidrag till kännedomen om fjärilfaunan inom Kronobergs län.

Av

**Ernst Orstadius.**

(Forts. från h. 1, 1915, p. 68.)

### **Habrostola O.**

*triplasia* L. Sällsynt. Endast en ♀ anträffad 10/7 15.  
*tripartita* HUFN. Ej sällsynt. Anträffad årligen.

### **Plusia O.**

*moneta* F. Endast anträffad 13/7 och 14/7 14, då en ♂ och 4 ♀♀ togos i min trädgård i Växjö.

*chrysitis* L. *ab. inuncta* TUTT. Tämmligen allmän. Huvudformen ser ut att saknas i Växjötrakten, åtminstone hava alla exemplar, som jag tagit — och dessa äro ej få — tillhört ovannämnda form.

*festucae* L. Tämmligen sällsynt. Synes uppträda i två generationer, den ena i juli och den andra i september. Den 8/9 14 togs en nykläckt ♂, som är anmärkningsvärd för sin ringa storlek, endast 29 mm. mellan vingpetsarna. Möjligen äro höstexemplaren mindre.

*pulchrina* Hw. Ej sällsynt. En 22/6 14 tagen ♂ hör till *ab. percontatrix* AURIV.

*iota* L. Ej sällsynt. En 18/6 13 tagen ♂ hör till *ab. percontationis* TR.

*gamma* L. Arten i fråga, som 1915 varit mycket allmän från tidigt på sommaren till i september, har av mig här i

Växjötrakten förut anträffats endast 1911 och 1914, och då sällsynt.

*interrogationis* L. Tämligen allmän. Uppträder ofta såsom *ab. flammifera* HUENE.

#### Euclidia O.

*mi* CL. Allmän.

*glyphica* L. Allmän.

#### Catocala SCHRK.

*fraxini* L. Av mig tagen endast i september 1914, då jag på lockbete erhöll 4 individ. Arten var detta år ej sällsynt.

*promissa* ESP. Ett individ taget i Skruf <sup>30</sup>/<sub>7</sub> 14 på lockbete.

#### Parascotia HB.

*fuliginaria* L. Sällsynt. 2 ♂♂ i Notteryd i mitten av juli 1912.

#### Zanclognatha LD.

*tarsipennalis* TR. Allmän.

#### Standfussia SPUL.

*emortualis* SCHIFF. Sällsynt. Endast 2 ♀♀ i juli 1915. De hålla bägge 26,5 mm. mellan vingspetsarna. Max. enl. »Nordens Fjärilar» 24 mm. (Artens släktnamn: Enl. AURIVILLIUS *Sophronia* GUEN., enl. LAMPA och KLÖCKER *Zanclognatha* LD. och enl. ZEITZ *Aethia* HB.)

#### Pechypogon HB.

*barbalis* CL. Ej sällsynt 1915. Troligen har artens frekvens varit densamma de föregående åren, ehuru den blivit av mig förbisedd.

#### Bomolocha HB.

*fontis* THNBG. Rätt allmän. En ♂ av *ab. terricularis* HB. tagen <sup>9</sup>/<sub>9</sub> 14. Den sena flygtiden anmärkningsvärd.

**Hypena** TR.*proboscidalis* L. Allmän.**Tholomiges** LD.

*turfosalis* WK. 3 ♂♂ tagna  $\frac{22}{7}$  15 i Räfte. Av dessa hava två exemplar alla vingarnas grundfärg mörkt grå och teckningen otydlig, medan det tredje har framvingarna ljusare, rödaktigt grå med tydlig teckning och bakvingarna mörkgrå. I »Nordens Fjärilar» och av SPULER omnämnes arten såsom ännu ej funnen i Sverige, men sedermera har den anträffats i Skåne samt i Hofmantorp och Urshult inom Kronobergs län.

XVII fam. **Cymathophoridae.****Thyatira** O.*batis* L. Ej sällsynt i juni 1914 och 1915.**Cymathophora** TR.*flavicornis* CL. (= *or* F.). Allmän.

*fluctuosa* HB. Sällsynt. Endast 2 ♂♂ tagna  $\frac{2}{7}$  14 och  $\frac{30}{6}$  15, bägge på »Köder».

*duplaris* L. Mycket allmän.**Polyploca** HB.*cinerea* GOEZE. Allmän i april.XVIII fam. **Brephidae.****Brephos** O.*parthenias* L. Allmän.XIX fam. **Geometridae.****Geometra** L.*papilionaria* L. Tämligen allmän.**Nemoria** HB.*putata* L. Allmän.*lactearia* L. Allmän.

## Acidalia Tr.

*similata* THNBG. Allmän i juli, en ♂ <sup>1</sup>/<sub>8</sub>.

*dimidiata* HUFN. Ej allmän. 2 ♂♂ och 1 ♀ resp. <sup>27</sup>/<sub>7</sub> 12, <sup>13</sup>/<sub>7</sub> 14 och <sup>20</sup>/<sub>8</sub> 15. Det ej avflugna ♀-exemplarets sena flygtid tyder på en andra generation. I SEITZ' »Die Gross-Schmetterlinge der Erde» omnämner L. B. PROUT, som behandlat matarna inom den palearktiska avdelningen, att arten i fråga »erscheint im Juni und Juli, eine etwaige zweiter Generation später».

*virgularia* HB. Allmän. ♂♂ synas vara betydligt mindre än ♀♀. Jag har 4 ♂♂, som mäta resp. 15, 15, 16,5 och 17 mm., medan ♀-exemplaren hålla ungefär 20 mm. Avbildningarna hos SPULER visa ♂ ej fullt 15 och ♀ 27 mm. Ett av ♂-exemplaren torde höra till *ab. obscura* MILL. med rökgrå vingar och tämligen tydlig teckning.

*pallidata* BKH. Åtminstone 1915 rätt allmän. Från de föregående åren har jag endast en ♀, tagen <sup>17</sup>/<sub>6</sub> 11. Troligen har den även dessa år ej varit sällsynt, ehuru jag förväxlat den med andra arter av släktet.

*deversaria* Hs. Sällsynt. En <sup>22</sup>/<sub>7</sub> 15 i Räppe tagen ♂ har jag fört till denna art och ej till *inornata* Hw. på grund av den tydliga teckningen och de vid roten av framvingarnas fransar vid ribbornas ändar befintliga, tydliga små fläckarna. Exemplaret i fråga har dock ej framvingarnas utkant jämt bågböjd, utan den är något insvängd mellan spetsen och ribban 4. Vingarna äro starkt glänsande.

*aversata* L. Huvudformen är på långt när ej så vanlig som *ab. spoliata* STGR. (= *ab. remutata* L.), vilken kan sägas vara mycket allmän.

*emarginata* L. Allmän.

*incanata* L. Allmän.

*fumata* STPH. Skiljer sig ej i något avseende från i Norrbotten tagna exemplar. Arten är allmän.

*remutaria* HB. Allmän. En ♀ har 27 mm. spännvidd.

*immutata* L. Allmän.

## Codonia HB.

*pendularia* CL. Ej sällsynt. På en den <sup>5</sup>/<sub>7</sub> 13 tagen ♀

är den ringformiga diskfläcken å framvingarna endast mycket svagt antydd.

*punctaria* L. Sällsynt. En ♀  $^{18}/_6$  13.

*linearia* HB. Sällsynt. En ♂  $^{11}/_6$  11.

#### Rhodostrophia HB.

*vibicaria* CL. Sällsynt. 2 ♂♂ och 1 ♀ resp.  $^{1}/_7$  12,  $^{18}/_6$  13 o.  $^{7}/_7$  12.

#### Lythria HB.

*purpuraria* L. I SEITZ' »Die Gross-Schmetterlinge der Erde» anföras två säkert skilda arter *purpuraria* L. (= *cruentaria* HUFN.) och *purpurata* L. (= *cruentaria* GUEN.), vilka sägas ofta hava förväxlat med varandra. Enligt där anförda beskrivningar på dessa huvudformer skall *purpuraria* hava framvingarna gula, mer eller mindre olivfärgade och försedda med två rosafärgade tvärband, det ena nära vingroten ofullständigt, det andra i vingens yttre hälft, tämligen smalt. Även förefinnes mycket ofta »ein kurzes und unterbrochenes mittleres nach der Costa zu». Bakvingarna äro livligt orange-gula, i inkanten tämligen smalt olivgrå, fransarna rosa, för övrigt utan teckning eller blott med en svag tvärlinje. På bakvingarnas undersida framträder vanligen en fullständig rosafärgad linje. Denna är på framvingarnas undersida för det mesta reducerad till en framkantsfläck. *Purpurata* är mindre, har något kortare, vanligen mycket livligare färgade vingar, ett tvärband nära roten och dessutom två andra tvärband. Dessa äro för det mesta helt och hållet sammanflytande eller förenade med varandra utom i framkanten, där en gaffelförgrening förefinnes, så att bägge banden bilda ett enda, betydligt brett band. Framvingarnas grundfärg stöter vanligen mera i grönt. Det purpuröda på bakvingarnas undersida är »meist sehr ausgedehnt». Vidare anföras olikheter mellan de bägge arterna i fråga om ♂♂ könsapparat. »Die beiden Arten werden von LASPEYRES richtig unterschieden und von DUPONCHEL als wahrscheinlich gute Arten anerkannt und neuerdings (1905 und 1907) sehr klar durch DAMAISON bearbeitet, aber unter GUENÉE's irrümlicher Nomenclatur».

Bägge de anförda formerna äro sommargenerationer. Såsom vårgenerationer för *purpuraria* anföras: *deceptaria* VILL. (= *abstinentaria* FUCHS.) med nastan enfärgade, mörka, huvudsakligen svartaktigt olivgröna framvingar, vilken form vanligen är mindre än sommarformen, och den i Lappland ensamt förhärskande *sordidaria* ZETT., »das minder extreme i Brut, die Bänder sind vorhanden, aber unscharf, dunkel und trüb». Vårgenerationen av *purpurata* benämnes *demaisioni form. nov.* Den är avsevärt mindre än *deceptaria*, och teckningen, om den förefinnes, uppvisar liknande kännetecken som sommargenerationen. *Mevesi Lampa* anføres såsom ab. av *purpuraria*, och *rotaria* F. såsom »fast sicher eine Aberration von *purpurata*», med framvingarnas innersta tvärband skenbart försvunnet och den gula undersidan utan teckningar. PROUT säger sig icke kunna förstå, huru *rotaria* kommit att utgöra benämning för vårgenerationen av *purpuraria*.

Mina fyra Växjö-exemplar av fjäriln i fråga hava följande utseende:

1 o. ♀, 22 mm.,  $1\frac{3}{7}$  13. Framvingarnas grundfärg mörkt olivgul, tydligt stötande i grönt, de klart rosafärgade tvärbanden tydliga, breda, det innersta sträckande sig från framkanten till något över vingens mitt, det yttre vid framkanten otydligt gaffelgrenat, fransarna av samma klara färg som tvärbanden. Bakvingarna orangegula med bred, inåt avtagande mörk schattering av samma färg som framvingarnas grundfärg, i övrigt utan teckning och med rosenröda fransar. Vingarnas undersida ljusare orangegula, framvingarna utan andra teckningar än rosenröda fläckar i framkanten, motsvarande gaffelgrenarna å ovansidan, och bakvingarna med två smala tvärband av samma färg, det ena, tämligen svagt, över vingens mitt och det andra utanför, tydligt och skarpt begränsat, intetdera bandet nående inkanten. Exemplaret i fråga bör således hänföras till sommargenerationen av *purpurata* L.

2 o. ♀, 22 mm.,  $1\frac{8}{7}$  12. Vingarnas grundfärg orangegul, framvingarna en hårsman mörkare än bakvingarna, ett endast i framkanten synligt tvärband nära roten och ett smalt, men vid framkanten tydligt gaffelgrenat sådant nära framvingens utkant. Framvingarna vid roten och bakkanten samt bak-

vingarna vid inkanten svagt schatterade i grågrönt. Fransar röda. Undersidan ljust orangegul, framvingarna med en röd fläck i framkanten, motsvarande tvärinjens yttre gaffelgren å ovansidan, och bakvingarna med ett i framkanten gaffelgrenat smalt tvärband, som mot inkanten upphör vid ribban 1 b, tydlig röd diskpunkt å diskfältets tvärribba mellan fältets främre hörn och ribban 5. Detta skulle då vara sommar-generationen av *purpuraria* L.

3:0. ♂, 19 mm.,  $\frac{19}{5}$  12. Framvingarnas grundfärg grönaktigt olivgul, tydligt glänsande, från den svartaktiga roten utåt småningom ljusare, två tydliga, rosafärgade tvärband, det inre smalt, sträckande sig från framkanten till något över vingmitten, det yttre brett, tydligt gaffelgrenat, med den inre grenen i själva framkanten åtminstone dubbelt så bred som den yttre. Fransarna röda. Bakvingarna ljust orangegula, inkantshälften svart, utåt ej skarpt begränsad, i övrigt utan teckningar. Undertill äro vingarna ljust orangegula förutom vid roten och bakvingarnas inkant, där de äro svarta. De enda teckningarna å undersidan utgöras å framvingarna av två svagt utvecklade fläckar i framkanten, motsvarande gaffelförgreningen å ovansidans tvärband, och å bakvingarna av ett vid framkanten brett grenat, smalt tvärband, som mot inkanten ej sträcker sig längre än till ribban 3. Alla vingarna, både ovan och undertill, i synnerhet fransarna, ganska starkt glänsande. Detta exemplar torde böra hänföras till värgenerationen *demaisoni* PROUT.

4:0. ♂, 20 mm.,  $\frac{6}{6}$  12. Framvingarna mörkt gråbruna, stötande i grönt, tvärbanden mycket breda, otydligt begränsade, det inre avkortat och det yttre i framkanten ej förgrenat, vingroten svartaktig, utåt småningom ljusare. Bakvingarna ovan såsom hos 3:0. Vingarnas undersida såsom hos 3:0, dock är bakvingarnas tvärband brett och sträcker sig mot inkanten in på fältet 1 b. Ovansidan glanslös. Bör även föras till *demaisoni* PROUT.

*Purpurata*-formerna äro ej sällsynta, vilket däremot torde vara fallet med *purpuraria* och dess avarter.

**Ortholitha** HB.

*cervinata* SCHIFF. Endast en ♀ anträffad, nämligen  $\frac{9}{9}$  15. Möjligen är arten ej så sällsynt, ehuru den blivit förbisedd på grund av likheten med följande art. Föres av AURIVILLIUS till *Earophila* GUMPPENB. och upptages av PROUT i SEITZ'ska verkets text såsom den enda arten av släktet *Larentia* TR.

*limitata* SC. Mycket allmän.

**Anaitis** DUP.

*paludata* THNBG. Tämligen sällsynt. En  $\frac{24}{7}$  tagen ♂ hör till *f. imbutata* HB. (= *sororiata* TR.) med vitaktig grundfärg, alla tvärlinjerna brett bruna och yttre mellanfaltet från ribban 3 till framkanten uppblandat med rostrött.

**Lobophora** CURT.

*carpinata* BKH. Mycket allmän i april. En  $\frac{17}{4}$  14 tagen ♂ hör till *ab. fasciata* PROUT med alla tvärlinjerna breda, gråsvarta, färgen i övrigt normal. En ♀  $\frac{26}{4}$  12 är en tydlig *ab. unifasciata* RBL, hos vilken form de breda, inre och yttre tvärlinjerna sammanflutit, så att de bilda ett tvärband över vingens mitt, endast i framkanten och helt obetydligt i bakkanten skilda från varandra.

*halterata* HUFN. Sällsynt. Två ♀♀  $\frac{6}{6}$  13 och  $\frac{14}{6}$  15. Den förstnämnda av dessa hör till *ab. zonata* THNBG med skarpt framträdande skillnad mellan det mörka rotältet och det ljusa, delvis guldpradade, endast med ett par fläckar i framvingens fram- och bakkanter tecknade mittfaltet.

*sexalata* RETZ. Denna art, som förut om åren endast anträffats i enstaka exemplar, var 1915 mycket allmän från början av juni till slutet av juli. Mina 4 ♂♂ äro mindre än som angives i »Nordens Fjärilar», i det de mäta endast 19,5, 18,5, 18 och 17,5 mm. största vingbredd. Mellan vingpetsarna äro de cirka 1 mm. mindre.

**Operophtera** HB.

*boreata* HB. Mycket allmän. En ♂ har 33,5 mm. vingbredd.

*brumata* L. Mycket allmän.



**Triphosa** STPH.

*dubitata* L. Sällsynt. En ♂ <sup>9</sup>/<sub>9</sub> 14 och en ♀ <sup>25</sup>/<sub>9</sub> 15. Den förstnämnda torde höra till *ab. cinerata* STPH. Den har 37 mm. vingbredd, inre tvärinjen å framvingarna så gott som utplånad mellan bakre diskribban och bakkanten och saknar nästan helt och hållet de många våglinjer, som i mittfaltet och vingens inre del förefinnas hos typformen. Exemplet stämmer även med den i SEITZ'ska verket befintliga avbildningen av ifrågavarande form.

**Eucosmia** STPH.

*undulata* L. Allmän.

**Lygris** HB.

*prunata* L. Allmän.

*testata* L. Allmän.

*populata* L. Allmän. En ♀, tagen <sup>17</sup>/<sub>6</sub> 14, har regementsläkaren L. TRAFVENFELT, som haft exemplaret till granskning, under hänvisande till »Entom. Nachrichten 1900, pag. 225», bestämt till *f. lutea* STRAND. Exemplet i fråga är nästan enfärgat gult med högst obetydlig anstrykning av brunt i mittfaltet och en tydligare sådan under vingspetsens snedstreck, rotvärinjen mycket otydlig, de bägge andra tvärinjerna, särskilt den yttre, jämte snedstrecket i vingspetsen tydliga, mycket smala, framvingarna i övrigt utan teckningar, de enfärgade fransarna vid roten av vingens färg, men utåt mörkbruna. Bakvingarna enfärgat gulvita, utan teckningar, fransarna vid roten mörkare än vingen, men utåt vita. Detta fjärilns utseende stämmer ej riktigt med beskrivningen av *ab. lutea* STRAND i »Die Gro-s-Schmetterlinge der Erde», där först *ab. dotata* L. och sedan *lutea* kännetecknas på följande sätt: *Dotata* »unterscheidet sich (fr. huvudformen) durch einförmigere Färbung, etwas die von *mellinata* (= *associata* BKH) wiederholend; das Mittelfeld der Vflgl ist zwar an seinen Grenzen scharf gezeichnet, schliesst aber keine dunkle Füllung ein». *Lutea* »soll die vorwiegende Form im arktischen Norwegen sein, sie ist extremer entwickelt als *dotata*. Die Vflgl fast einförmig rein gelb, nur die Postmedianlinie (yttre

tvärlinjen) scharf angedeutet und sogar diese zuweilen fast verloschen; Hflgl weisslich, fast oder ganz zeichnungslos». Enligt dessa beskrifningar borde mitt exemplar snarare höra till *ab. dotata* L. Denna form bör ej förväxlas med den *dotata* L., som i »Nordens Fjärilar» upptages såsom egen art av släktet *Lygris* och hos SPULER föres under *Larentia*. Denna art, som hos SEITZ benämnes *pyraliata* SCHIFF och föres till *Lygris*, betecknas enligt PROUT oriktigt med *dotata* L. i st. f. *dotata* STGR.

Även en annan ♀, tagen  $^{22}/_7$  II, har samma utseende som den nu beskrivna, ehuru exemplaret är avflugit och dåligt.

Av huvudformen har jag ingen ♀, däremot II ♂♂. Detta beror väl på en tillfällighet, eller männe ♀♀ äro sällsyntare?

*associata* BKH. Ej sällsynt, men på långt när ej så vanlig som *testata* och *populata*.

#### Larentia TR.

*ocellata* L. Ej sällsynt.

*bicolorata* HUFN. Ej sällsynt, något allännare än *ocellata*.

*variata* SCHIFF. Ej sällsynt. En ♂ och en ♀, resp.  $^{24}/_6$  15 och  $^{30}/_6$  13, tillhöra *v. obeliscata* HB, vilken form hos SEITZ upptages såsom egen art. Den förstnämnda mäter 23,5, ♀ exemplaret däremot 28 mm. En ♀ av huvudformen mäter 29 mm. Max. enl. »Nordens Fjärilar» 25 mm.

*cognata* THNBG. Ej sällsynt

*juniperata* L. Allmän. Två ♂♂ höra till *ab. divisa* STRAND med mittbandet på ett eller flere ställen genomskuret av grundfärgen.

*siterata* HUFN. Tämligen allmän.

*miata* L. Mycket allmän såväl på hösten som på våren. En  $^{21}/_{10}$  13 tagen ♀ har framvingarnas grundfärg klart mörkgrön och bakvingarna mörkt gråbruna med grönpudrade ribbor och utkant. På hösten ha för det mesta ♂♂ anträffats, om våren däremot ♀♀.

*truncata* HUFN. och *immanata* Hw. Enligt lektor E. WAHLGREN, som benäget granskat mina 19 *truncata*- och

*immanata*-exemplar från Växjö, höra 8 med säkerhet till den förra arten, därav två hänföres till *ab. perfuscata* HW, två »med stor sannolikhet» till *ab. mediorufaria* FUCHS och de övriga till *f. principalis*. Tre individ äro säkra *immanata*, men beträffande de övriga kan lektor W. ej med bestämdhet säga till vilkendera arten de höra.

*firmata* HB. Av denna art har jag vid Växjö tagit 4 ♂♂ i september 1914 och en ♂ i september 1915. Den är förut hos oss tagen av THEDENIUS vid Stockholm, 1895 av PEYRON på Lidingön, 1896 av J. MEVES på Värmdö och 1908 av LJUNGDAHL vid Stockholm.

*munitata* HB. Sällsynt. Det enda Smålandsexemplar jag har i behåll, ♂ <sup>17</sup>/<sub>7</sub> 12, Notteryd, skiljer sig från av mig i Pajala i arktiska Norrbotten tagna ♂♂ endast i det avseendet, att å Smålands-exemplaret den i fläckar upplösta våglinjen är fullt tydlig, medan den i Pajala-exemplaren knappast är märkbar. I likhet med J. MEVES' exemplar (Ent. Tidskr. 1914, sid. 132) hava mina 6 exemplar från Pajala liksom ock Smålands-exemplaret rotfältet av samma färg som inre mellanfältet, men rottvärmlinjen är å de flesta exemplaren åtminstone vid framkanten tydlig.

*viridaria* F. Allmän.

*fluctuata* L. Allmän. En ♂ har mittbandet tydligt ända till bakkanten, ehuru bandets bakre hälft är mycket ljusare än den främre.

*didymata* L. Mycket allmän.

*montanata* BKH. Allmän.

*suffumata* HB. Två ♂♂ tagna <sup>8</sup>/<sub>5</sub> 15. Arten var detta år ej sällsynt i Växjö omgivningar. Förut ej anträffad. Nämnda exemplar äro mycket större än av mig i Pajala tagna ♂♂, vilkas framvingar ej mäta mera än 14 mm. i längd, medan Växjö-exemplaren hålla 16 mm. (Pajala-exemplaren torde tillhöra den från Nordskandinavien bekanta, betydligt mindre, i allmänhet svagt tecknade och med ljusare bakvingar försedda formen *defumata* STICH.).

*ferrugata* CL. Allmän.

*unidentaria* HW. Sällsynt. En ♂ <sup>16</sup>/<sub>6</sub> 15 och två ♀♀ resp. <sup>7</sup>/<sub>8</sub> 11 och <sup>16</sup>/<sub>7</sub> 15.

*designata* ROTT. En ♀ <sup>22</sup>/<sub>7</sub> 11.

*vittata* BKH. Ej sällsynt.

*dilutata* BKH. Mycket allmän. Uppträder ofta som *ab. obscurata* STGR. En ♂  $\frac{6}{10}$  13 är ovanlig. Den har framvingarna entonigt ljusgrå, något mörkare vid roten, och alla tvärlinjer, utom ett par vid utkanten, högst otydliga. Liknar nästan helt och hållet, med undantag av beträffande färgen, *ab. schneideri* LAMPA, som jag har från Norrbotten och som har framvingarna svartgrå.

*autumnata* BKH. Tämligen allmän. Då skillnaden mellan *dilutata* och *autumnata* synes vara högst obetydlig och säkert kunna fastställas allenast vid granskning på fri-ka exemplar av ♂♂ genitalapparat, är det ju möjligt, att det vid närmare undersökning befinnes, att den sistnämnda arten är lika ofta förekommande härstädes som den förra. Av PROUTS utredning synes till och med som om *autumnata* skulle vara den i Skandinavien i övervägande antal förekommande.

*caesiata* LANG. Allmän.

*sociata* BKH. Allmän.

*albicillata* L. Sällsynt. En ♀  $\frac{22}{6}$  14.

*alchemillata* L. Allmän. Det vita bandet å framvingarna brukar ju ofta vara svagt utvecklat i fält 2 och kring ribban 3, men 1915 inträffade det egendomliga förhållandet, att på alla av mig fångade exemplar detta i särskilt hög grad var fallet. På somliga exemplar var nämnda band till och med helt och hållet avbrutet. Spännvidd ned till 16 mm.

*albulata* SCHIFF. Mycket allmän.

*obliterata* HUFN. Sällsynt. Endast en gång anträffad nämligen  $\frac{30}{6}$  15, då en kraftigt mörkpudrad ♂ togs.

*luteata* SCHIFF. Allmän.

*bilineata* L. Mycket allmän.

*sordidata* F. Mycket allmän. *Abb. fuscoundata* DON. och *infuscata* STGR. synas vara lika allmänna som huvudformen. En den  $\frac{22}{7}$  14 tagen ♀, 32 mm. spännvidd, har framvingarnas grundfärg överallt tämligen klart mörkgrön med ett av två svarta s-formiga linjer bestående tvärband i vingens inre del, ett oregelbundet svart, av den vanliga vita fläcken omkring ribban 4 avbrutet band nära utkanten och mellan dessa båda band två vinkliga svarta tvärlinjer, som äro tydliga endast från framkanten och inåt diskfältet. Framvingarna

för övrigt vattrade av små, fina, svarta tvärstreck och punkter. Exemplaret i fråga överensstämmer helt och hållet i fråga om teckningen med den i SEITZ'ska verket befintliga avbildningen av *furcata* THNBG, med undantag av att den stora vita fläcken kring ribban 4 saknas å avbildningen. *Furcata* THNBG är hos SEITZ upptagen såsom huvudform med *sordidata* F., *fuscoundata* (DON.) STGR. och *obscura* PEYER (= *infuscata* STGR.) m. fl. såsom aberrationer. Typformen skall vara askgrå med mörka band. En ♂, <sup>20</sup>/<sub>7</sub> 12, närmar sig *ab. constricta* STRAND, i det det ljusa mittfältet framträder endast såsom en rund vit fläck omedelbart utanför diskfältet och en avlång sådan från ribban 4 till ribban 1 b.

*autumnalis* STRÖM. Ej sällsynt. Var i slutet av maj 1915 allmän. Jag har från Växjö 5 ♂♂ och en ♀, som alla nästan fullständigt likna den hos SEITZ avbildade *Cidaria ruberata* FRR. *ab. variegata* PROUT, men på grund av byggnaden hos ♂♂ ryggtagg har jag här fört dem till *autumnalis*. Största spännvidd 34 mm., enl. »Nordens Fjärilar» 30 mm.

*silaceata* HB. Sällsynt. En ♀ av huvudformen tagen <sup>2</sup>/<sub>6</sub> 13. Denna har ej bakre diskribban samt ribborna 2 och 3 ljusa såsom fallet är med *ab. insulata* HW., av vilken form jag erhållit två ♂♂ <sup>15</sup>/<sub>6</sub> och <sup>18</sup>/<sub>6</sub> 13. ♀ exemplaret har å undersidan alla vingarna försedda med en skarpt tecknad tvärlinje, bestående av kraftiga, svartbruna trekantfläckar, och dessutom två smala tvärlinjer innanför denna. Ehuru ♂ exemplaren äro mera avflugna, synes dock, att denna teckning hos dem ej varit så framträdande.

*corylata* THNBG. Allmän. Två exemplar tillhöra *ab. ruptata* HB. med mittbandet i fältet 1 b delat av vitt. Denna form synes hava ungefär samma frekvens som huvudformen. *comitata* L. Allmän.

#### Tephroclystia HB.

*oblongata* THNBG. Sällsynt. En ♀ <sup>5</sup>/<sub>7</sub> 13.

*pusillata* SCHIFF. Ej sällsynt i slutet av maj och början av juni.

*conterminata* Z. Denna art var 1912 allmän i slutet av maj. Troligen har den de andra åren varit sällsynt, enär jag ej då tagit den.

*togata* HB. (= *abietaria* GOEZE). Allmän.

*assimilata* GN. Sällsynt. Ett exemplar kläckt  $19/4$  13  
ur en samma vår under mossa tagen puppa.

*absinthiata* CL. Sällsynt. En ♀  $17/7$  11.

*vulgata* HW. Mycket allmän.

*satyrata* HB. Ej sällsynt.

*succenturiata* L. Allmän. Av *v. subfulvata* HW. har jag  
endast anträffat en ♀  $3/7$  11.

*plumbeolata* HW. Flög allmänt i juni 1915. Förut ej  
anträffad.

*tenuiata* HB. Endast ett exemplar taget nämligen  $18/7$  12.  
Troligen sällsynt.

*nanata* HB. Allmän.

*sinuosaria* EV. Torde ej vara särdeles sällsynt. Tre  
exemplar tagna  $17/6$  11,  $6/7$  12 och  $18/7$  15. Jag har även  
tagit den å Långholmen i Stockholm  $5/6$  10.

*lanceata* HB. Mycket allmän i april och början av maj.

*sobrinata* HB. Mycket allmän. Den flyger ända in i  
mitten av september. En  $4/9$  15 tagen ♂ torde böra särskilt  
omnämnas på grund av sitt avvikande utseende. Mittfältet  
är i inre delen i framkanten, innanför den stora streckformiga  
diskfläcken och vidare mot bakkanten svartbrunt, därutanför  
tydligt vitt och i yttre delen i fältet 1 b, närmast ribban 2,  
samt i fälten 4, 5 och 6 likaledes svartbrunt. I dessa mörka  
delar av mittfältet äro ribborna svarta, varjämte *ribban 2 i  
hela sin sträckning tvärs över nämnda fält är kraftigt svart*.  
Yttre mellantältet från framkanten till ribban 6 är även svart-  
brunt, dock ej så starkt som i mittfältet. Innanför våglinjens  
vita fläck i anahörnet finnes en skarpt framträdande svart-  
aktig fläck, varjämte våglinjen i övrigt inåt begränsas av mörka  
fläckar mellan ribborna.

#### Chloroclystis HB.

*rectangulata* L. Mycket allmän. Uppträder ofta såsom  
*ab. nigrosericeata* HW.

#### Collix GN.

*sparsata* TR. Endast anträffad 1915, då 4 ♂♂ fångades  
i Bäckaslöf vid Växjö. De hava å bakvingarnas ovansida en

nära vingroten utgående lång svartbrun hårtofs, som ligger utefter främre diskribban och å spända exemplar döljes av framvingarnas mycket konvexa bakkant. Spännvidd: 22—23 mm.

#### **Epirrhantis** HB.

*diversata* SCHIFF. En ♂  $24/4$  13. Detta exemplar avviker ej i nämnvärd grad från i Pajala av mig tagna ♂♂. Det är dock något större och har ej så tydlig vit teckning vid tvärlinjerna i framkanten.

#### **Arichanna** MOORE.

*melanaria* L. Rätt allmän.

#### **Abraxas** LEACH.

*marginata* L. Mycket allmän. En  $16/6$  15 tagen ♀ bör kanske föras till *ab. nigrofasciata* SCHÖYEN, ehuru framvingarnas mittband är avbrutet i övre hälften av fältet i b. Däremot äro bakvingarna försedda med ett fullständigt, millimeterbrett, jämnt band mitt över vingen. Från Pajala har jag två exemplar av *nigrofasciata*, av vilka det ena har mittbandet sammanhängande å alla vingarna, medan det å det andra exemplaret är å framvingarna fullständigt, ehuru i mitten av fältet i b mycket smalt, men å bakvingarna avbrutet vid mitten av diskfältets tvärribba. Avbildningen av nämnda form hos SEITZ, där tvärbandet är brett avbrutet både å fram- och bakvingarna, är väl felaktig, då i texten står: »das Mittelband, wenigstens auf dem Vflgl vollständig, das Saumfeld wie sonst».

Om mitt exemplar skall få gälla för en *nigrofasciata*, har genom detta fynd dess sydgräns i Sverige, som förut varit Stockholmstrakten (J. MEVES), betydligt nedflyttats.

#### **Bapta** STPH.

*temerata* HB. Endast anträffad  $29/5$  14, då en ♀ togs i Bäckaslöf. Enl. »Nordens Fjärilar» är den förut tagen i Skåne och Östergötland.

**Deilinia** HB.

*pusaria* L. Mycket allmän. En  $\frac{4}{6}$  II tagen ♂ hör till *ab. ablataria* FUCHS med nästan utplånade tvärlinjer. Endast om man håller fjäriln i ett visst läge i förhållande till ljuset, synes å framvingarna en antydning till två och å bakvingarna till en linje. Exemplaret är ej det minsta avfluget.

*exanthemata* SC. Mycket allmän.

**Numeria** DUP.

*pulveraria* L. Var i slutet av maj 1914 och 1915 rätt allmän. Förut hade jag anträffat arten endast en gång nämligen  $\frac{28}{5}$  II, då en ♂ togs. En ♂ har 36 mm. spännvidd. Max. enl. »Nordens Fjärilar» 32 mm.

**Ellopia** TR.

*prosapiaria* L. Ej sällsynt. Endast ♂♂ anträffade.

**Metrocampa** LATR.

*margaritata* L. Två ♂♂ tagna  $\frac{4}{7}$  II i Lilla Fylleryd, cirka 4 km. fr. Växjö.

**Ennomos** TR.

*alniaria* L. Ej sällsynt 1913, 1914 och 1915. Endast ♂♂ tagna.

**Selenia** HB.

*bilunaria* ESP. Rätt allmän. ♂♂ synas vara betydligt allmännare än ♀♀, åtminstone har jag ej lyckats erhålla flera än 2 ♀♀, ehuru jag tagit ett avsevärt antal av fjäriln i fråga. Den ena av dessa ♀♀,  $\frac{15}{5}$  I4, har å framvingarna den bredare och mattare mittlinjen sammanfluten med inre tvärlinjen till ett mot bakkanten avsmalnande band, således en motsvarighet, fast i annan riktning, till *ab. infuscata* STRAND, som har mellanrummet mellan mittlinjen och *yttre* tvärlinjen utfyllt.

*tetralunaria* HUFN. Sällsynt. Tre ♂♂  $\frac{31}{5}$  I4.



**Gonodontis HB.**

*bidentata* CL. Tämlichen sällsynt. Två ♂♂  $^{31/5}$  14 och en ♂  $^{11/6}$  15.

**Himera DUP.**

*pennaria* L. Sällsynt. Två ♂♂  $^{2/10}$  14 och  $^{23/9}$  15.

**Crocallis TR.**

*elinguaria* L. Ej sällsynt.

**Angerona DUP.**

*prunaria* L. Allmän. En  $^{28/6}$  15 tagen ♂ hör till *ab.*  
*sordjata* FUESSL. Dess bakvingar äro nästan helt och hållet mörkbruna. En ♀ med mycket fin, gles punktering bildar övergång till *ab. spångbergi* LPA.

**Eurymene DUP.**

*dolabraria* L. Sällsynt. Tre ♂♂  $^{31/5}$  14,  $^{15/6}$  och  $^{16/6}$  15.

**Opisthograptis DUP.**

*luteolata* L. Allmän. Arten synes uppträda i två generationer. Jag har funnit en övervintrande puppa, som kläcktes i bur  $^{28/3}$ . Dessutom har jag fångat fjäriln i maj, juni, den  $^{13/7}$  och den  $^{9/9}$ . Spännvidd ända till 40 mm.

**Epione DUP.**

*apiciaria* SCHIFF. Tämlichen sällsynt.

*parallelaria* SCHIFF. (= *vespertaria* THNBG). Allmännare än föregående art. Flyger långt in i september. Ett exemplar  $^{26/9}$  15.

**Semiothisa HB.**

*notata* L. Mycket allmän.

*alternaria* HB. Endast en ♀  $^{22/6}$  11. Troligen sällsynt.

*litorata* CL. Denna art, varav jag förut endast anträffat en ♀  $^{1/7}$  12 i Notteryd, var i slutet av maj och i juni 1915 allmän vid Växjö.

**Hibernia** LATR.

*aurantiaria* ESP. Sällsynt. Två ♂♂ <sup>15</sup>/<sub>10</sub> 12 och <sup>6</sup>/<sub>10</sub> 14.

*defoliaria* CL. Sällsynt. Två ♂♂ <sup>12</sup>/<sub>10</sub> 12 och <sup>12</sup>/<sub>10</sub> 13.

**Phigalia** DUP.

*pedaria* F. Endast anträffad 1915, då jag i mitten av april fängade 3 ♂♂.

**Biston** LEACH.

*hirtarius* CL. Endast 2 exemplar anträffade, bägge döda, torkade, ehuru fullt oklanderliga, det ena, en ♀, liggande å en gata i Växjö <sup>28</sup>/<sub>4</sub> 14 och det andra, en ♂, å centralfängelsets vägg inne i staden <sup>26</sup>/<sub>4</sub> 15.

**Amphidasis** TR.

*betularia* L. Sällsynt. Endast en gång anträffad nämligen i april 1913, då en övervintrande puppa hittades. Fjäriln, en liten ♂, framkom <sup>3</sup>/<sub>5</sub>. Arten föres hos SEITZ till *Biston*.

**Boarmia** TR.

*cinctaria* SCHIFF. Allmän. En mycket mörk ♂, tagen <sup>22</sup>/<sub>4</sub> 14, torde höra till *f. nigraria* RBL, varom PROUT säger, att den egentligen är »ein Synonym, das sich auf die am meisten verschwärzten Exemplaren bezieht». En annan ♂, <sup>22</sup>/<sub>5</sub> 12, är en tydlig *ab. submarmoraria* FUCHS med framvingens mittfält vitt och de övriga fälten betydligt mörka. En <sup>17</sup>/<sub>5</sub> 12 tagen ♀ saknar det vita tvärbandet vid bakkroppens rot.

*repandata* L. Mycket allmän. Varierar ofantligt. Den härstädes vanligaste formen har mellan yttre tvärinjen och våglinjen en stor, starkt framträdande, skarpt begränsad, fyrkantig svartbrun fläck, som täcker hela fältet 3 och mera än halva fältet 4. Denna fläck, som är synnerligen karakteristisk, finnes i beskrivningarna på de olika formerna omnämnd endast för *f. deversata* STGR och *ab. maculata* STGR. Hos SEITZ beskrives den förra på följande sätt: »ähnlich der *conversaria*; Grundfarbe graulich, Mittelband hinten schmaler, distal von einem rundlichen, schwarzen Fleck (hinter der 2

Radialis) gefolgt». Då *ab. conversaria* HB. har svart mittfält, vilket ej är fallet med den här vanliga formen, som har största delen av nämnda falt av samma ljust gråaktiga grundfärg, som vingen i övrigt, kan här ifrågasättande form ej vara *deversata*. *Ab. maculata* STGR, som av PROUT på grund av olikheter hos ♂♂ genitalia upptages såsom egen art, beskrives hos SPULER såsom »aschgrau, fast gar nicht dunkel bestäubt, mit breitem schwarzem Mittelschatten nach der ersten Querlinie der Vflgl und solchem Flecken im Saumfelde». *Maculata* finns enl. PROUT endast i Sibirien och Amurlandet. Dess europeiska form benämnes *bastelbergeri* HIRSCHKE, »variabel, aber im Allgemeinen grösser und kräftiger gezeichnet», skild från *repandata* »durch die weniger geknickte Antemedianlinie, durch den starken Mittelschatten, der dieser gewöhnlich genähert ist, und durch die kräftigeren Zeichnungen der Unterseite. ♀ oberseits weniger charakteristisch, Mittelschatten weniger dick, mehr distal gelegen». Denna beskrivning stämmer bra med här ifrågasättande form. Någon olikhet mellan ♂♂ sidoklaffar hos denna form och hos huvudformen av *repandata* har jag på mina spända exemplar dock ej kunnat upptäcka.

*jubata* THNBG. Sällsynt. En ♀ <sup>11</sup>/<sub>7</sub> II.

*crepuscularia* SCHIFF. Jag har tillvaratagit 6 ♂♂, som jag förut bestämt såsom tillhörande denna art, men sedan jag tagit del av PROUTS i »Die Gross-Schmetterlinge der Erde» befintliga beskrivningar på denna och *B. bistortata* GOEZE, vet jag ej, till vilkendera arten exemplaren i fråga höra. Enl. PROUT bör *crepuscularia* vara ljusare än *bistortata*, enl. SPULER tvärtom. Enl. PROUT flyger den förra arten med endast en generation i maj och juni, den senare i mars och april, enl. SPULER infaller *crepuscularias* flygtid i april, maj och juli, augusti och *bistortatas* i juni. Enl. PROUT är *crepuscularia* »bestimmt viel weniger verbreitet als *bistortata*», som är vitt utbredd i Europa och Asien, enl. SPULER är *crepuscularia* allmän i mellersta och norra Europa (med undantag av polarregionen), under det att *bistortata* förekommer »in Mitteleuropa, sehr lokal, meist mit der vorigen Art (*crepuscularia*) verwechselt, häufiger und besser unterscheidbar in England».

Av mina 6 exemplar äro 3 ljusare och 3 mörkare, alla, utom ett av det ljusare slaget, vilket är fångat  $26/5$ , äro tagna i slutet av april.

*punctularia* HB. (= *scopularia* THNBG). Allmän.

**Gnophos** TR.

*sordaria* THNBG. Sällsynt. Två ♂♂  $23/6$  12 i Notteryd och  $11/6$  14 i Växjö. Överensstämma med mina exemplar från Norrbotten. Förut ej tagen sydligare än i Södertälje (J. MEVES).

*myrtillata* THNBG. Ej sällsynt i slutet av juli.

**Fidonia** TR.

*carbonaria* CL. Tre ♂♂  $3/5$  och  $16/5$  14. Förut på fastlandet ej funnen sydligare än i Uppland. Enl. LAMPA anträffad på Gottland.

**Ematurga** LED.

*atomaria* L. Mycket allmän.

**Bupalus** LEACH.

*pinarius* L. Mycket allmän. Fastän jag fångat minst ett 50 tal av arten i fråga, har jag ej lyckats få en enda ♀. Ett  $17/7$  15 taget individ har största vingbredden endast 24,5 mm. Minimum enl. »Nordens Fjärilar» 29 mm.

**Thamnonia** LD.

*wauaria* L. Allmän.

*brunneata* THNBG. Mycket allmän.

**Phasiane** DUP.

*petraria* HB. Sällsynt. En ♂  $26/5$  15. Å detta exemplar är den inre av framvingarnas två raka tvärlinjer i det närmaste utplånad. Endast i fältet ib synes en antydan till densamma.

**Perconia** HB.

*strigillaria* HB. Allmän.

XX fam. **Nolidae.**

**Nola** LEACH.

*cuculatella* L. Sällsynt. Två ♂♂  $3/7$  11 och en ♂  $18/7$  15.  
*confusalis* H.S. Endast ett individ anträffat, nämligen en ♂  $17/5$  14.

## XXI fam. Nycteolidae.

**Sarrothripus** CURT.

*revayanus* SC. (= *undulana* HB). Entonigt gråbrun med mittfältet mera rostbrunt, svarta tvärinjer och rödbrun diskfläck. En ♀ <sup>28</sup>/<sub>4</sub> 13. Av *ab. dilutana* HB har jag tagit en ♀ <sup>17</sup>/<sub>5</sub> 12. Den har grundfärgen vitgrå, mittfältet gråbrunt, vid framkanten renare brunt och med skarpa svarta streck från inre tvärinjen vid ribban 1 och i diskfältet. Diskfläcken gulröd. Av *ab. degenerana* HB har jag en ♂ <sup>25</sup>/<sub>7</sub> 14 från Räfte och två ♀♀ <sup>26</sup>/<sub>5</sub> 12 och <sup>11</sup>/<sub>6</sub> 15 från Växjö. Grundfärgen på dessa exemplar är vit med grönaktig anstrykning, rotfältet svart, mittfältet gråbrunt, vid inre tvärinjen och vid framkanten svart, den på insidan med svart kantade våglinjen samt övriga tvärinjer tydliga, utfyllda med vitt, inre mellanfältet brokigt av svarta fläckar och diskfläcken mörkt rödbrun. En <sup>30</sup>/<sub>4</sub> 13 tagen ♀ tillhör *ab. ramosana* HB. Den har grundfärgen gråbrun, från vingroten ett brett, ramsvart streck till diskfältets slut, från vilket streck i dess underkant tjocka grenar utgå nära roten och vid mitten, diskfläcken svart, utåt med ljus skuggning, våglinjen med dess inåt mörka begränsning antydd, likaså inre tvärinjen, fast svagare, eljest utan teckningar.

Dessutom har jag <sup>2</sup>/<sub>8</sub> 14 tagit en ♀, som jag icke kunnat inränga under någon annan form än *ab. ilicana* F. (= *punctana* HB), ehuru framvingarna i alla fälten hava den bruna färgen starkt uppblandad med djupsvarta, sammanflytande skuggfläckar, så att de få ett mörkbrokigt utseende. De för formen i fråga typiska stora, svarta punkterna, 2 i inre mellanfältet och 2 vid bakkanten å våglinjens plats, framträda emellertid tydligt, ehuru de, som finnas i inre mellanfältet, något beröra varandra och dessutom stå i förbindelse med den svarta bakkanten. Vid vingens framkant finnas hvita fläckar nära vingspetsen och i inre mellanfältet. Diskpunkten mörkt rödbrun med svart kärna. Exemplaret i fråga är något mindre (22 mm.) än de andra (24,5—26,5 mm.).

**Hylophila** HB.

*prasinana* L. Sällsynt. Larv, tagen <sup>13</sup>/<sub>9</sub> 14, blev fjäril <sup>27</sup>/<sub>3</sub> 15. En ♂ fångad <sup>12</sup>/<sub>6</sub> 15 och en ♀ <sup>16</sup>/<sub>5</sub> 15. ♀ antenner

skola ju vara nakna, men det av mig fångade ♀-exemplaret har dem försedda med tydliga borst, som synas vara likadana som hos ♂-exemplaret. Övriga könskännetecken överensstämma med i litteraturen befintliga beskrifningar.

### XXIII fam. Arctiidae.

#### Spilosoma STPH.

*mendica* CL. Sällsynt. Endast en ♂ och en ♀ erhållna, bägge genom uppfödning från larv.

*menthastris* ESP. Allmän. Två ♂♂, fångade  $12/6$  15, hava framvingarna särskilt rikligt svartpunkterade och avvika dessutom från andra exemplar därigenom att punkterna utanför diskfältet ändå från framkanten in på fältet i b bilda en blott av ribborna avbruten, jämt båghöjd, vid ribban 4 mest utskjutande tydlig tvärinje.

#### Phragmatobia STPH.

*fuliginosa* L. v. *borealis* STGR. Allmän som larv. Fjäriln anträffar man sällan.

#### Parasemia HB.

*plantaginis* L. Sällsynt. Tre ♂♂ juli 1912 i Notteryd och en ♀  $3/7$  13 i Vrankunge.

#### Diacrisia HB.

*sannio* L. Allmän. En  $10/7$  11 tagen ♂ närmar sig mycket *ab. moerens* STRAND, i det bakvingarna äro helt och hållet gråsvarta med undantag av ett band av den gula grundfärgen tvärs över vingens mitt och de gula ribborna. Hos *moerens* skall grundfärgen ej synas annat än såsom matta fläckar innanför det breda, sotsvarta utkantsfältet.

#### Arctia SCHRK.

*caia* L. Mycket allmän, åtminstone såsom larv. Ofta uppfödd till imago.

*aulica* L. Endast en gång anträffad nämligen  $9/5$  15, då en larv togs i Bramstorp på sälg. Den förpuppades  $20/5$ , och fjäriln, en ♂, framkom  $1/6$ .

**Nudaria** STPH.

*mundana* L. Allmän 1912 och 1915.

**Comacla** WLK.

*senex* HB. Allmän i början av juni 1912. Ej sällsynt vid samma tid 1915. En  $\frac{2}{7}$  15 i Bäckaslöf vid Växjö fångad ♂ avviker från övriga individ därigenom att den tvärs över hela framvingen i dess mitt har en bred, mörk, i diskfältet vinkligt utskjutande skugglinje.

**Endrosa** HB.

*irrorella* CL. Sällsynt. Endast tagen  $\frac{21}{7}$  14, då en ♂ anträffades invid Växjö.

**Cybosia** HB.

*mesomella* L. Mycket allmän.

**Lithosia** F.

*lurideola* ZINCK. Allmän i juli.

*lutarella* L. Sällsynt. Fyra ♂♂ tagna  $\frac{20}{7}$  12 i Notteryd, eljest ej anträffad. Spännvidd: 28,5—30 mm.

XXIV fam. **Anthroceridae.****Zygaena** F.

*lonicerae* ESP. Egendomligt nog synes denna art vara sällsynt i trakten av Växjö, ehuru lämpliga lokaler för densamma naturligtvis ej saknas. Åtminstone har jag ej i närheten av staden anträffat den vid något annat tillfälle än  $\frac{18}{7}$  15, då jag tog en ♂ och en ♀. Dessutom har jag  $\frac{3}{7}$  13 i Vrankunge tagit en nyss kläckt, i närheten av den på en ljungkvist fästade kokongen sittande ♂.

**Procris** F.

*statices* L. Allmän.

XXVII. fam. **Psychidae.**

**Acanthopsyche** HEYL.

*atra* L. (= *opacella* H.S.). Den  $9/5$  14 togs å en gärdesgård i Skir en med bladbitar och korta fina strån i längdriktningen belagd säck, 18 mm. lång, varur  $16/5$  en ♀ framkom.

**Sterrhopteryx** HB.

*hirsutella* HB. Sällsynt. En ♂ fångades i kvällsskymningen  $16/6$  13 i Hof invid Växjö. Såväl hos SPULER som hos SEITZ finnes längden på framvingen angiven till 9—10 mm., men detta exemplar, som är en säker *hirsutella*, har vingen 12 mm. lång. Arten är förut i vårt land tagen 1882 i Halsingland av RUDOLPHI (Ent. Tidskr. 1883 p. 37), 1891 av J. ANDERSSON i Värmland och 1911 av E. G. VRETLIND vid Enköping.

**Fumea** STPH.

*casta* PALL. (= *intermediella* BRD). Allmän.

**Talaeporia** HB.

*tubulosa* RETZ. Två larvsäckar tagna i juni 1915, varur framkommo en ♂  $26/6$  och en ♀  $30/6$ .

**Solenobia** Z.

*pineti* Z. Ur en d.  $13/5$  15 tagen larvsäck framkom d.  $15/5$  en ♂ och en annan ♂ fångades  $23/5$  15, vilka bägge ex. enl. TRAFVENFELT antagligen höra till denna art.

(Forts.)