

lika höga ribbor i ett lämpligt antal fack, helst av olika storlekar. Antalet fack bör nog ej vara för stort, ty om vederbörande vill hålla reda på de fjärlarna tillhörande tomma puppskalen, så faller detta sig nog annars rätt svårt, när exempelvis flera kläckningar inträffa samtidigt; bättre då att ha två eller flera burar. Vid detta ramverk fastlödes på den sida, som skall vara nedåt, fin trådduk (s. k. silduk), helst av nysilver, ej mässing eller järn men möjligen förtent järnduk. Därpå anbringas i vart och ett av de fyra hörnen en kort vinkelböjd zinkplåtbit som fot, och bör det hela, när det nedställts i lådan, blott obetydligt överskjuta dennas kanter. Som stöd kan även, istället för nyssnämnda fötter en liten flänsbit fastlödås på insidorna av lådans kortsidor på sådan höjd över bottnen, att samma resultat uppnås. Hur som helst så uppstår emellan trådduken och lådans botten ett tomrum, varom mera nedan.

4) Över allt detta en ungefär 12 cm. hög huv av likaledes fint trådnät stadgad genom vinkelböjda zinkplättribbor, och vilken passar tätt till lådans kanter och vilar på den utanpå befintliga flänsen.

5) Det ovannämnda tomrummet uppfylles med en från barr, mossa o. d. befriad matta av den s. k. »renlaven» *Cladonia rangiferina* f. *alpestris* SCHÆR., den vackra, tätgreniga formen, som ofta begagnas till prydnad mellan dubbelfönster, och vilken matta väl fuktas och nedpressas. Denna bör sedan, så länge den användes, hållas rätt fuktig och behöver ej ofta tillses, emedan den länge behåller fuktigheten och ej möglar samt kan hålla ut i åratat.

Puppuren är nu färdig att tagas i bruk, och begagnas de olikstora facken efter puppornas storlek eller antal av samma art, varjämte det är med fördel förenat att tillsammans med dem insätta en anteckning om artens namn, om det är känt, varom ej kan ju i journalen anmärkas, var puppan till den eller den larven ligger, genom att på utsidorna av ramen anbringa nummer och bokstäver så som teckningen visar. Sedan bör åtminstone i allmänhet någon mossa eller lav fyllas på i facken för att hålla omgivningen, om så behövs, mera fuktig, än vad fallet blir, då blott fukten från den under trådduken befintliga laven tränger upp, samt att i någon mån hjälpa till att kvarhålla puppskalet, då fjärlen utkryper. Dessa fack kunna helt naturligt ej användas för andra puppor än sådana, som bruka vila i eller på jorden eller bland löv o. d. Fritt upphängda sådana kunna jämte lämpligt stort stycke av underlaget lossas och uppfästas i så vitt möjligt liknande ställning på huvens sidor eller tak.

D. Ljungdahl.

Prunus avium som lockbete. — Under en synnerligen blåsigt, klar och kall kväll och förnatt den 12 juni 1915 (Blidö, Uppland) infångades på ett utanför mitt fönster blommande få-

gelbärsträd en mängd nattfjärilar. Tilloppet var ytterst rikligt, men trots hjälp kunde blott en ringa del infångas, huvudsakligen beroende på svårigheten att sköta hävarna i den starka blåsten. Det ensamt stående trädet vajade mycket häftigt och kommo nattflyen farande som pilar från läsidan för att i trädets omedelbara närhet tvärt sakta farten och därpå reglerande denna efter grenarnas slängningar, tills de lyckades få fäste, som sedan säkert bibehölls. En del av dem lotsade sig med stor skicklighet in till i mera lugn invid stammen sittande smärre grenar. Mätarfjärilarna hade det dock rätt besvärligt. Jag antecknar här det antal, jag erhöi av de arter, som huvudsakligen tycktes förekomma: *Plusia gamma* L. 20 ♀♀, *Mamestra dentina* ESF. 10 ♂♂ och 4 ♀♀, *M. glauca* HB. 1 ♂ och 1 ♀, *M. reticulata* VILL. 1 ♂, *M. thalassina* ROTT. 1 ♂, *Eucosmia certata* HB. 2 ♀♀, *Larentia siterata* HFN. 2 ♀♀, *L. miata* L. 1 ♀, samt ett till oigenkännlighet avflugit nattfly, möjligen en *Orrhodia* ♀. Dessutom förekom i icke ringa antal *Metopsilus porcellus* L. Till följd av att jag från och med dagen därpå måste vistas i Stockholm någon tid, kunde icke konstateras, huruvida detta lockbete fortsatte att besökas.

D. Ljungdahl.

Nya fjärilfynd i Jönköpingstrakten. — Till vad jag förut i denna tidskrift meddelat om storfjärilar (macrolepidoptera), som anträffats i Jönköpings omnejd, kunna nu läggas följande 15 arter, fördelade på 13 släkten, därav fem släkten förut ej representerade i trakten. Uppgifterna grunda sig i de flesta fall på exemplar tillvaratagna av skolynglingarna BIRGER MAGNUSSON (B. M.), CARL ERIK MAGNUSSON (C. E. M.) och STEN ANDERSSON (S. A.).

Pheosia tremulae CLERCK. — Ljungarum (Hagaberg) — B. M.

Thyatira batis L. — Tenhult. — B. M.

Setina irrorella L. — Taberg. — C. E. M. (Syn. *Endrosa irrorella* CL. i SPULER: Die Schmetterlinge Europas.)

Acronycta auricoma FABR. var. *pepli* HB. — Bårarp nära Jönköping. — C. E. M.

Agrotis baja FABR. — Bårarp. — S. A.

Agrotis putris L. — Tenhult. — B. M.

Mamestra advena FABR. — Tenhult. — C. E. M.

Mamestra contigua VILL. — Tenhult. — B. M.

Hadena furva HB. — Bårarp. — C. E. M.

Abrostola urticae HUFN. — Bårarp. — C. E. M. (Syn. *Habrostola tripartita* HUFN. enl. SPULER.)

Rhyparia melanaria L. — Ljungarum — EDG. WIESLANDER. Hedenstorp vid Västersjön nära Jönköping. — Redaktör C. NORDLING. (Syn. *Arichanna MOORE melanaria* L. enl. SPULER.)

Epirrhanthis pulverata THUNB. — Tenhult. — S. A. (Syn. *Ep. diversata* SCHIEFF. enl. SPULER.)