

Scoria lineata SCOP. — Jönköping; Visingsö.

Lygris associata BORKH. — Bårarp. — B. M.

Cidaria siterata HUFN. — Bårarp. — C. E. M. (Syn. *Larentia sit.* enl. SPULER.)

C. O. von Porat.

En för Sverige ny strit, *Strongylocephalus Megerlei* SCOTT, har av undertecknad anträffats i Markkärret, Almby socken i Närke. Arten är beskriven från England, sedermera funnen i Finland. Bestämd av prof. A. TULLGREN.

A. Jansson.

Intressantare insektsfynd. — Av elever vid Kgl. Lantbruksakademiens trädgårdsskola ha under sommaren 1915 vid Experimentalfältet anträffats följande arter, vilket torde kunna påräkna ett visst intresse. *Rhipiphorus paradoxus* L., *Agrotis fimbria* L., *Dianthocia carpophaga* BKH. ab. (v.) *capsophila* DUP., *Boarmia roboraria* SCHIFF., *Hepialus fusconebulosus* DG., *Tabanus tarandinus* L., *Agrion Johanssoni* WALLENGR.

Alb. Tullgren.

Två fjärilfynd. — Från folkskolläraren Axel Binning har ingått meddelande, att han sommaren 1915 i Västmanland anträffat *Zygena scabiosa* SCHEVEN. De funna exemplaren, som granskats av prof. AURIVILLIUS, infångades den 4 juli vid Berga-fallshöjden i Hjulsjö socken. Arten flög på en med glest stående träd och buskar bevuxen örtrik äng. — Den 22 juni togs av samma person två ex. av *Melitæa dictynna* L. vid Hultatorp i Järnboås socken, Örebro län.

Red.

Nya skalbaggsfynd. — *Limnebius aluta* BEDEL. Ett exemplar av troligen denna art från Pålsjö skog, nära Hälsingborg. — *Rhaphirus ochropterus* ER. Ramlösa under växtämnen. — *Coenocorse (Palorus) Ratzeburgi* WISSM. Hälsingborg på väggen av en sädeslada. — *Psammococcus bipunctatus* F. Hven på strandgräs. — *Simplocaria acuminata* ER. Hälsingborg.

B. Varenius.

16. Skandinaviske Naturforskermøde i Kristiania 10.—14. juli 1916. — Prospekt och anmälningsblanketter torde kunna erhållas från den svenske generalsekreteraren Prof. W. LECHE, Stockholms högskola. — Anmärkningsvärt nog ha vederbörande denna gång lika litet som vid det näst föregående mötet i Stockholm 1898 bemödat sig om att tillgodose de entomologiska intressena. Den utveckling entomologien, såväl den rent vetenskapliga som den praktiska, under de senaste årtiondena nått, kunde med fog påkallat en särskild sektion för entomologi såsom fallet var t. ex. 1880. Till följd av den nuvarande anordningen

och med k nnedom om den envist ensidiga uppfattning, som v ra svenska universitetsrepresentanter  ga om begr nsningen av  mnet zoologi,  r det fara v rt, att de i m tet deltagande svenska entomologerna bli ytterst f . Det blir v l ingen annan r d,  n att vi f  s ka realisera den f r n gra  r sedan inom Entomologiska F reningen i Stockholm v ckta planen p  ett gemensamt »nordiskt entomologm te».

A. T.

R ttelse. — I mitt meddelande om Eker ns noctuidfauna i Ent. Tidskr. 1915, p. 222, har texten till fig. 1 r kat bli felaktig. Bilden visar  verst ett ex. *Agrotis occulta* v. *implicata* Lef., i mitten ett ex. av huvudformen och nederst, s som  ven framg r av h nvisningen i texten, den d r omn mnda nya aberrationen.

Frithiof Nordstr m.