

3 fläckarna på framvingarna) i mitten är mörk. Den senare utmärkes av hyalin månformig fläck och helt ljus anastomosfläck. Från denna skiljer sig *L. germanus* genom smalare månformig fläck samt genom att diskcellen i framvingarna är kortare än dess skaft.

Beskrivning: Huvud, mellankropp och bakkropp bruna med gulröda hår. Antenner rödbruna med otydliga mörkare ringar. Framvingar smala, gulbruna med tre ljusa fläckar, varav de två inre dock äro mycket otydliga, den tredje, den halvmånformiga, mycket smal, svagt mörkkantad. Bakvingar hyalina, iriserande. Ben gula, låren mörkare. Analbihangen hos båda könen stora skarpspetsade. Kroppslängd 8—12 mm. Avstånd mellan vingspetsarna 26—31 mm.

Ett exemplar, en hona, funnet i Dalarna, Falun, d. 24/9 1916.

Arten är f. ö. mycket sällsynt men tyckes ha vidsträckt utbredning. Den är enligt *ESBEN-PETERSEN* känd från Danmark, där två hanar tagits vid Salten Langsö, från Tyskland, där den funnits på två lokaler i Bayern, samt från Schweiz, Italien och Grekland.

Einar Klefbeck.

Några för Skåne och Halland nya coleoptera, tagna sommaren 1915. *Calathus melanocephalus* L. var. *nubigena* HAL.

— Sk.: Ljungbyhed, Ängelholm.

Anisotoma picea ILLIG. — Sk.: Ljungbyhed.

» *furva* ER. — Hall.: Halmstad.

Hister arenicola THOMS. — Hall.: Halmstad.

» *marginatus* ER. — Hall.: Halmstad.

Orithales serraticornis PAYK. — Hall.: Torup.

Negastrius quadripustulatus FABR. — Hall.: Halmstad.

Cardiophorus asellus ER. — Hall.: Halmstad.

Cneorrhinus exaratus MARSH. — Hall.: Halmstad. 2 exemplar, tagna på stranddynerna tillsammans med den vanliga *C. geminatus* FABR. Förut ej funnen hos oss, hittills tagen närmast på Själland. Finnes troligen flerstädes, fast helt säkert förbisedd på grund av sin stora habituella likhet med *geminatus*. Skiljes dock lätt från denna bl. a. genom saknaden av den starka spadlika dilateringen på framtibiernas utsida.

Pogonochaerus ovalis GMEL. — Hall.: Torup.

Psylliodes marcida ILLIG. — Hall.: Tyludden.

Chrysomela marginalis DUFT. — Hall.: Halmstad. 1 exemplar. Ny för faunan, känd förut från Mellaneuropa, nordligast Estland. Mycket lik *C. sanguinolenta* L., men skild från denna genom tätare och finare punktering samt genom den även bakåt avsmalnande prothorax.

Cassida rubiginosa MÜLL. — Hall.: Halmstad.

Chelysida hemisphaerica HERBST. — Hall.: Halmstad.

Stockholm d. 28 juni 1917.

Olof Ahlberg.