

fann jag utfärgade individer med den för arten karakteristiska mörkare färgen hos prothorax. Även denna art höll sig djupt ned i stacken, där mögelsvampar genomväxt bottenlagret. Förmodligen lever larven av detta mögel. Att arten uppehåller sig på mörka ställen, framgår av REITTERS uppgift i nyssnämnda arbete: »In Kellern».

Slutligen fann jag i en av stackarna *Atheta (Microdota) paleola* ER. Då endast 2 ex. kunde framletas, är det ju möjligt, att de av en tillfällighet kommit in i stacken, men jag antecknar fallet, då jag utom vid detta tillfälle aldrig, vare sig i närheten eller annorstädes, funnit den sällsynta arten. Om *Atheta paleola* skriver prof. WASMANN: »Von *Atheta paleola* ist mir nicht bekannt, dass sie *regelmässig* bei Ameisen lebt».

För övrigt var antalet myrgäster överraskande rikt i de på nämnda plats undersökta stackarna, tre st., av vilka särskilt en nådde jättestorlek. De voro samtliga anlagda i gammal, torr barrskog. Så insamlades utom de nämnda: *Quedius (Microsaurus) brevis* ER., *Leptacinus formicetorum* MÄRKEL, *Thiasophila angulata* ER., *Nothothecta flavipes* GRAV., *N. (Lyprocorrhe) anceps* ER., *Oxyroda (Demosoma) hamorrhoea* SAHLB., *Q. (Demosoma) formicicola* MÄRKEL, *Euplectus nanus* REICHB., *Stenichneus Godarti* LATR., *Euconus (Napochus) Mäklini* MANNH., *Sydmanus tarsatus* M. ET K., *S. (Cholerus) rufus* M. ET K., *S. (Cholerus) Hellwigii* FABR., *Dendrophilus pygmaeus* L., *Myrmecoxenus subterraneus* CHEVR., *Monotoma (Gyrocecis) conicicollis* AUBÉ, *Corticaria longicollis* ZETT., *Emphylus glaber* GYLL.

Anton Jansson.

Anchomenus Thoreyi DEJ — ny för Sverige. *En dementi och förklaring.* — Helt nyligen meddelades i denna tidskrift nyheten, att i stockholmstrakten anträffats den förut i landet icke iakttagna *Anchomenus (Europhilus) Thoreyi* DEJ [A. TULLGREN: En enkel apparat etc. Ent. Tidskr. 1917, p. 100]. Undertecknad, som själv varit med om att bestämma fyndet efter tillgängliga handböcker, fann emellertid snart nyheten något misstänkt, då dess utbredning befanns större och allmän på passande lokaler (fuktiga ställen med mossor och löv). Från A. JANSSON i Örebro och E. SELLMAN i Toresund ingingo meddelanden om att den funnits kring Hjälmaran och Mälaren och fanns bland äldre material från dessa trakter. Och i AHLROTSKA samlingen fanns den från Kalmartrakten. Allt nog en förvånande utbredning för en nyhet av denna storlek och lättkänhet.

En närmare granskning av fallet har emellertid givit en tillfredsställande lösning på saken och förklarat det hela genom en namnförväxling.

Arten *Thoreyi* DEJ är nämligen densamma som redan av

PAYKULL benämns *pelidnus* och som sedan bär detta namn hos THOMSSON med beteckningen »Ej sällsynt i medlersta Sverige» (Skandinavien coleoptera I, p. 264). Ej underligt således, att den återfinnes litet varstans i landet. THOMSSON och andra äldre författare karakterisera icke arten genom det numera allmänt använda kännetecknet från tarsernas översida (fårade längs mitten). Den anförda karaktären »prothorace oblongo» ger dock redan den gott besked, så att saken synes ganska klar.

GRILL (Catalogus coleopterorum, Sthlm 1896) har emellertid i sin katalog fattat THOMSSONS *pelidnus* som *micans* NICOL., samtidigt som han för PAYKULLS *pelidnus*, som av THOMSON anföres som källa för sin art, till *puellus* DEJ, numera allmänt fattad som en varietet till samme författares *Thoreyi*. Och därmed förklaras det uppkomna misstaget. *Thoreyi* DEJ tillhör således sedan gammalt vår fauna tillsammans med sin varietet *puellus* DEJ och har sin utbredning över mellersta Sverige. För *micans* NICOL måste däremot lokaler eftersökas, då dess i GRILLS katalog uppgivna utbredning utan tvivel är hämtad från THOMSON och således rätteligen hänför sig till *Thoreyi*, DEJ.

Arterna och utbredningen av undersläktet *Europhilus* i Norden blir efter detta i enlighet med HEYDEN, REITTER och WEISES katalog följande:

Gen. *Agonum* BON.

Subg. *Europhilus*, CHAUD.

scitulum DEJ.—Sk., Norge.

micans NICOL.—Sverige? Danm., Norge.

fuliginosum PANZ.—Sk.-Lappl. Danm., Norge.

piceum L.—Sk.-Lappl. Danm., Norge.

= *picipes* FABR.

gracile GYLL.—Sk.-Lappl. Danm., Norge.

= *gracilis* STURM.

consimile GYLL.—Lappl. Västerbotten, Sthlm (MUCHART) Norge.

Thoreyi DEJ.—Sk.-Upl. Danm., Norge.

= *pelidnum* SIEPH.

» THOMS.

v. *puellum* DEJ.—Med föregående.

= *pelidnum* PAYK.

N. A. Kemmer.

»Spindelnät med sänklod». — Den av DR C. O. VON PORAT i »Ent. Tidskrift», vol. 38, p. 327, 1917 meddelade intressanta iakttagelser över ett »Spindelnät, utspänt i luften medelst sänklod», erinrar mig om liknande iakttagelser, som jag vid 15 års ålder nedskrev i mitt förstlingsarbete »Über den Kannibalismus der Kreuzspinne». Som denna studie senare förkom och icke blev tryckt, tillåter jag mig nu efter minnet återgiva mina iakttagelser över denna sak till bekräftande av det