

*Hadena ochroleuca* ESP.      *Tephroclystia linariata* FABR. (larver)  
*Apamea testacea* ESP.      *Sesia ichneumoniformis* FABR.,

av vilka åtminstone de flesta måtte vara nya för landskapet. Så torde ock vara fallet med *Boarmia luridata* BKH. En helt ung sådan larv dinglade på sin tråd under en bok vid Sperlingsholm; uppföddes till imago.

September 1920.

Erik Vretlind.

**Panthea coenobita** ESP. — En larv av denna hos oss så sällsynta acronyctid nedskakades ur en gran i augusti i år i Karbenning, Västmanland. Förut är den funnen tre gånger i län, i Skåne, Värmland och Södermanland (Dalarö). Exemplet är överlämnat till dr JOHN PEYRONS larvsamling.

Erik Vretlind.

**Nogle Plecopterer fra Lappland.** — Fra Hr. *Oscar Ringdahl*, Helsingborg, modtog jeg nogle i Spiritus konserverede Plecopterer, som var indsamlede af ham i Lapplands Fjældtrakter. Det var en meget interessant lille Samling, som jeg er Hr. *O. Ringdahl* meget taknemmelig for; men da der, saa vidt jeg ved, ikke foreligger Oplysninger fra nyere Tid om Sveriges Plecopterfauna, kunde en Fortegnelse over de indsamlede Arter maaske have sin Interesse, hvorfor jeg tillader mig at give en saadan Liste.

*Dictyopterygella Nanseni* KMPN. 1 ♂, 2 ♀. Arten er først beskrevet fra Norge, hvor den gaar helt op mod nord. *Arcynopteryx compacta* MAC LACHL. 2 ♂, 1 ♀. Arten er beskrevet paa Eksemplarer fra Sibirien; men den er ogsaa kendt fra flere Lokalteter i Norge. *Chloroperla Strandi* KMPN. 2 ♀. Denne Art, der først er beskrevet fra Norge, kendes kun fra dette Land og Riesengebirge. *Capnia atra* MORT., 4 ♀, er kendt fra flere Lokalteter i Norge. *Nemura Standfussi* RIS. Flere Eksemplarer. Denne Art har en vid udbredelse i Europa, lige fra Alperne til Nord-Skandinavien. *Nemura arctica* ESB.-PETERS. 3 ♂. Det var særdeles interessant at genfinde denne Art, som jeg beskrev paa nogle faa Eksemplarer fra Karasjok (Norge). *Nemura marginata* PICT. Flere Eksemplarer. Denne Art har en stor Udbredelse i Europa. *Nemura inconspicua* (PICT.) MORT. 1 ♂, 1 ♀. Ogsaa denne Art har en vid Udbredelse. Det interessante ved Indsamlingen, synes jeg er dette, at den er foretaget rent tilfældigt, og dog indeholder den alligevel saa mange interessante Arter. Dette synes at tyde paa, at der ved Bredderne af Lapplands Elve findes en meget rig Plecopterfauna. Disse Insekter, der bør opbevares i Alkohol, findes under Sten ved rindende Vand, eller de kan bankes ned af Træer og Buske i Nærheden af Vand.

P. Esben-Petersen, Silkeborg.