

hos vissa författare sätter man den första arten i vissa sätt  
medan redt annat författare gör det i vissa  
fall omvänta. Åtminstone är det en del som  
nog inte kan meddeles om dessen rätt att göra  
förändringar som entomologiskt sett inte göra  
sig gällande i vissa fall och därmed  
medföra missförstånd om vissa arter.

## Våra Cinxia(*Sericomyia*)arter.

Av

**O. Ringdahl,**

Sedan gammalt äro de båda *Sericomyia*-arterna *borealis*  
och *lappona* väl kända för alla dipterologer. De höra ju  
också till våra största och vackraste tvåvingar.

Ganska oväntad var upptäckten av en ny art i Lapp-  
land, vilken beskrevs av Schirmer i Wiener ent. Zeitung 1913  
under namnet *arctica*. Under vistelse i Abisko sommaren  
1918 fann jag i juli 1 ♂-ex. av denna art vid några vatten-  
hålor helt nära Naturvetenskapliga stationen. Bland de få  
ex. av *Sericomyia* jag där infångade, befinner sig märkligt  
nog 1 ♂ ex. av ännu en annan art. Under den gångna  
sommaren befann jag mig åter i samma trakt och efter-  
spanade då dessa båda med stor sannolikhet arktiska arter  
och lyckades finna 3 ♂-ex. av den senare men ej *arctica*.

I Horae Societatis Entomologicae Rossicae 1874 har  
Portschinsky beskrivit en art, *nigra*, från Irkutsk, och då  
många s. k. sibiriska arter äro funna i norra Lappland, var  
det en möjlighet, att de lapska ex. kunde tillhöra denna art.  
Beskrivningen av *nigra* passar dock ej till alla delar in. Så  
skall denna, vilken beskrevs efter ♀-ex., ha 4 band på bak-  
kroppen, under det den nysfunna liksom *lappona* endast har  
tre. Honan till den nya arten är visserligen ej känd, men  
båda könen hos *lappona* ha tre band. Till utseendet erinrar  
arten om såväl *borealis* som *lappona* och är liksom ett mellan-  
ting av båda, och har jag därför för densamma valt namnet  
*intermedia*. Den är i storlek som *borealis* och har som denna

svart skutell; abdominalbanden äro mycket smala såsom hos *lappona*.

De fyra arterna kunna lätt åtskiljas efter följande tabell.

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Bakkropp med gul spets.....   | <i>borealis</i> L.       |
| — Bakkropp med svart spets.....  | 2.                       |
| 2. Bakkroppsband i mitten ganska brett avbrutna, vid sidorna utvidgade. — Skutell rödgul, lår till största delen svarta, vingar utan fläcklik beskuggning vid spetsen..... |                          |
|  | <i>arctica</i> SCHIRM.   |
| — Band mycket smalt avbrutna, delarna i mitten nästan sammanstötande.....  | 3.                       |
| 3. Skutell rödgul, vingar vid spetsen med fläcklig beskuggning, 3. ribban mycket svagt svängd.....   | <i>lappona</i> L.        |
| — Skutell svart, vingar utan fläcklik beskuggning, 3. ribban starkt nedåtsvängd.....   | <i>intermedia</i> n. sp. |
- 

#### Beschreibung der neuen *Cinxia*-Art:

##### *intermedia* n. sp.

Männchen: Kopfform und Fühler wie bei *borealis* und *lappona*, die schwarze Gesichtstrieme so breit wie die bei *borealis*. Torax schwarz mit den gewöhnlichen weisslichen Schulterflecken, die vordere Hälfte mit weisslicher Behaarung, die hintere schwarz behaart, Toraxseiten gelb behaart, auch das Notopleuralfeld, Schildchen schwarz und mit schwarzer Behaarung, an der Basis schmal weisslich behaart, Spitzenrand mit langer gelblicher Behaarung. Hinterleib dem bei *lappona* sehr ähnlich, schwarz mit drei schmalen gelben oder weissgelben an den Seiten etwas erweiterten, in der Mitte sehr schmal unterbrochenen Binden. Er ist oben schwarzbehaart, unterseits nebst dem Hypopygium gelb behaart. Beine rotgelb, Vorderschenkel oben schwarzbraun, Vorderschiene mit bräunlichem Ring, die drei oder vier letzten Tarsenglieder schwarz, Hinterschenkel nicht verdickt und ohne längere Borstenhaare. Flügel bräunlich gelb tingiert, an der Spitze ohne hervortretenden braunen Wisch, 3. Längsader stärker nach unten geschwungen als bei *lappona*.

Männchen dieser Art habe ich auf einem Moore bei Abisko in nördlichem Lappland gefunden.

---