

förut bekanta från Lappland, några, t. ex. *Pleurota bicostella* CL., *Gelechia infernalis* H. S. och *continuella* Z., *Argyresthia pygmaella* HB. och *Tinea picarella* CL., äro ej omnämnda därifrån men kända från sydligare delar av Sverige och från nordligaste Norge, varför man kunnat vänta att finna dem där, andra åter äro nykomlingar för vår fauna. Så är förhållandet med följande. *Argyroploce noricana* H. S. 1 ex. ¹⁵/₇ i utkanten av en myr, ett annat mycket mörkt ex. sög ur blommorna på *Silene acaulis* högt ovan trädgränsen på ett fjäll norr om Torne träsk ¹³/₇. Funnen på Alperna och i Norge. — *Phalonia vulneratana* ZETT. togs i enstaka ex. i skogen vid Nuoljabäcken och var vanlig vid Jebrenjokk. Känd från Norge och Finland samt en varietet från Altai. — *Laspeyresia phacana* WCK. 1 ex. ³/₇. Förut funnen i Norge och Alperna. — *Gelechia tarandella* WCK. löpte på lavklädda stenar tillsammans med *infernalis* H. S. och *continuella* Z. ⁵/₇—²²/₇. Endast känd från Norge. — *Coleophora areipennis* HEIN.-WCK., 1 ex. på sankmark mot Björkliden. Skild från närstående genom enfärgade antenner. Tagen i Piemont och på Dovre. — *Cataplectica auromaculata* FREY, 2 ex. på slutningen av Nuolja. Förut i Norge, på Shetlandsöarna och Alperna. — *Plutella hyperboreella* STRAND, 2 ex., båda togos ovan trädgränsen, det ena på Nuolja ¹⁷/₇ och det andra vid Jebrenjokk ¹⁰/₇. Arten är beskriven i Ent. Tidskr. 1902 sid. 63 efter ex. från norska Finmarken. Någon uppgift om att den funnits annorstädes har jag ej sett. — *Hofmannia* sp. Den 3 juli tog jag vid Abisko ett ex. av detta för Sverige nya släkte. Tyvärr är exemplaret avfluget, så att jag ej vågar med bestämdhet säga vilken art det tillhör.

Per Benander.

Än en gång fjärlnotiser från Sydhalland.

A. Genista-mätarna.

I Ent. tidskrift 1920, sid. 157 omnämnde undertecknad bl. a. den för Sverige nya *Chesias rufata* F. Sommaren 1921 anträffades den fortfarande på de nämnda lokalerna väster om Halmstad men även öster om staden på Skedala hed och vid Veinge, mitt på den stora slättbygden innanför Laholmsbukten, alltid tillsammans med *Pseudoterpna pruinata* o. *Ortholia plumbata*. I Våxtorp nere vid Hallandsås, OSBECKS (*Pseudoterpnas* upptäckare i Sverige) annexförsamling, lyckades det mig dock icke att få se den, endast de båda andra nämnda. Som ljungmarkerna där äro kolossalt vidsträckta och besöket omfattade sex timmar, behöver detta dock visserligen icke betyda, att den icke finnes även där.

Ingen *Sarothamnus* syntes på de nya lokalerna, endast *Genista*. Sannolikast synes mig därför nu, att *Chesias rufata* är lika gammal i landet som de andra *Genista*-mätarna och inkommen på den tid, då Skåne och de danska öarna voro i landfast för-

bindelse med Jylland. Att de nu icke finnas på öarna (utom *Pseudoterpna* på Lolland), kan ju gott bero på senare inträdda förändringar i naturförhållandena och icke minst landets uppodling.

Ortholita plumbatas långa flygtid (från början av juni till slutet av juli) beror på oliktidig kläckning; i början av juli 1921 funnos rikligt nykläckta exemplar. —

B. Andra Makrolepidoptera.

Panthea coenobita ESP. hade jag 1921 åter nöjet att träffa på, denna gång här nere och såsom imago, död, med förlorad bakropp men rätt väl behållna vingar, sittande fast i en spindelväv i ljungen i en talldunge på havsstranden icke långt från Halmstad.

Västkusten saknar vildväxande gran men med planterandet av den inkomma även granfjärilar. Så fann undertecknad i Söndrums flygsandsskog *Macaria signaria* HB. och *Ellopia prosapiaria* L.

Såsom andra möjligen anmärkningsvärda nya fynd från samma trakt i detta outforskade landskap kunna anföras: *Drepana curvatula* BKH.; *Notodonta anceps* GOEZE; *Cymatophora fluctuosa* HB.; *Acidalia rubiginata* HFN. (Växtorp); *Arichanna melanaria* L.; *Boarmia repandata* L. ab. *nigricata* FUCHS. 3 ex.; *Tephroclystia nanata* HB. och *T. pumilata* HB.; *Comacla senex* HB.

E. Vretlind.

Dasychira abietis SCHIFF. Hittills 4 fynd i Sverige, mig veterligt, publicerade, därav 2 i Uppland. Undertecknad fann d. 25 maj 1921 två fullvuxna honlarver vid Enköping, varav den ena preparerades för dr J. PEYRONS larvsamling. Den andra förpuppades $\frac{29}{5}$ och gav redan $\frac{11}{6}$ imago. — I augusti samma år anträffades ock en larv i en annan skog vid samma stad, och en i Österåkers s:n i SÖ. Uppland. — Kanske är den icke så sällsynt som antagits, blott föga eftersökt.

E. Vretlind.

Chrysophanus phlæas L. var. *hypophlæas* B. (= var. *americanus* D'URB.), av MEVES ss. bekant tagen i Kall i Jämtland 1892, träffades $\frac{6}{8}$ 1921 i Bydalen i samma landskap. Dr. JOHN PEYRON innehar ock ett ex., taget av honom i Jämtland (antingen i Storlien eller Duved).

E. Vretlind.

Ekfjärilar utanför den sammanhängande ekregionen. — Enligt palæontologerna var Uppland under bronsåldern klätt av ekskog. Numera saknas (enl. meddelande av fil. mag. E. ALMQVIST, Uppsala) eken så gott som alldeles i landskapets västra del, Fjärdhundra; endast några spridda grupper finnas på några få ställen. Så t. ex. längst i norr utmed Dalälven i Nora s:n, sedan blir det alldeles ekfritt ned till mellersta delen, där några