

bindelse med Jylland. Att de nu icke finnas på öarna (utom *Pseudoterpna* på Lolland), kan ju gott bero på senare inträdda förändringar i naturförhållandena och icke minst landets uppodling.

Ortholita plumbatas långa flygtid (från början av juni till slutet av juli) beror på oliktidig kläckning; i början av juli 1921 funnos rikligt nykläckta exemplar. —

B. Andra Makrolepidoptera.

Panthea coenobita ESP. hade jag 1921 åter nöjet att träffa på, denna gång här nere och såsom imago, död, med förlorad bakropp men rätt väl behållna vingar, sittande fast i en spindelväv i ljungen i en talldunge på havsstranden icke långt från Halmstad.

Västkusten saknar vildväxande gran men med planterandet av den inkomma även granfjärilar. Så fann undertecknad i Söndrums flygsandsskog *Macaria signaria* HB. och *Ellopiä prosapiaria* L.

Såsom andra möjligen anmärkningsvärda nya fynd från samma trakt i detta outforskade landskap kunna anföras: *Drepana curvatula* BKH.; *Notodonta anceps* GOEZE; *Cymatophora fluctuosa* HB.; *Acidalia rubiginata* HFN. (Växtorp); *Arichanna melanaria* L.; *Boarmia repandata* L. ab. *nigricata* FUCHS. 3 ex.; *Tephroclystia nanata* HB. och *T. pumilata* HB.; *Comacla senex* HB.

E. Vretlind.

Dasychira abietis SCHIFF. Hittills 4 fynd i Sverige, mig veterligt, publicerade, därav 2 i Uppland. Undertecknad fann d. 25 maj 1921 två fullvuxna honlarver vid Enköping, varav den ena preparerades för dr J. PEYRONS larvsamling. Den andra förpuppades $\frac{29}{5}$ och gav redan $\frac{11}{6}$ imago. — I augusti samma år anträffades ock en larv i en annan skog vid samma stad, och en i Österåkers s:n i SÖ. Uppland. — Kanske är den icke så sällsynt som antagits, blott föga eftersökt.

E. Vretlind.

Chrysophanus phlæas L. var. *hypophlæas* B. (= var. *americanus* D'URB.), av MEVES ss. bekant tagen i Kall i Jämtland 1892, träffades $\frac{6}{8}$ 1921 i Bydalen i samma landskap. Dr. JOHN PEYRON innehar ock ett ex., taget av honom i Jämtland (antingen i Storlien eller Duved).

E. Vretlind.

Ekfjärilar utanför den sammanhängande ekregionen. — Enligt palæontologerna var Uppland under bronsåldern klätt av ekskog. Numera saknas (enl. meddelande av fil. mag. E. ALMQVIST, Uppsala) eken så gott som alldeles i landskapets västra del, Fjärdhundra; endast några spridda grupper finnas på några få ställen. Så t. ex. längst i norr utmed Dalälven i Nora s:n, sedan blir det alldeles ekfritt ned till mellersta delen, där några