

- dalabergen. — Hall. Fjärås. — Boh. Ljungskile. På torr, sandig gräs-
mark.
- Chrysomela goettingensis* L. Skåne, Bosjökloster.
- Cryptocephalus Pini* L. Gottl. Klintehamn, i mängd på småfuror.
- C. flavipes* FABR. Öland, Halltorp, i stor mängd på en gräsuttning strax söder om gården.
- C. pallifrons* GYLL. Öland, Greby (Räpplinge s:n), på *Salix (aurita?)*.
- C. frontalis* MARSH. Öland, Greby, tills. med föregående art.
- C. querceti* SUFFR. Öland, Greby.
- Cassida vibex* L. Gottl. Lau myr.
- C. ferruginea* GOEZE. Gottl. När s:n, Hägdarve, på hård gräsmark.
- Cassida sanguinolenta* MÜLL. Boh. Ljungskile, Ulvesund, under stenar på hård gräsmark vid havet.
- C. hemisphaerica* HERBST. Boh. Ljungskile, tillsammans med föregående art.
- Rhizobius litura* FABR. Gottl., Fie (Lau s:n), 1 ex. på alvarmark nära tallskog.
- Platynaspis luteorubra* GOEZE. Gottl. När s:n på sandmark och i Lau myr.
- Hyperaspis reppensis* HERBST. Gottl. Lau myr.
- Scymnus bipunctatus* KUGEL. Gottl. Fie (Lau s:n), på alvarmark.
- Sc. rubromaculatus* GOEZE. Göteborg, Slottsskogen, 1 ♀ vid siktning nära Bragebacken.

Carl H. Lindroth.

Myrmecomorphus rufescens WESTW. funnen i Sverige. — I TULLGREN'S och WAHLGREN'S stora arbete »Svenska insekter» upptages inom parentes, — då nämligen ingen art av gruppen var känd från Sverige —, gruppen *Embolemini* bland proctotrupiderna samt omnämnes den egendomliga, myrliknande *Myrmecomorphus rufescens* WESTW., såsom närmast funnen i Tyskland. Med användande av nämnda arbete kom jag vid bestämningen av en myrliknande vinglös stekel, som jag funnit i Markkäret, Almby socken i Närke, till denna art, i alla händelser till gruppen *Embolemini*, och sedan jag sänt ett ex. av djuret till amanuens W. HELLÉN i Helsingfors, vilken ägnat *Bethylina* uppmärksamhet i Finland, bekräftade han, att ex. tillhörde nämnda art. Djuret, som till form och färg liknar en *Myrmica*, har i Tyskland, uppgives det, anträffats bland myror. I Markkåret togs det ena ex. vid sättnings av mossa, det andra då det livligt kröp uppför ett grässtrå. I Finland är *Myrmecomorphus* ej funnen, men däremot en annan art av gruppen, *Emboleminus ruddii* WESTW.

Anton Jansson.

En trasslig namnfråga. — I femte delen av sina berömda Memoarer beskriver DE GEER en liten vivel, som han kläckt ur knoppar på alm, under namn av *Curculio ulmi* (p. 215 t. 6 f. 26—30). Denna art tillhör det nutida släktet *Anthonomus* och har av nästan alla författare ansetts vara samma art som *A. pedicularius* L. Endast DESBROCHERS och GRILL (Catal. Cal. p. 303) hava varit av annan mening och hänfört DE GEERS art till *A. inversus* BEDEL (= *cinctus* THOMS.). Denna tolkning grundar sig utan tvivel dels på DE GEERS förstorade avbildning (fig. 28) av ett framben, dels på det ännu i DE GEERS samling befintliga typexemplaret. Den ifrågavarande figuren kan på grund av lär-