

## Anthomyidae aus den Färöern.

Von

O. RINGDAHL.

Die Sammlung, die dem Reichsmuseum zu Stockholm gehört, ist von AXEL FRIHERRN v. KLINCKOWSTRÖM bei Trangisvaag erbeutet worden.

*Phaonia incana* WIED. — Häufig. Die 30 Stücke sind im Juli gesammelt.

*Hera longipes* ZETT. — Die Art kommt ohne Zweifel sehr häufig vor, da sie in Menge gefangen ist: Juni, Juli.

*Hebecnema umbratica* MEIG. — 1 ♂ 1 ♀ im Juni.

*Myiospila meditabunda* FABR. — Häufig. Juni—August.

*Helina duplicata* MEIG. — 10 Stücke gefangen.

*Hydrotaca dentipes* FABR. — Häufig. 32 Stücke im Juni—August gesammelt.

*Fannia canicularis* L. — Häufig. 20 Stücke. Juni—August.

*Coclomyia spathulata* ZETT. — Mehr als hundert Individuen sind im Juni—August gesammelt. Die Art ist wohl deshalb auf den Färöern gemein.

*Limnophora insularis* COLLIN. — Die Art ist im Jahre 1921 in »The Entomologist's Monthly Magazine« beschrieben worden.

Zum Habitus ist die Art der *litorea* FALL. ziemlich ähnlich, ist jedoch durch mehrere Kennzeichen von derselben zu unterscheiden. Sie hat somit bei dem ♂ einen beinahe rein schwarzen Torax mit stark hervortretenden weisslichen Schulterstriemen, die Rückenstriemen sind nur am Vorderteile ganz schwach sichtbar, sie hat 4 hintere Dorsocentralen, die Fühlerborste ist bedeutend kürzer pubescent, die Orbiten feiner, die Backen etwas breiter u. s. w.

*L. insularis* scheint ihre Verbreitung an den Küsten des nördlichen Atlanten zu haben und sie kommt ausser im Schottland und auf den Färöern auch in Norwegen vor, wo der Verf. dieselbe lokal zahlreich auf feuchten Wiesen bei Narvik fand.

*Prosalpia conifrons* ZETT. — 3 ♀♀ im Juni und Juli gefangen.

*Chortophila discreta* MEIG. — Mehrere Stücke im Juni und Juli.

» *fugax* MEIG. — 5 Stücke im Juni.

» *nuda* STROBL. — 1 ♂.

» *dissecta* MEIG. — Scheint häufig vorzukommen. 21

Stücke im Juni—August.

*Pegomyia bicolor* WIED. — 1 ♀. Juli

*Coenosia mollicula* FALL. — Häufig. 43 Stücke im Juni—August, die meisten im Juli.

*Dexiopsis lacteipennis* ZETT. — 2 ♂ 2 ♀ im Juli.

*Coenosia pumila* FALL. — Häufig. 23 Stücke im Juni, Juli.

*Schoenomyza litorella* FALL. — 5 Stücke im Juni, Juli.

*Fucellia fucorum* FALL. — 2 Stücke im Juli.