

Smärre meddelanden och notiser.

Gluphisia crenata ESP., ny för Sverige. — Vid genomseendet av en liten fjärilsamling, hopbragt i Torsby, Värmland, av farm. kand. G. Svenson därstädes, fann jag i denna en mycket avflugnen ♀ tillhörande ovannämnda art. Då denna fjäril av såväl beskrivningar som bilder att döma varierar mycket, hade jag rätt svårt att identifiera den; bäst stämmer detta exemplar med bilderna hos HÜBNER (Bomb. 12) och SPULER (Pl. 22, fig. 21). Exemplaret i fråga är mörkt gråbrunt, har ett tydligt, mörkbrunt rotfält, begränsat utåt av en ljusare linje, mittfältet mellan de båda ljusa mellanlinjerna är ävenledes mörkbrunt, och i detta står en liten ljus, halvmånformig diskfläck; den ljusa våglinjen är mycket suddig; de ljusare, brunaktigt grå bakvingarna ha ett brett, otydligt, ljust tvärband på samma sätt som t. ex. hos *Not. siczac*, vilket, liksom hos denna, vid bakhörnet genomskär en större, diffus, svartbrun fläck; undersidan är gråbrun med översidans teckningar svagt återupprepade. (Vingfransar saknas fullkomligt hos detta ex.) Den korta, tjocka bakkroppen är mörkgrå. Vingbredd 35 mm. Fjäriln är fångad en kväll inne i ett rum, dit den lockats av lampskenet, datum tyvärr ej antecknat. Flygtiden skall vara april—juni; PETERSEN nämner för Estland även juli. Närmast är *crenata* tagen i Syd norge: Oslo-trakten samt flerstädes i Finlands södra landskap, från Danmark är den ännu ej känd. Söderut går den till Norditalien, Bukowina och Sydryssland, västerut till England (där inalles 3 ex. äro tagna), österut till Amur- och Ussuriområdet. — Den gröna larven lever på *Populus*-arter och kännes lätt igen på den vitgröna, rödfleckiga mittryggen, begränsad av gula sidorygglinjer. Förpuppningen äger rum mellan blad.

Stockholm i oktober 1925.

Frithiof Nordström.

Mera om släktet *Oporinia* HB. i Sverige. — Min i mitt förra meddelande (Ent. Tidskr. 1924, sid. 187) uttalade förmodan, att även *O. christyi* PROUT skulle finnas här i landet, har visat sig riktig. Jag har från Dr. HARRISON i Newcastle-on-Tyne erhållit flera irländska exemplar av denna art (?subspecies till *dilutata* ВКН) till jämförelse, varigenom jag kunnat konstatera dess förekomst i Stockholmstrakten (Viggbyholm, Resarö, Jakobsberg). Fig. 2 i texten och fig. 1 och 3 å planschen (l. c.) äro således att hänföra till *christyi*. Av de även från HARRISON erhållna engelska exemplaren av *fligrammaria* H. S. framgår däremot, att denna art (?subspecies till *autumnata* ВКН) ej finnes hos oss; de små Lapplandsexemplaren äro tydligen äkta *autumnata*. HARRISON gör mig uppmärksam på, att han redan före mig namngivit

den bandade formen av *autumnata*: ab. *latifasciata* HARR. (= *latifasciata* NORDSTR.). Mitt antagande (l. c. p. 183), att *O. dilutata* skulle finnas på Öland, har även besannats, i det PEYRON i sommar från Borgholm och Färjestaden hemfört larver, tagna på alm och ek, vilka nu i höst kläcks. Vid Ottenby tog PEYRON larver till *autumnata*, på björk. Till fyndlokalerna för *dilutata* kan jag lägga Mahult i södra Halland, nära Smålandsgränsen, där jag i somras tog larver såväl till denna art som till *autumnata*.

Stockholm i november 1925.

Frithiof Nordström.

Tillägg till Ölands fjärfilfauna. Under en veckas vistelse på Öland (10—17 juni) i år insamlade jag med tillhjälp av en av mina söner huvudsakligen inom Högrums socken (vid St. Rör, Ekerum och Halltorp) följande hittills ej för denna ö anmärkta fjärilar: *Lycena astrarche* BGSTR. — *Cymatophora flavicornis* CL. (*Palimpsestis* or F.). — *Acrionicta megacephala* F. — *Larentia luteata* SCHIFF. (*Hydrelia flammeolaria* HUFN.). — *Tephroclystia (Eupithecia) plumbeolata* HAW. — *T. strobilata* HB. (*E. bilunulata* ZETT.). — *Bapta temerata* SCHIFF. — *Cepphis adenvaria* HBN. — *Semiothisa (Macaria) signaria* HBN.

Cacoecia musculana HB. — *Phalonia nana* HW. — *Capua favillaceana* HB. — *Evetria pinivorana* Z. — *Ancylicus lundana* F. — *A. upupana* TR. — *Lobesia permixtana* HB. — *Epiblema tetraquetra* HW. — *E. bilunana* HW. — *Hemimene plumbagana* TR. — *H. simpliciana* HW. — *Lipopteryx plumbana* Sc. — *Laspeyresia cosmophorana* TR. — *L. duplicana* ZETT. — *Pamene populana* F. — *Glyphipteryx thrasonella* Sc. — *Depressaria liturella* HB. 3 ex. kläcka ²⁰/₇. — *Gelechia ericetella* HB. Allm. å ljunghed vid St. Rör. — *Bryotropha senectella* Z. var. *obscurella* HEIN. — *Ornix scoticella* STT. — *O. betulae* STT. — *Lithocolletis cavella* Z. — *L. tristrigella* HW. — *Bucculatrix thoracella* THNBG. — *B. nigricomella* Z. — *Elachista albifrontella* HB. — *E. megerella* STT. — *E. argentella* CL. — *Argyresthia arceuthina* Z. — *Ocnerostoma piniariella* Z. — *Tinea fuscipunctella* HW. — *Incurvaria oehlmanniella* TR. — *Nemophora pilulella* HB. — *N. pilella* F. — *Opostega salaciella* TR. — *Micropteryx aruncella* Sc.

Bland övriga fynd må följande nämnas: *Trichiura cratægi* L. (im. ²⁴/₈). — *Cymatophora (Palimpsestis) duplaris* L. — *Agrotis primule* ESP. (*Rhyacia festiva* SCHIFF.). — *A. (Rhyacia) dahlii* HB. — *Mamestra leucophæa* VIEW. (*Pachetra fulminea* F.) — *Heliothis (Chl. ridea) dipsacca* L. — *Larentia (Cidaria) variata* SCHIFF. och *obeliscata* HB. — *Eupithecia sinuosaria* EV. St. Rör. — *Angerona prunaria* L. — *Boarmia punctularia* HB. (*B. punctulata* SCHIFF.).

Stenoptilia bipunctidactyla HW. — *Argyroproce urticana* HB. — *Pamene rhediella* CL. — *Anacamptis vorticella* SCOP. — *Bucculatrix frangulella* GOEZE.

‡ A. Z. Brundin.