

Smärre meddelanden och notiser.

Gluphisia crenata ESP., ny för Sverige. — Vid genomseendet av en liten fjärilsamling, hopbragt i Torsby, Värmland, av farm. kand. G. Svenson därstädes, fann jag i denna en mycket avflugnen ♀ tillhörande ovannämnda art. Då denna fjäril av såväl beskrivningar som bilder att döma varierar mycket, hade jag rätt svårt att identifiera den samma; bäst stämmer detta exemplar med bilderna hos HÜBNER (Bomb. 12) och SPULER (Pl. 22, fig. 21). Exemplaret i fråga är mörkt gråbrunt, har ett tydligt, mörkbrunt rotfält, begränsat utåt av en ljusare linje, mittfältet mellan de båda ljusa mellanlinjerna är ävenledes mörkbrunt, och i detta står en liten ljus, halvmånformig diskfläck; den ljusa våglinjen är mycket suddig; de ljusare, brunaktigt grå bakvingarna ha ett brett, otydligt, ljust tvärband på samma sätt som t. ex. hos *Not. siczac*, vilket, liksom hos denna, vid bakhörnet genomskär en större, diffus, svartbrun fläck; undersidan är gråbrun med översidans teckningar svagt återupprepade. (Vingfransar saknas fullkomligt hos detta ex.) Den korta, tjocka bakkroppen är mörkgrå. Vingbredd 35 mm. Fjäriln är fångad en kväll inne i ett rum, dit den lockats av lampskenet, datum tyvärr ej antecknat. Flygtiden skall vara april—juni; PETERSEN nämner för Estland även juli. Närmast är *crenata* tagen i Sydnorge: Oslo-trakten samt flerstädes i Finlands södra landskap, från Danmark är den ännu ej känd. Söderut går den till Norditalien, Bukowina och Sydryssland, västerut till England (där inalles 3 ex. äro tagna), österut till Amur- och Ussuriområdet. — Den gröna larven lever på *Populus*-arter och kännes lätt igen på den vitgröna, rödfleckiga mittryggen, begränsad av gula sidorygglinjer. Förpuppningen äger rum mellan blad.

Stockholm i oktober 1925.

Frithiof Nordström.

Mera om släktet *Oporinia* HB. i Sverige. — Min i mitt förra meddelande (Ent. Tidskr. 1924, sid. 187) uttalade förmodan, att även *O. christyi* PROUT skulle finnas här i landet, har visat sig riktig. Jag har från Dr. HARRISON i Newcastle-on-Tyne erhållit flera irländska exemplar av denna art (?subspecies till *dilutata* ВКН) till jämförelse, varigenom jag kunnat konstatera dess förekomst i Stockholmstrakten (Viggbyholm, Resarö, Jakobsberg). Fig. 2 i texten och fig. 1 och 3 å planschen (l. c.) äro således att hänföra till *christyi*. Av de även från HARRISON erhållna engelska exemplaren av *fligrammaria* H. S. framgår däremot, att denna art (?subspecies till *autumnata* ВКН) ej finnes hos oss; de små Lapplandsexemplaren äro tydligen äkta *autumnata*. HARRISON gör mig uppmärksam på, att han redan före mig namngivit