

## Några fjärilfynd från Mönsterås-orten.

Följande fjärilförteckning upptar några mer anmärkningsvärda fynd, gjorda mest i Fliseryd socken de senare åren.

*Colias paleno* L. Sällsynt; en ♀  $\frac{21}{6}$  22, en ♂  $\frac{1}{7}$  18, en ♂ i juli 24.

*Pyrameis atalanta* L. Sällsynt, ej alla år sedd. Ett ex. i slutet av maj 24, 2 ex.  $\frac{20}{9}$  24 (på lockbete).

*P. cardui* L. Ett par mycket slitna ex.  $\frac{11}{7}$  18; omkr. mitten av aug. 1920 några ex. tagna. I aug. och sept. 24 var arten ej sällsynt i Fliseryd och sågs på blommande ljung, där ett vackert ex. togs.

*Melitæa cinxia* L. Täml. allm. i Fliseryd.

*Coenonympha arcania* L. Täml. allm.; saknas däremot i Rumskulla.

*P. megæra* L. Täml. allm. vissa år, t. ex. höstgen. 1922; vår-gen. i allm. sparsammare.

*Zephyrus quercus* L. 1924 uppträdde arten mycket allm. i juli och aug.; föreg. år blott enstaka ex. sedda.

*Z. betule* L. Uppträder alla år mycket sparsamt; endast några få ex. tagna i aug. och sept. Liksom föreg. art svår att fånga, enär den som bekant i regel fladdrar omkring högt uppe i trädkronorna.

*Adopæa lineola* O. Sällsynt; några ex. tagna i juli 1919 och 20.

*Macroglossa stellatarum* L. 1 ex. taget på *Phlox*  $\frac{7}{9}$  24.

*Deilephila galii* ROTT. 1 ex.  $\frac{8}{6}$  19 på blommande syren.

*Endromis versicolora* L. Flög täml. allm. i början av maj 1919, de följ. åren spars. eller sällsynt; endast 3 ♂ togos 1919.

*Aglia tau* L. 1 ♂ fångades  $\frac{12}{5}$  20 i flykt, det enda ex. jag sett i Fliseryd.

*Epicnaptera ilicifolia* L. En larv tagen på *Vaccinium myrtillus* i i sept. 23, blev fjäril  $\frac{28}{5}$  24.

*Dendrolimus pini* L. 2 ♀♀ kläckta  $\frac{13}{7}$  18 och  $\frac{13}{6}$  25.

*Notodonta dromedarius* L. En ♀ och en ♂ kläckta i maj och juni 1918.

*Pterostoma palpina* L. En ♀  $\frac{12}{6}$  18, en ♂  $\frac{15}{7}$  23.

*Poecilocampa populi* L. 2 ♂♂  $\frac{28}{30}$  21 och i okt. 25.

*Agrotis obscura* BRAHM. Synes vara rätt allm. i Fliseryd.

*A. simulans* HUFN. Rätt allm.

*A. strigula* THUNB. Ett ex.  $\frac{14}{7}$  20. Troligen sällsynt i Fliseryd.

- A. ypsilon* ROTT. Ett och annat ex. på lockbete om hösten.
- A. tritici* L. 2 ex.  $\frac{17}{8}$  18, 1 ex.  $\frac{17}{8}$  22. Troligen sällsynt i Flis.
- Epineuronia popularis* FABR. Några ex. på lockbete i aug. och sept. 1924.
- E. cespitis* FABR. 1 ex.  $\frac{14}{9}$  23.
- Manestra tincta* BRAHM. Några ex. i mitten av juli 24.
- M. genistæ* BKH. 1 ex.  $\frac{2}{6}$  18, 1 ex.  $\frac{7}{6}$  19.
- M. reticulata* VILL. Några ex. tagna på blommande syren.
- Hadena porphyrea* ESP. Ej så sällsynt på lockbete hösten 1924.
- H. adusta* ESP. var. *baltica* HERING. 1 ex.  $\frac{12}{6}$  20.
- H. sordida* BKH. 1 ex.  $\frac{9}{6}$  19. Enl. Nord. Fj. blott känd från Skåne. BRUNDIN uppger arten fr. Öland. (Ent. Tidskr. 1922, 1, sid. 5.)
- Ammoconia cæcimacula* FABR. Besöker lockbetena i mängd om hösten.
- Polia chi* L. Ett par ex. tagna, det senaste  $\frac{4}{9}$  24.
- Miselia oxyacanthæ* L. Ej så ovanlig på lockbete hösten 1924.
- Dichonia aprilina* L. Besöker i enstaka ex. lockbetet om hösten.
- Dryobota protea* BKH. Talrik på lockbetena.
- Trachea atriplicis* L. 1 ex.  $\frac{8}{6}$  på äppelblommor.
- Euplexia lucipara* L. 1 ex.  $\frac{11}{7}$  20.
- Nænia typica* L. 1 ex.  $\frac{27}{7}$  19, 1 ex.  $\frac{12}{6}$  21.
- Faspidea celsia* L. Ett par ex. i sept. 1917, 2 ex. på lockbete i sept. 24.
- Apamea testacea* HÜBN. 1 ex.  $\frac{12}{8}$  20. Enl. Nord. Fj. förut känd blott fr. Skåne, Bohuslän och Öland.
- Rusina umbratica* GOEZE. 1 ex.  $\frac{10}{7}$  22, 1 ex.  $\frac{20}{7}$  24.
- Amphipyra tragopogonis* CL. 1 ex.  $\frac{14}{9}$  24; troligen sälls. i Fliseryd.
- Xanthia aurago* FABR. 1 ex. på lockbete  $\frac{30}{9}$  24. Enl. Nord. Fj. i Sverige blott funnen i Skåne. ORSTADIUS uppger arten från Växjö. (Ent. T. 1915, 1, sid. 66.)
- X. lutea* STRÖM. 1 ex.  $\frac{19}{9}$  19, 1 ex.  $\frac{14}{9}$  24 på lockbete. Förmodl. sällsynt i Fliseryd.
- X. fulvago* L. ab. *flavescens* ESP. 1 ex.  $\frac{16}{8}$  13, 1 ex.  $\frac{11}{9}$  24.
- Luceria virens* L. Ett ex.  $\frac{29}{8}$  19, 1 ex.  $\frac{1}{10}$  23. Enl. AURIVILLIUS känd fr. Skåne, Halland o. Gotland. NORDSTRÖM anmärker arten från Värnamo-trakten. (Ent. Tidskr. 1916, häft. 3—4, sid. 178.)
- Cosmia paleacea* ESP. Ej så sällsynt i Fliseryd.
- Orthosia*-art. *lota* CL., *circellaris* HUFN., *litura* L. och *helvola* L. äro vanliga på lockbete om hösten, den senare talrikast.
- O. macilentæ* HÜBN. 2 ex. på lockbete i sept. 24. ORSTADIUS och BRUNDIN uppge arten fr. Växjö-trakten 1914. (Ent. Tidskr. 1915, 1, sid. 65; 1916, 2, sid. 105.)
- Orrhodia rubiginea* FABR. 2 ♀ tagna på lockbete  $\frac{30}{9}$  och  $\frac{4}{10}$  24.
- O. vau punctatum* ESP. 2 ex. i slutet av okt. 23, tagna på lockbete.

*O. erythrocephala* FABR. Ny för Sverige. 7 ex. tagna på lockbete i slutet av sept. o. okt. 1923 o. 24. BENANDER har haft en ♂ för undersökning av dess genitalorgan och sålunda säkert konstaterat arten. I Nord. Fj. säges den en gång vara funnen på Sjælland; Danmarks Fauna uppger den som mycket sällsynt och upptar som fyndorter: Sj. (Ermelund), Jyll. (Lemvig), Loll. (Kældskov).

*Scopelosoma satellitia* L. Förekommer sparsamt på lockbete om hösten.

*Xylina furcifera* HUFN. Ett och annat ex. på lockbete.

*X. ornithopus* HUFN. 1 ex.  $\frac{29}{10}$  23, 1 ex.  $\frac{4}{10}$  24 på lockbete.

*Calocampa exoleta* L. 1 ex.  $\frac{5}{10}$  23, 1 ex.  $\frac{29}{9}$  24 på lockbete.

*C. vetusta* HÜBN. Ej vanl. på lockbete.

*C. solidaginis* HÜBN. 1 ex.  $\frac{30}{9}$  24.

*Heliothis dipsaceus* L. 1 ex.  $\frac{9}{6}$  18. Enl. Nord. Fj. funnen endast i Skåne och på Öland, och flygtiden uppges vara ang.

*Euclidia glyphica* L. Sällsynt i Fliseryd; ett ex. i juni 24.

*Zanclognatha tarsipennalis* TR. 1 ex.  $\frac{17}{7}$  20.

*Standfussia emortualis* SCHIFF. 1 ex.  $\frac{9}{7}$  21.

*Laspeyria flexula* SCHIFF. 3 ex. tagna i juli 1920.

*Herminia tentacularia* L. Sällsynt i Fliseryd. 1 ♂  $\frac{20}{7}$  20, 1 ♀  $\frac{21}{7}$  21, 1 ♂ i juli 18.

*Pechipogon barbalis* CL. Ej så sällsynt varje år i juni.

*Bomolocha fontis* THUNB. Allmän.

*Hypena rostralis* L. 1 ex.  $\frac{17}{9}$  17.

*Nemoria viridata* L. 2 ex.  $\frac{11}{6}$  18, 1 ex.  $\frac{24}{6}$  20.

*Acidalia virgularia* HÜBN. Täml. allm.

*A. humiliata* HUFN. Ej sällsynt.

*A. dimidiata* HUFN. 1 ex.  $\frac{10}{8}$  24.

*A. pallidata* BKH. Några ex. tagna i slutet av maj o. juni 1918 och 19.

*A. emarginata* L. Täml. allm., åtminstone 1920 i juli.

*A. remutaria* HÜBN. Täml. sällsynt, blott tagen i några få ex. 1918, 19 och 20 i juni.

*A. aversata* L. Sällsynt, 1 ex.  $\frac{9}{7}$  20, ab. *spoliata* STAUD. allmän.

*A. incanata* L. Täml. sällsynt; ett fåtal ex. sedda.

*Codonia punctaria* L. Täml. allm.

*C. pendularia* CL. Sällsynt, 1 ex.  $\frac{8}{6}$  19.

*C. orbicularia* HÜBN. Sällsynt, 3 ex. tagna:  $\frac{9}{6}$  19,  $\frac{2}{7}$  o.  $\frac{9}{7}$  20.

*Rhodostrophia vibicaria* CL. Endast 1 ex.  $\frac{20}{7}$  20.

*Lythria purpuraria* L. Ej sällsynt. 2 ♀  $\frac{11}{7}$ ,  $\frac{13}{7}$  21 avvika enl. beskrivn. i Nord. Fj. från mina övriga ex. genom sina ljust rödgula framvingar med helt svag grönaktig anstrykning, det breda, yttre rosa-bandet ljusare och framträder därför skarpare; det är hos den ena ♀ odelat vid framkanten; bakvingarna med obetydlig mörk skuggning vid inkanten åtminstone hos den största ♀, som mäter i spännvidd 22, den

mindre 20 mm. Mina övriga 4 ♀ och 2 ♂ av den gröngula typen ha 18 och 19 mm. spännvidd. En ♀ och en ♂ med otydliga tvärband och något mörkare grundfärg hör enl. AURIVILLIUS till var. *rotaria* FABR.

*Anaitis paludata* THUNB. Sällsynt. Endast 4 st. tagna i juli 1920 och 21.

*Lobophora sexualisata* HÜBN. Sällsynt, 1 ex.  $\frac{16}{6}$  18, 1 ex.  $\frac{3}{7}$  20.

*L. halterata* HUFN. Täml. allmän, likaså *carpinata* BKH.

*Anisopteryx æscularia* SCHIFF. Flög rätt allm. i slutet av mars och april 1920, i år (1925) ej heller sällsynt.

*Triphosa dubitata* L. 1 ex.  $\frac{30}{9}$  24 på lockbete.

*Larentia bicolorata* HUFN. Sällsynt. Endast 1 ex.  $\frac{11}{7}$  20.

*L. variata* SCHIFF. Endast 1 ex.  $\frac{17}{7}$  20, var. *obeliscata* HÜBN. ej så sällsynt, flera ex. tagna.

*L. siterata* HUFN. Sällsynt, endast 2 ex. tagna i sept. 1924.

*L. miata* L. Täml. allmän.

*L. viridaria* FABR. Täml. sällsynt. 1 ex.  $\frac{17}{7}$  24.

*L. ferrugata* CL. Ej sällsynt. Några ex. tagna.

*L. sociata* BKH. Sällsynt. Endast 1 ex.  $\frac{9}{6}$  18.

*L. alchemillata* L. Sällsynt, endast 3 st. tagna  $\frac{16}{6}$  20.

*L. albulata* SCHIFF. Endast 1 ex.  $\frac{8}{6}$  19.

*L. parallelolineata* RETZ. (= *vespertaria* BKH.). Sällsynt, 1 ex.  $\frac{30}{8}$  19.

*L. autumnalis* STRÖM. 1 ex. kläckt  $\frac{30}{5}$  18; tagen i maj 25.

*L. quadrifasciaria* CL. Endast 3 ex. tagna i juli 1920.

*L. hastata* L. var. *snbhastata* NOLCK. Sällsynt, 1 ex.  $\frac{17}{7}$  18, 1 ex.  $\frac{9}{6}$  19, 1 ex.  $\frac{18}{6}$  20.

*L. luteata* SCHIFF. (= *flavicata* THUNB.). Ej sällsynt i Fliseryd, flera ex. fångade.

*L. obliterata* HUFN. Täml. sällsynt. Blott tagen i några få ex.

*L. comitata* L. Täml. allmän.

*L. ocellata* L. Täml. sällsynt. 1 ex.  $\frac{20}{6}$  18, 2 ex.  $\frac{7}{7}$  o.  $\frac{10}{7}$  20.

*L. cognata* THUNB. Sällsynt, endast 2 ex.  $\frac{6}{7}$  och  $\frac{11}{7}$  20.

*L. olivata* BKH. Sällsynt, 2 ex.  $\frac{23}{7}$  och  $\frac{24}{7}$  23.

*Phibalapteryx tersata* SCHIFF. Endast 1 ex.  $\frac{16}{6}$  18.

*Tephroclystia satyrata* HÜBN. Allmän.

*T. sobrinata* HÜBN. Täml. allmän.

*T. subnotata* HÜBN. Endast 3 ex. tagna 1920 i juli.

*T. indigata* HÜBN. 1 ex.  $\frac{1}{6}$  19.

*T. nanata* HÜBN. Sällsynt. 2 ex.  $\frac{17}{7}$  20, 1 ex.  $\frac{9}{7}$  21.

*T. pusillata* FABR. Ej sällsynt åtminstone 1919 i maj och juni.

*T. togata* HÜBN. 1 ex.  $\frac{24}{6}$  20, 1 ex.  $\frac{17}{7}$  24.

*T. succenturiata* L. Endast 2 ex. tagna i juli 1920.

*T. sinuosaria* EV. Endast träffad 1920, då 5 ex. togos på husväggar i början av juli.

*T. pumilata* HÜBN. Tagen endast 1920 i 5 ex. under förra hälften av juli. Nord. Fj. uppger arten som mycket sällsynt: Skåne vid Farhult enl. WALLENGREN. (Av mina ex. fångades en del inomhus på väggar, de övriga togos utanför på min bostadsvägg.)

*Chloroclystis rectangulata* L. Funnen blott 1920, då 3 ex. fångades i början av juli.

*Cl. debiliata* HÜBN. Endast 1 ex.  $\frac{9}{7}$  20.

*Epirrhanthia diversata* SCHIFF. 1 ♀  $\frac{26}{4}$  18, 1 ♂  $\frac{8}{4}$  25.

*Arichanna melanaria* L. Täml. allmän kring mossar, där odon växer. Hos en ♀  $\frac{22}{7}$  24 äro de svarta fläckarna i yttre mellanfältet helt små, punktlika, så att det vita där framträder skarpt mot de i övrigt mörkfläckiga vingarna; för övrigt har jag ex. med mer eller mindre gråblå grundfärg å framvingarna.

*Numeria pulveraria* L. 2 ex.  $\frac{20}{6}$  och  $\frac{21}{6}$  18.

*Selenia lunaria* SCHIFF. 1 ex.  $\frac{17}{6}$  18.

*Gonodontis bidentata* CL. 1 ex.  $\frac{7}{6}$  19.

*Himera pennaria* L. 1 ex.  $\frac{5}{10}$  24.

*Angerona prunaria* L. 1 ♀  $\frac{22}{6}$  17 från Långemåla s:n, 1 ♂  $\frac{17}{6}$  21. Troligen sällsynt.

*Eurymene dolabaria* L. 1 ex.  $\frac{20}{6}$  18, 2 ex. 1921  $\frac{25}{5}$  och  $\frac{17}{6}$ .

*Epione parallelaria* SCHIFF. (= *vespertina* THUNB.). Endast en ♀  $\frac{10}{8}$  24.

*Semiothisa alternaria* HÜBN. Ej sällsynt.

*S. liturata* CL. Denna art har jag ej funnit vara så allmän i Fliseryd som i Rumskulla.

*Hibernia marginaria* BKH. I slutet av mars 1920 fångades några ♂, sedan dess ej funnen.

*H. defoliaria* CL. Sällsynt, 1 ♂ i okt. 25.

*H. leucophæaria* SCHIFF. Några ♂ fångade om dagen på ekstammar i slutet av mars 1920. I Nord. Fj. uppges arten i Sverige endast vara funnen i Skåne. Någon uppgift om, att den skulle vara tagen norr därom, har jag inte sett.

*Boarmia jubata* THUNB. Tagen endast 1920, då 3 ex. fångades i mitten av juli.

*Fidonia carbonaria* CL. En ♀  $\frac{12}{5}$  18, 1 ♂  $\frac{10}{5}$  19.

*Thamnonia wauaria* L. Endast 1 ex.  $\frac{20}{7}$  24; troligen sällsynt i Fliseryd.

*Th. brunneata* THUNB. Synes ej förekomma så allmänt som i Rumskulla.

*Phasiane petraria* HÜBN. Sällsynt, endast 1 ex.  $\frac{25}{5}$  22.

*Ph. clathrata* L. Sällsynt, 1 ex.  $\frac{18}{5}$  18.

*Perconia strigillaria* HB. Ej sällsynt.

*Nola cuculatella* L. 1 ex.  $\frac{7}{7}$  20.

*N. centonalis* HÜBN. 2 ex. i mitten av juli 1920.

*Spilosoma mendica* L. 2 ♀  $\frac{30}{5}$  20 och  $\frac{5}{6}$  22.

- Hylophila prasinana* L. 1 ex.  $31/5$  22 på lockbete.  
*Nudaria mundana* L. Täml. allm. i början av juli 1920, då flera ex. togos på husväggar.  
*Cybosia mesomella* L. Endast 1 ex.  $9/7$  21; troligen sällsynt i Fliseryd.  
*Lithosia deplana* ESP. 2 ex.  $16/7$  20, de enda jag träffat.  
*Crambus rostellus* LAH. 1 ex. i Mönsterås s:n  $12/7$  21. Denna för vår fauna nya art är bestämd av P. BENANDER, som undersökt dess genitalorgan och funnit, att den ej kan tillhöra *perlellus* Sc., som den till det yttre alldeles liknar.  
*Hypochalcia ahenella* SCHIFF. 3 ex. i början av juli 1920.  
*Salebria fusca* HW. 2 ex.  $12/7$  20.  
*Herculia glaucinalis* L. 1 ex.  $15/8$  18.  
*Cledeobia angustalis* SCHIFF. 1 ex. Mönsterås  $12/7$  21.  
*Psammotis pulveralis* HB. 3 ex. tagna i början av juli 1920 och 21.  
*Eurrhypara urticata* L. Ej allmän.  
*Evergestis straminealis* HB. Endast 1 ex.  $15/7$  20; *E. extimalis* Sc. förekommer däremot allmänt.  
*Pionia prunalis* SCHIFF. Ej allmän. *P. forficalis* L. uppträder rätt allmänt som skadedjur på kål.  
*Pyrausta porphyralis* SCHIFF. Sällsynt. 1 ex.  $1/6$  19. *P. purpuralis* täml. allm. — För bestämningen av en del arter har jag att tacka hr P. BENANDER.

ELVING WELANDER.

### Några fjärilar från norra Kalmar län.

Som ett litet tillägg till mina förut publicerade Fjärilsfynd från gränstrakterna av Kalmar och Jönköpings län (Ent. T. 1917 och 18) meddelas härmed ännu några fynd och iakttagelser, gjorda dels av mig, dels av min bror. (A. W.)

*Zephyrus quercus* L. Flög allm. i Rumskulla 1920 i juli och början av augusti.

*Acherontia atropos* L. Ett dött individ hittat i en trädgård i Gnöst, norra Rumskulla s:n, omkring mitten av juli 1923.

*Drepana lacertinaria* L. 2 ex.  $26/7$  1918 och 22 i Rumskulla.

*Agrotis baja* FABR. Ett ex. i aug. (eller sept.) 1923 i Rumskulla.

*Hadena furva* HÜBN. Ett ex.  $24/7$  18 i Rumskulla.

*Nenia typica* L. Ett ex. fr. Hultsfred  $2/7$  15 (A. W.).

*Parascotia fuliginaria* L. Ett ex.  $22/7$  21 i Rumskulla.

*Lythria purpuraria* L. Ett ex.  $30/7$  18 i Rumskulla.