

Eucosmia certata HÜBN. En ♀ fångad i juni 04 i Rumskulla (A. W.).

Larentia sociata BKH. Ett ex. $\frac{22}{8}$ 20, 1 ex. $\frac{4}{7}$ 21.

L. quadrifasciaria CL. Ett ex. i slutet av juli 1920 i Ingatorp.

L. caesiata LANG., har jag under de senare åren funnit vara allm. i Rumskulla.

L. bicolorata HUFN. 1 ex. $\frac{6}{8}$ 19 i Rumskulla. Däremot är arten täml. allm. i Lönneberga s:n.

Tephroclystia sobrinata HÜBN. 2 ex. fr. Rumskulla $\frac{8}{8}$ och $\frac{12}{8}$ 20, 1 ex. från Kråkskult $\frac{20}{7}$ 20.

Chloroclystia rectangulata L. 1 ex. $\frac{1}{8}$ 18 i Rumskulla.

Acidalia emarginata L. Några ex. fångade $\frac{3}{7}$ 18 i Rumskulla.

A. aversata L. ab. *spoliata* STAUD. 1 ex. $\frac{8}{8}$ 19.

Epione parallelaria SCHIFF. Ett och annat ex. taget sen 1918 nästan årligen i slutet av juli o. aug. i Rumskulla.

Thamnonia wauaria L. 1 ex. $\frac{3}{7}$ 18.

Boarmia ribeata CL. 1 ex. i Hult s:n $\frac{22}{7}$ 20 (A. W.).

B. jubata THUNB. 1 ex. $\frac{27}{7}$ 18, 1 ex. $\frac{22}{7}$ 20.

Hepiolus sylvinus L. 1 ♀ $\frac{20}{7}$ 23 i Rumskulla.

Nymphula stagnata DON. Blott funnen i Rumskulla 1920 i slutet av juli; arten är däremot liksom *nymphæata* L. allm. i Fliseryd.

Paraponyx stratiotata L. 2 ex. $\frac{22}{7}$ 20 i Rumskulla.

Scoparia frequentella STT. 1 ex. $\frac{3}{7}$ 20 i Rumskulla.

Syllepta ruralis Sc. 1 ex. $\frac{11}{8}$ 11.

Rättelser: Vid en noggrannare undersökning av mina *Cucullia*-ex. från Rumskulla har det visat sig, att de ej tillhöra *lactuca*, som jag (1918, sid. 335) uppgett, utan *lucifuga* HÜBN. *C. lactuca* har jag i Fliseryd uppfött och kläckt (larver på eftersommaren ej sällsynta på *Sonchus arvensis*) och har sålunda kunnat jämföra de båda närstående arternas genitalier. — Av ett misstag har jag (1918, sid. 337) uppgett *Lobophora sexualisata* såsom täml. allm. i Rumskulla. Denna uppgift passar bättre för *L. halterata*, som jag tagit i ett flertal ex. Av *sexualisata* har jag endast ett ex. från Rumskulla, taget i juni 1917. — Mina båda ex. av *Larentia »dilatata»* från Rumskulla (1918, sid. 337) ha vid undersökning av dess genitalier visat sig tillhöra *autumnata* BKH. Någon *dilatata* har jag ej från Rumskulla, men hösten 1920 fångades ett par ex. vid Tranås, där också *autumnata* flög i mängd i björkskog; fångade ett flertal ex. av den senare, både ♀ o. ♂, men ♀ voro långt fåtaligare än ♂.

Fliseryd $\frac{15}{4}$ 1925.

ELVING WELANDER.