

som visade sig tillhöra ovannämnda art. Exemplaret är enligt etiketten taget vid Ystad den  $\frac{25}{7}$  1908. Enligt Danmarks Fauna är flygtiden juni med en eventuell andra flygtid i augusti. Både AMMITZBÖLLS och WAHLGRENs exemplar äro tagna de sista dagarna i juli, varför de sannolikt båda tillhöra den andra generationen, i all synnerhet som AMMITZBÖLLS exemplar av utseendet att döma är helt nykläckt.

Lund, Entomologiska laboratoriet, mars 1927.

Martin Lindström.

## Frågor och svar.

Flera föreningsmedlemmar ha för Red. uttryckt den önskan, att de genom tidskriften skulle sättas i stånd att komma i kontakt med varandra för utbytande av erfarenheter. Red. har därför reserverat utrymme härför under rubriken »Frågor och Svar».

Red.

1. *Rosalia alpina* L. uppgives av THOMSON vara sällsynt i Skånes och Blekinges bokskogar. Är den tagen någonstades de senare åren?
2. *Cerambyx heros* Sc. uppgives likaledes från Skåne. Är den tagen annorstädes?
3. THOMSON upptager endast *Trichius fasciatus* L. REITTER åter har 2 arter, som kunna komma ifråga: *fasciatus* L., som han säger är vanlig, och *zonatus* GERM., av vilken han säger att *var. gallicus* HEER. finnes i Sverige. Jag har samlat ett stort antal exemplar och tycker att alla skulle vara den sistnämnda. Hur förhåller detta sig?

I. Amnitzböll.