

## Frågor och svar.

### Svar.

Med anledning av d:r I. AMNITZBÖLLS fråga n:r 3 i föregående nummer av tidskriften ber jag få upplysa, att båda dessa *Trichius*-arter verkligen finnas i Sverige. Av mina 23 svenska ex. äro 19 *T. fasciatus* L., 2 ex. *zonatus* GERM. och 2 ex. *zonatus* GERM. ab. *gallicus* HEER. De *fasciatus*-ex., som bära lokaletiketter, äro tagna i Småland, Östergötland och Närke, från sistnämnda landskap de flesta. Ex. av huvudarten *zonatus*, vilken sålunda gent emot REITTERS påstående också tillhör vår fauna, äro tagna det ena i Virserum, Småland, och det andra sannolikt i Närke, taget under mina tidiga samlarår, då djuren tyvärr ej försågos med lokal-etikett eller datum. Av ex. av ab. *gallicus* är det ena också det utan lokal-etikett, sannolikt taget i Närke, och det andra bär lokaletiketten »Kvistbro» (socken i västra Närke), därifrån även ett ex. av *fasciatus* föreligger. Om man vågar döma av mina hithörande ex., skulle *fasciatus* vara den allmännare arten uppåt landet, under det att *zonatus* ab. *gallicus* enligt d:r AMNITZBÖLLS (dock något osäkra) uppgift skulle ha större frekvens söderut. Detta blir emellertid en intressant sak att söka utreda. Här är åter ett exempel på att även våra »allmänna» arter behöva noga granskas.

Förmodligen ha flera coleopterologer sett REITTERS uppgift om *T. zonatus* ab. *gallicus* i Sverige men måhända kommit till korta vid bestämningen eller icke vågat lita på sina ögons vittnesbörd. Granskningen av den huvudsakliga särskiljande karaktären kräver ju en del uppmärksamhet. Men fasthåller man vid, att fårans (eller utskärningens) på mellantibiernas ytterkant begränsning uppåt på sidorna hos *zonatus* är ungefär lika formad, under det den uppåt vid innersidan hos *fasciatus* löper ut i en oftast grov (den varierar något) tagg och framåt icke alls är markerad, synes tveksamhet icke behöva uppstå.

Anton Jansson.