

Sjukällebacken och nära hälsokällan talrika larver juli 26; Sk. Båstad: juni 25 S.G. Gtl. Västerhejde: Bäck genom Kneippbyn några fullbildade ex. juni 24. Ryssby, Kronob. l., allmän, t. ex. Ugglandsryd, Tuna, Ryssby (många lokaler) 1 långvingad ♂ aug. 23 S.G., Borsna nära Staffansbodasjön. I Ryssbytrakten tyckes *Velia* föredraga små bäckar, som delvis torka ut under sommaren, eller diken genom källdragsmark och undvika större bäckar eller forsande åar. Den visar sig från tidigt på våren t. ex.  $\frac{3}{3}$  23,  $\frac{1}{4}$  25 till långt in på senhösten t. ex.  $\frac{26}{10}$  25, då minst ett par hundra ex. sågos, däribland flera copulerande par. Under den milda perioden under 1924—25 års vinter sågos flera *Velia*  $\frac{26}{10}$  24— $\frac{28}{2}$  25.

Österhovsberga augusti 1926.

Daniel Gaunitz.

**Boreus westwoodi** Hag., 2 ♂♂, togs i april 1926 i Korsberga socken och by, Sm. *B. hiemalis* L. är allmän i Korsberga och Ryssby Kronb. l., 2 ♂♂ sedda från Linköping.

Österhovsberga augusti 1926.

Daniel Gaunitz.

**Något om *Donacia (Plateumaris)* i Karlskogatrakten. (Södra Värmland.)** — Karlskoga municipalsamhälle ligger vid den 1 mil långa sjön Möckeln, i vars norra ända utmynna de 2 älvarna Tims- och Svartälven, 3—4 km. från Karlskoga. I dessa älvar finnes en otalig mängd vita och gula näckrosor, *Alisma*, *Sagittaria*, *Potamogeton* samt säv, vass och starr, varför trakten bör vara ytterst lämplig för *Donacia*. Jag har de senaste 3 åren särskilt intresserat mig för detta släkte och har lyckats få en ganska komplett samling arter och varieteter. I synnerhet sommaren 1924 var ovanligt rik på de arter, som uppehålla sig på näckrosblad. Sålunda såg jag 100-tals *D. spinosa*, *dentata*, *versicolorea* och *sparganii*, och då vattenståndet den sommaren var ovanligt högt, så att det på försommaren steg över vassen i sjön Möckeln, sökte sig en mängd *D. thalassina* in till stranden, där de kunde plockas med händerna även på icke-vattenväxter. I sammanhang härmed må nämnas, att följande sommar 1925, då vattenståndet tvärtom var mycket lågt, såg jag icke en enda *thalassina*. I år (1926) med normalt vattenstånd har jag däremot fått några ex. av denna art.

Sommaren 1925 förekommo efter varandra i Timsälven: under försommaren *D. sparganii*, under högsommaren *dentata*, *spinosa*, *versicolorea* (på näckrosblad och även i blommorna, där de förtärde ståndarmjöl), den sistnämnda på hösten ännu den 5 okt. på *Potamogeton*.

Vid Möckelns strand voro vanliga under försommaren samma år på *Scirpus sylvaticus*-blommor: *D. aquatica*, *lemnæ*, *linearis*, *impressa*, *Pl. geniculata* och *lævicollis*. På *Sparganium*: *D. sagittariæ*; på *Alisma*: *D. dentata*.

1926 togos på *Scirpus*-blad (aldrig på blommor) i Svartälven ungefär till den 15 juli: *D. aquatica*, *impressa*, *thalassina*, *obscura*, *mutica*, *Pl.*