

skadeinsekternas kläckningsställe var funnet. Delar av ett par sedan många år, då den 14.5. 1923 även bebodda bo lades i sållapparat. Ett flertal fjäril- och skalbagglarver tillvaratogs, ett par imagines av mal-fjärilar och nedanstående skalbaggar. Dessa har herr red. A. JANSSON haft den stora vänligheten bestämma. Efter razzian mot sparvbona uppträdde skadeinsekterna ytterst sällan, i varje fall icke talrikare än vad jag funnit på andra håll.

Sållningen gav inalles 46 exemplar tillhörande fyra familjer:

*Ptinidæ*: *Ptinus fur* L. 4 ex., *Pt. raptor* STURM. 1 ex., *Pt. ? subpilosus* STURM. 1 ex.

*Dermestidæ*: *Dermestes lardarius* L. 2 ex.

*Cryptophagidæ*: *Cryptophagus fumatus* MRSCH. 1 ex.

*Lathridiidæ*: *Enicmus minutus* L. 20 ex., *Corticaria serrata* PAYK. 13 ex., *C. pubescens* GYLL. 4 ex.

Öster Korsberga 1927.

C. B. Gaunitz.

**Fynd av syrphider.** *Didea intermedia* Sw. Sm., S. Vi 19.7.26. (D. GAUNITZ); Sm. Korsberga 29.8.26. — *Pelecocera trincta* MEIG. Sm., Korsberga 12.8.26. (D. GAUNITZ). — *Volucella inanis* L. Sm., S. Vi omkr. 25.7.26. (D. GAUNITZ). Byte åt en *Laphria*. — *Helophilus consimilis* MALM. Sm., Krb. 1., Ryssby 19.6.25. På blommor av *Viburnum opulus*. — *Eumerus flavitarsis* ZETT. Gotl., Kneippbyn 13.7.24. (D. GAUNITZ).

Sven Gaunitz.

**Halländska fjärilar II.** — Då jag även under år 1927 en kortare tid vistades vid Tylösand utanför Halmstad och därvid gjorde en del fjärilfynd, kan jag nu med ett antal arter komplettera den förteckning över Hallandsfjärilar jag lämnade i tidskriftens 48:de årgång (1927, p. 98—116). Nedanstående fjärilar äro tagna under tiden 7—18 augusti, så vida ej annat angives, de flesta nattetid medelst ljusfångst, i rum (nedan betecknad med r) eller bland dynerna på strandråg (betecknat med s). Småfjärilarna bestämda eller bestämningen kontrollerad av P. BENANDER.

*Amorpha (Smerinthus) populi* L. (r), flera exemplar.

*Hepialus sylvinus* L. (r), ej sällsynt, endast ♂-exemplar.

*Calocasia (Demas) coryli* L., en larv på sälg. — *Euxoa (Agrotis) tritici* L. (s), allmän, ytterst variabel, bl. a. *ab. aquilina* HB. och *eruta* HB. Denna »art» och dess utbredning borde hos oss närmare studeras, då det ej är uteslutet, att flera goda arter dölja sig under vad vi kalla *tritici* L. — *Rhyacia (Agrotis) glareosa* ESP. (s), endast ett exemplar, en ganska mörk hona. Arten är ej mer än 2 gånger förut anmäld från Sverige: Kristianstadstrakten (E. T. 1887, p. 68) och Pjätteryd i Syd-

småland (E. T. 1925, p. 36). — *R. castanea* Esp. (s, r), flera exemplar ♂♀, även på lockbete; några tillhöra den mörkt brunröda *ab. cerasina* FRR. — *Cerastis (Agrotis) sobrina* BSD (s), flera exemplar. — *Triphena (Agrotis) fimbria* L. (r), ett exemplar. — *Scotogramma (Mamestra) trifolii* ROTT (s), allmän. — *Sideridis (Leucania) conigera* SCHIFF. (s), ej sällsynt. — *Oligia (Miana) literosa* HAW (s), flera exemplar, betydligt större och mörkare än dem jag sett från Mälåröarna och Stockholms skärgård. — *Gortyna (Helotropha) leucostigma* HB. (s), tämligen allmän i flera varianter, däribland *lumina* HAW. och *albipuncta* TUTT. — *Apamea (Hydroecia) nictitans* BKH. (r, s) ej sällsynt; *A. crinanensis* BURR. (r), endast en ♂. — *Laspheyria flexula* SCHIFF. (r), en ♂, en ♀. — *Parascotia fuliginaria* L., några exemplar hävade nattetid.

*Ptychopoda (Acidalia) inornata* HAW. (r), några stycken. — *Cidaria ferrugata* CL. (r), några; *C. silaceata* SCHIFF. (r), ett fåtal. — *Eupithecia oblongata* THNBG (s), flera exemplar; *E. absinthiata* CL. (r), allmän. — *Gnophos obscuraria* HB., några exemplar.

*Crambus fascelinellus* HB. (s), ett exemplar; enligt WAHLGREN (Svensk Insektafauna 10. II. Pyralidina, 1915) förut känd från sandfält i Skåne, Öland och Gotland; BENANDER meddelar, att han förut sett halländska individ. *C. pinellus* L. (s), flera exemplar; *falsellus* SCHIFF. (r), tämligen allmän. — *Anerastia lotella* HB. (s), enligt WAHLGREN (l. c.) endast känd från Skåne och Gotland, på sandfält. — *Ephestia elutella* HB. — *Saltebrina fusca* Hw., flera exemplar. — *Scoparia ambigualis* TR. (r), flera; *trunciolella* STT., flera; *cratigella* HB., allmän. — *Pyrausta purpuralis* L. (r), tämligen allmän; *cingulata* L. (s), ett exemplar, förut enligt WAHLGREN känd från Skåne, Östergötland och Gotland.

*Cacoecia piceana* L. — *Pandemis heparana* SCHIFF. — *Evetria buoliana* SCHIFF. — *Argyroploce betuletana* Hw. — *Lobesia permixtana* HB., <sup>2</sup>/<sub>6</sub> 1924. — *Pamene populana* F.

*Depressaria assimilella* TR., kläckt från larver på *Sarothamnus*, larverna till största delen parasiterade av en liten stekel.

*Cedestis gysselinella* DUP.

*Endrosis lacteella* SCHIFF. — *Gelechia continuella* Z. — *Lita atriplicella* F. R. — *Tachyptilia populella* CL. — *Aristotelia ericinella* DUP. — *Coleophora anatipenella* HB.

*Frithiof Nordström.*

**Myror i elektrisk kokspis.** En tjänsteman i Mörby villasamhälle utanför Stockholm omtalade nyligen i brev, att myror — enligt insänt prov *Lasius niger* L. — börjat uppträda störande i ett kök. Egendomligt nog visade de sig redan 1927 ha innästlat sig i en elektrisk kokspis, en s. k. seveppis, i vars yttre kapokisulering de hade anlagt sitt bo. Det låg närmast ytterväggen i den längst från själva värmeplattorna belägna delen av spisen, där temperaturen givetvis icke