

skadeinsekternas kläckningsställe var funnet. Delar av ett par sedan många år, då den 14.5. 1923 även bebodda bo lades i sållapparat. Ett flertal fjärlil- och skalbagglarver tillvaratogs, ett par imagines av mal-fjärilar och nedanstående skalbaggar. Dessa har herr red. A. JANSSON haft den stora vänligheten bestämma. Efter razzian mot sparvbona uppträdde skadeinsekterna ytterst sällan, i varje fall icke talrikare än vad jag funnit på andra håll.

Sållningen gav inalles 46 exemplar tillhörande fyra familjer:

Ptinidæ: *Ptinus fur* L. 4 ex., *Pt. raptor* STURM. 1 ex., *Pt. ? subpilosus* STURM. 1 ex.

Dermestidæ: *Dermestes lardarius* L. 2 ex.

Cryptophagidæ: *Cryptophagus fumatus* MRSCH. 1 ex.

Lathridiidæ: *Enicmus minutus* L. 20 ex., *Corticaria serrata* PAYK. 13 ex., *C. pubescens* GYLL. 4 ex.

Öster Korsberga 1927.

C. B. Gaunitz.

Fynd av syrphider. *Didea intermedia* Sw. Sm., S. Vi 19.7.26. (D. GAUNITZ); Sm. Korsberga 29.8.26. — *Pelecocera trincta* MEIG. Sm., Korsberga 12.8.26. (D. GAUNITZ). — *Volucella inanis* L. Sm., S. Vi omkr. 25.7.26. (D. GAUNITZ). Byte åt en *Laphria*. — *Helophilus consimilis* MALM. Sm., Krb. 1., Ryssby 19.6.25. På blommor av *Viburnum opulus*. — *Eumerus flavitarsis* ZETT. Gotl., Kneippbyn 13.7.24. (D. GAUNITZ).

Sven Gaunitz.

Halländska fjärilar II. — Då jag även under år 1927 en kortare tid vistades vid Tylösand utanför Halmstad och därvid gjorde en del fjärlilfynd, kan jag nu med ett antal arter komplettera den förteckning över Hallandsfjärilar jag lämnade i tidskriftens 48:de årgång (1927, p. 98—116). Nedanstående fjärilar äro tagna under tiden 7—18 augusti, så vida ej annat angives, de flesta nattetid medelst ljusfångst, i rum (nedan betecknad med r) eller bland dynerna på strandråg (betecknat med s). Småfjärilarna bestämda eller bestämningen kontrollerad av P. BENANDER.

Amorpha (Smerinthus) populi L. (r), flera exemplar.

Hepialus sylvinus L. (r), ej sällsynt, endast ♂-exemplar.

Calocasia (Demas) coryli L., en larv på sälg. — *Euxoa (Agrotis) tritici* L. (s), allmän, ytterst variabel, bl. a. *ab. aquilina* HB. och *eruta* HB. Denna »art» och dess utbredning borde hos oss närmare studeras, då det ej är uteslutet, att flera goda arter dölja sig under vad vi kalla *tritici* L. — *Rhyacia (Agrotis) glareosa* ESP. (s), endast ett exemplar, en ganska mörk hona. Arten är ej mer än 2 gånger förut anmäld från Sverige: Kristianstadstrakten (E. T. 1887, p. 68) och Pjätteryd i Syd-