

**Fynd av *Ranatra linearis* L.** Herr E. B. Roos, Malmberget, har meddelat mig, att han under den gångna sommaren, i mitten av juli, tagit några ex. av *Ranatra linearis* L. i Kappemålagölen, Hjorteds socken, Småland.

Förut blott funnen i Skåne, Västergötland och Uppland (enligt TULLGREN-WAHLGREN, Sv. Insekter).

Stockholm den 9 nov. 1928.

Axel Olsson.

### ***Bryotropha mundella* Dgl., en för Sverige ny Gelechiid.**

Att Sveriges lepidopterfauna ännu ej är tillnärmelsevis säkert känd, ens beträffande de faunan sammansättande arternas antal, framgår tydligt av det stora antal arter, framförallt s. k. »mikrolepidoptera», som de senare åren för första gången anträffades här i landet, ett flertal t. o. m. i Skåne.

Till nykomlingarna — om av invandrings- eller upptäckthistoriska orsaker torde ej med nuvarande ringa kännedom om våra »mikrolepidopterers utbredning gå att avgöra — kan jag lägga ännu en, nämligen *Bryotropha mundella* DGL., som jag i ett enda fullständigt rent exemplar ertappat i södra Halland för ett par år sedan. Folkskollärare PER BENANDER, som välvilligt bestämt samtliga mina halländska »mikros», lämnade mig tillbaka detta exemplar med meddelande, att det tillhörde en för honom okänd art. Jag sände då djuret till Professor HANS REBEL i Wien för bestämning och erhöll snart meddelande, att det tillhörde ovanstående art, *Bryotropha mundella* DGL., som alltså nu får inregistreras såsom svensk medborgare.

I LARSEN: »Fortegnelse over Danmarks Mikrolepidoptera», Entomologiske Meddelelser. Bind XI, 1916—17 finnes arten icke upptagen såsom dansk, men den har senare blivit anträffad i vårt södra grannland. I samme författares »Tillæg til Fortegnelse over Danmarks Mikrolepidoptera ibid. Bind XVII, 1927, upptages nämligen arten i fråga såsom dansk, bl. a. funnen på ljunghedar vid Faaborg. Denna ekologiska uppgift passar bra in på den svenska fyndorten — ljunghedar saknas ju knappast någonstades i Halland. STAUDINGER-REBEL: »Catalog der Lepidopteren des palæarctischen Faunengebietes» och SPULER: »Die Schmetterlinge Europas» angiva som utbredningsområde för *Bryotropha mundella* DGL., England och Tyskland.

Lund, oktober 1928.

Martin Th. V. Lindström.

**Återfunnen skalbagge.** *Orchestes rufitarsis* GERM. GRILL angiver i sin katalog p. 299 arten funnen i Sverige enligt BRISOUT. Professor CHR. AURIVILLIUS avhandlar släktet *Orchestes* i Svensk Insektafauna 9 häft. 2 p. 109—112 och har där utslutit arten, tydligen av den anledning att han ansett arten som icke svensk.

I ett *coelepteramaterial*, som av mig insamlades under sommaren 1925 söder om Stockholms stad på skyddshemmet Skrubbas ägor, återfanns ett exemplar av arten taget vid slaghåvning i buskvegetation vid åkerrenar under augusti månad. Buskvegetationen bestod av asp-, vide- och ekbestånd, och kan jag icke avgöra något närmare om fyndorten i övrigt.

Exemplaret har välvilligt determinerats av Red. ANTON JANSSON.

Österkorsberga i nov. 1928.

C. B. Gaunitz.

**Sen flyvetid for *Amphidasis betularia* L.** Inneværende sommer 1928 var vel en slett sommer over hele Norden. Her på den norske vestkyst var den iallfall trøstesløs. Kjølign vær med regn og atter regn i måneder. At insektlivet under sådanne forhold blir nedsatt er forklarlig. Likeså at flyvetiden for enkelte insekter bli unormal. Bl. a. ved at insektets forpupning går sent for sig eller at puppehvilen blir lengere enn vanlig.

I begynnelsen av August da været en ukes tid var litt sommerligt var jeg på en tjenestereise til indre Sunnmøre nådd til det bekjente turistsentrum Geiranger. Ved ankomsten til hotell Union, Maråk den 10. august om aftenen fandtes på balkongen utenfor hotellværelset 1 par *Amphidasis betularia* in copula. Det viste sig å være to prektige eksemplarer. ♂ målte 44 mm. og ♀ der er meget mørk — (dog ikke ab. *doubledjaaria* MILL.) 52 mm. AURIVILLIUS opgir i »Nordens Fjärilar» vingefanget sil 40—51 mm.

Nogen dager senere eller den 13. august tokes på hotellet yderligere en ♀ (normalfarvet 44 mm.). Blev fanget på en nokså eindommelig måte. Da jeg om morgenen gikk en tur langs den store verrande der i 1:ste etage går rundt en del av hotellbygningen og hvis tak om sommeren utgjøres av seilduk bemerket jeg gjennom seilduken en mørk skjyge som straks observertes å være en sommerfugl. En spaserstok hentedes og ved å banke litt på seilduken drattet den søvndrukne måler nedover taket og blev innfanget. Ett annet eksemplar av samme art behandledes på samme måte, men tok ved fallet fra taket til vingene og undslap til ett staudebed i haen, hvor den dog trods ihærdig søken var spurlos versenkt.

At bjørkemåleren flyr så sent er vel ualmindeligt. AURIVILLIUS, »N. Fj.» och Klöcher i Danmarks Fauna. IV. Natsommerfugl opgir begge flyvetiden til mai—juni.

Her i Ørstavik, Søndre Sunnmøre, mit bosted, har jeg tatt *A. betularia* så tidlig som 2. mai (1927 1 ♀ 50 mm.).

∫. Werner.