

## Smärre meddelanden och notiser.

### Vad är *Megachile centuncularis* v. *Jansoni* ALFKEN?

I Entomologisk Tidskrift 1926 s. 202 har hr ALFKEN beskrivit en ganska stor, gråaktig *Megachile* under namnet *centuncularis* v. *Jansoni*. Jag har sett en av de två av hr ALFKEN omnämnda ♀♀ från Gotska Sandön och dessutom en av hr ALFKEN bestämd ♀ från Gotland (Kneippbyn) och kan inte finna annat än att det är fråga om en färgvarietet av *M. willughbiella* KIRB. Munskölden är jämnt välvd, tät punkterad med glatt, smal mittlinje så som hos *willughbiella* och ej i mitten nästan puckellikt — fastän svagt — välvd, och mot mitten glesnande, grövre punkterad som hos *centuncularis*; bakskenbenens yttre sporre är helt lika *willughbiella*-♀:ns; trubbig med skarpt böjd spets och ej jämnt avsmalnande med längre krökt spets som *centuncularis*-♀:ns; sista ryggleden har långa, täta, mot spetsen halvt nedliggande och något böjda, grova hår som *willughbiella*; ej mera uppräta, finare, rakare hår som *centuncularis*; gaddskidan har i spetsen *willughbiella*-♀:ns täta tofs av långa, starkare böjda, långt utanför spetsen nående hår och ej *centuncularis*-♀:ns korta tofs av rakare, endast något över spetsen nående hår.

Typexemplaret, vars nål bär tre lappar: »G. Sandön. A. Jansson», »Torpet <sup>26/7</sup>» och »*Megachile centuncularis* L. var. nov. ALFKEN det. 1926», har pälsen och vingarne något nötta. Det har ansiktet nedanför antennerna med gråvita mot munsköldens framkant svagt i gulbrunt skiftande hår, hjässan och mellankroppsryggens mitt med mörkt brunsvarta, för övrigt med gråvita hår liksom de två första rygglederna. 2.—5. rygglederna med tilltagande vita sidofransar så att 5. leden har helt band. Kneippbyexemplaret — också något nött — har liknande päls utom möjligen något starkare gulbrunaktiga hår på huvudet.

I redaktör JANSSONS samling finnes från Gotska Sandön ännu en ♀, som nog hör hit, fast den har klarare färger — den är nästan alldeles fräsch —; ansiktet nedanför antennerna med rent vita hår på sidorna, munskölden med tydligt gulbrunaktiga, hjässan och mellankroppens mitt med svarta, sidorna med vita hår. Alla tre exemplaren ha helt gulröd bukborste.

Från G. Sandön har redaktör JANSSON 4 ♂♂, som äro helt lika — utom möjligen något mindre än — *willughbiella* ♂♂ från lokaler, där *v. Fanssoni* ej finnes. R. C. L. PERKINS omnämner i sin avhandling om de brittiska *Megachile*-arterna (The Entomologist's Monthly Magazine 1925 s. 95), att ♂♂ till hans *M. willughbiella v. hibernica* och *M. versicolor v. hibernica* icke tyckas vara (mycket) olika exemplar från England, där de irländska varieteterna saknas. Man torde därför kunna antaga, att de av redaktör JANSSON funna ♂♂ höra till ovan nämnda Sandö-♀♀.

*M. willughbiella v. hibernica* avviker från *v. Fanssoni* genom saknaden av band på 5. ryggliden; de övriga ledernas fransar skola vara mycket otydliga.

Österkorsberga den 14 februari 1930.

Daniel Gaunitz.

**Fjärilfynd från Öland.** Herr HANS LOHMÄNDER, Lund, har i och för bearbetning till mig överlämnat ett litet antal fjärilar, som av honom och hans fru denna sommar insamlats på Öland. Ehuru mycket nyligen skrivits om detta landskaps fjärilfauna, ha dock för flertalet arter fyndlokaler ej eller i ringa antal angivits; föreliggande publikation har därför sitt berättigande ur djurgeografisk synpunkt. Ett par arter, som jag själv insamlade på Öland i juni 1920, omnämnas även.

Från Böda s:n, N. Öland, härstamma följande arter, varvid uppgiften inom parentes närmare anger lokalen: *Papilio machaon* L. (nära Böda järnvägsstation  $\frac{5}{7}$ ); *Aporia crataegi* L. (nära B. jvst.  $\frac{5}{7}$ , nv. udden  $\frac{8}{7}$ ) allm.; *Leucophasia sinapis* L. (nv. udden  $\frac{8}{7}$ ); *Limenitis populi* L. (Svartvik  $\frac{10}{7}$ ); *Vanessa urticae* L.; *Polygonia calbum* L.; *Metiaca athalia* ROTT. (nv. udden  $\frac{8}{7}$ , Byerum  $\frac{4}{7}$ , nära B. jvst.  $\frac{5}{7}$ ,  $\frac{10}{7}$ ) allm.; *M. cinxia* L. (Byerum  $\frac{4}{7}$ ); *Argymnis selene* SCHIFF. ( $\frac{7}{7}$ ); *A. euphrosyne* L. (nära B. jvst.  $\frac{5}{7}$ ); *A. aglaja* L. (nv. udden  $\frac{8}{7}$ ); *Lycaena icarus* ROTT. (Byerum  $\frac{4}{7}$ ); *L. amanda* SCHN. (Byerum  $\frac{4}{7}$ , nära B. jvst.  $\frac{8}{7}$ ); *L. minima* FÜSSL. (nära B. jvst.  $\frac{5}{7}$ ); *L. semiargus* ROTT. (nv. udden  $\frac{8}{7}$ ); *Augiades sylvanus* ESP. (Svartvik  $\frac{10}{7}$ ); *Odezia atrata* L. (Byerum  $\frac{4}{7}$ ); *Cybosia mesomella* L. (nv. udden  $\frac{8}{7}$ ); *Diacrisia russula* L. (Skäftekärr  $\frac{10}{7}$ , i tallskog).

Övriga fynd: *Anthocaris cardamines* L. Algutsrum, vid Borgs ruin (K. A.); *Pyrameis cardui* L. Ottenbylund  $\frac{20}{6}$ , ett ex., medelmåttigt avfluget, fransarna till stor del borta; *Melitæa cinxia* L. Långlötstrakten (K. A.); *Arg. selene* SCHIFF. Mörbylånga alvar  $\frac{4}{8}$ , ex. av andra gen., ny för alvaret; *Satyrus semele tristis* WAHLGR. Glömminge, Gillsättra alvar  $\frac{20}{7}$ , ett ex. med en vingbredd av 42 mm. *Pararge maera* L. Högby, Horn  $\frac{24}{7}$ ; *Aphantopus hyperanthus* L. Glömminge  $\frac{31}{7}$ , Högby, Horn  $\frac{24}{7}$ ; *Coenonympha pamphilus* L. Ottenbylund; *Lycaena minima* FÜSSL. Resmo alvar  $\frac{9}{6}$ , ny för alvaret; *Hesperia malvæ* L. Vickleytrakten (K. A.), Stora Alvaret mellan Resmo och Möcklemossen  $\frac{30}{5}$ ; *Thanaos Tages* L.