

Från G. Sandön har redaktör JANSSON 4 ♂♂, som äro helt lika — utom möjligen något mindre än — *willughbiella* ♂♂ från lokaler, där *v. Fanssoni* ej finnes. R. C. L. PERKINS omnämner i sin avhandling om de brittiska *Megachile*-arterna (The Entomologist's Monthly Magazine 1925 s. 95), att ♂♂ till hans *M. willughbiella v. hibernica* och *M. versicolor v. hibernica* icke tyckas vara (mycket) olika exemplar från England, där de irländska varieteterna saknas. Man torde därför kunna antaga, att de av redaktör JANSSON funna ♂♂ höra till ovan nämnda Sandö-♀♀.

M. willughbiella v. hibernica avviker från *v. Fanssoni* genom saknaden av band på 5. ryggliden; de övriga ledernas fransar skola vara mycket otydliga.

Österkorsberga den 14 februari 1930.

Daniel Gaunitz.

Fjärilfynd från Öland. Herr HANS LOHMÄNDER, Lund, har i och för bearbetning till mig överlämnat ett litet antal fjärilar, som av honom och hans fru denna sommar insamlats på Öland. Ehuru mycket nyligen skrivits om detta landskaps fjärilfauna, ha dock för flertalet arter fyndlokaler ej eller i ringa antal angivits; föreliggande publikation har därför sitt berättigande ur djurgeografisk synpunkt. Ett par arter, som jag själv insamlade på Öland i juni 1920, omnämnas även.

Från Böda s:n, N. Öland, härstamma följande arter, varvid uppgiften inom parentes närmare anger lokalen: *Papilio machaon* L. (nära Böda järnvägsstation $\frac{5}{7}$); *Aporia crataegi* L. (nära B. jvst. $\frac{5}{7}$, nv. udden $\frac{8}{7}$) allm.; *Leucophasia sinapis* L. (nv. udden $\frac{8}{7}$); *Limenitis populi* L. (Svartvik $\frac{10}{7}$); *Vanessa urticae* L.; *Polygonia calbum* L.; *Metiaca athalia* ROTT. (nv. udden $\frac{8}{7}$, Byerum $\frac{4}{7}$, nära B. jvst. $\frac{5}{7}$, $\frac{10}{7}$) allm.; *M. cinxia* L. (Byerum $\frac{4}{7}$); *Argymnis selene* SCHIFF. ($\frac{7}{7}$); *A. euphrosyne* L. (nära B. jvst. $\frac{5}{7}$); *A. aglaja* L. (nv. udden $\frac{8}{7}$); *Lycaena icarus* ROTT. (Byerum $\frac{4}{7}$); *L. amanda* SCHN. (Byerum $\frac{4}{7}$, nära B. jvst. $\frac{8}{7}$); *L. minima* FÜSSL. (nära B. jvst. $\frac{5}{7}$); *L. semiargus* ROTT. (nv. udden $\frac{8}{7}$); *Augiades sylvanus* ESP. (Svartvik $\frac{10}{7}$); *Odezia atrata* L. (Byerum $\frac{4}{7}$); *Cybosia mesomella* L. (nv. udden $\frac{8}{7}$); *Diacrisia russula* L. (Skäftekärr $\frac{10}{7}$, i tallskog).

Övriga fynd: *Anthocaris cardamines* L. Algutsrum, vid Borgs ruin (K. A.); *Pyrameis cardui* L. Ottenbylund $\frac{20}{6}$, ett ex., medelmåttigt avfluget, fransarna till stor del borta; *Melitæa cinxia* L. Långlötstrakten (K. A.); *Arg. selene* SCHIFF. Mörbylånga alvar $\frac{4}{8}$, ex. av andra gen., ny för alvaret; *Satyrus semele tristis* WAHLGR. Glömminge, Gillsättra alvar $\frac{20}{7}$, ett ex. med en vingbredd av 42 mm. *Pararge maera* L. Högby, Horn $\frac{24}{7}$; *Aphantopus hyperanthus* L. Glömminge $\frac{31}{7}$, Högby, Horn $\frac{24}{7}$; *Coenonympha pamphilus* L. Ottenbylund; *Lycaena minima* FÜSSL. Resmo alvar $\frac{9}{6}$, ny för alvaret; *Hesperia malvæ* L. Vickleytrakten (K. A.), Stora Alvaret mellan Resmo och Möcklemossen $\frac{30}{5}$; *Thanaos Tages* L.

Vicklebytrakten (K. A.); *Lasiocampa trifolii* ESP. Långlöt, vid Ismantorps borggruin, en larv (K. A.); *Demas coryli* L. Solliden, Borgholm ¹³/₆ 1920 (K. A.); *Agrostis obscura* BRAHM. Högby, Gaxa ¹³/₇, 4 ex. under bark; *A. orbona* HUFN. (enl. Nordens Fjärilar och KLÖCKER) Högby, Gaxa ¹³/₇, ett ex. under bark; *Mamestra dentina* ESP. Ottenby ²⁰/₆, ny för Öland; *Hadena gemina* HB. Ottenbylund ²⁰/₆; *Prothymnia viridaria* CL. Resmo alvar ⁹/₆, ny för alvaret; *Plusia gamma* L. Ottenbylund ²⁰/₆, S. Möckleby, Albrunna strand ²⁰/₆; *Euclidia mi* CL. Vicklebytrakten (K. A.), Ottenby ²⁰/₆; *Hypena proboscidalis* L. Mörbylånga, S. Bårby ⁵/₈; *Mesotype virgata* ROTT., Resmo alvar ⁹/₆; *Larentia tristata* L. Ottenbylund ²⁰/₆, ny för Öland; *Abraxas sylvata* Sc. Borgholm, skogen nedanför slottsruinen (K. A.); *Opistograptis luteolata* L. Torslunda, Skogsby (K. A.); *Hibernia defoliaria* CL. Långlöt, vid Ismantorps borggruin, larver (K. A.); *Ematurga atomaria* L. Resmo alvar ⁹/₆, Kastlösa alvar ¹⁷/₆, själv fann jag arten rätt allmänt på alvaret, sannolikt vid Vickleby; *Endrosa rosida baltica* WAHLGR. Kastlösa alvar ¹⁷/₆.

Ehuru det endast var helt tillfälligt, som fjärilar tillvaratogs, innehåller den lilla samlingen dock två för Öland nya arter och ett par, som förut ej voro kända från alvaret. Det synes ju rätt egendomligt, att WAHLGREN, som ägnat så stor uppmärksamhet åt fjärilfaunan på alvaret, ej alls iakttagit dessa arter. Måhända ligger förklaringen däri, att alvaret denna sommar genom den ovanligt rika nederbörden förlorat en del av sin »alvar»-natur, varigenom nya former kunnat invandra och kvarstanna, om ock blott för en enda sommar. Ett trevligt fynd är också *Limenitis populi* L.; tyvärr äro närmare lokaluppgifter för tidigare fynd på Öland ej offentliggjorda, ehuru det vore av intresse att utreda artens utbredning i södra Sverige, då den blott sporadiskt träffats i Danmark. Ett fynd av *Pyrameis cardui* L. ett så tidigt datum som den 20 juni bör även kommenteras. Som bekant anser WAHLGREN (Fauna och Flora 1912), att denna fjäril så gott som aldrig övervintrar här i Sverige, utan alla individ, som iakttagas en sommar, äro antingen immigranter söderifrån eller avkomlingar av dessa samma år; dessa sistnämnda kunna ej övervintra utan gå sin undergång till mötes i vårt kalla klimat. Det synes ock vara rätt sällan, som larver anträffats i Sverige eller som imago iakttages på våren eller försommaren. För att kunna klargöra, hur det verkligen förhåller sig med fjärlens förekomst här, är det av betydelse, att alla iakttagelser om dess uppträdande, dess utveckling m. m. noga antecknas och offentliggöras, en uppmaning som det ej skadar att åter nämna.

Lund, den 12 november 1928.

Kjell Ander.