

Några nya fjärilformer.

Av

ERIC DAHL.

(Med 1 plansch.)

Plebeius optilete KNOCH ab. *nigromaculatus* nov.

Pl. I, fig. 1.

Skiljer sig från huvudformen därigenom att framvingarna på översidan äro försedda med tre i triangel ställda stora och tydliga svarta fläckar. Av dessa ligga två mellan R och Cu₁ och den tredje mitt under dessa mellan Cu₂ och 1 A. De båda främsta äro stora och till formen nästan fyrkantiga. Den undre är mindre och rundad.

Hab. Dlr.: Lima, Limedsforsen, 1 ♂ juli 1928 i min samling.

Rhyacia festiva SCHIFF. ab. *fibulata* nov.

Pl. I, fig. 2.

Skiljer sig från hittills beskrivna former därigenom att tappfläcken är svartkantad. Från basen av framvingen utgår ett mörkt rotstreck, som når tappfläckens övre inre kant.

Hab. Dlr.: Lima, Limedsforsen, 1 ♂ juli 1926 i min samling, ett annat ex. i Dr NORDSTRÖMS samling.

Anarta myrtilli L. ab. *nordströmi* nov.

Pl. I, fig. 3.

Framvingarnas mittparti mycket mörkt och utan spår av den hos huvudformen förekommande vita fläcken. Inre mellanlinjen förmörkad och osynlig. Yttre mellanlinjen och våglinjen däremot tydliga. Liknar ab. *mediosanguinea* HEYD., men utgör ännu ett steg i melanistisk riktning.

Hab. Dlr.: Lima, Limedsforsen, 1 ♂ juni 1925 i min samling.

Phytometra pulchra HAW. av *orbata* nov.

Pl. I, fig. 4.

En form med mycket reducerad silverteckning i mellanfältet. Av gamma-tecknet återstår endast en liten oregelbunden fläck, belägen tätt under ringfläcken, vars underkant är mycket smalare silvertecknad än hos huvudformen. Den hos huvudformen förekommande, utanför gamma-tecknets spets belägna droppfläcken saknas fullständigt.

Hab. Dlr.: Lima, Limesforsen, 1 ♀ juli 1925 i min samling.

Chiasma clathrata L. ab. *opipara* nov.

Pl. I, fig. 5.

Av framvingarnas fyra tvärband äro de tre innersta tydliga och fullständiga, under det att det yttersta är reducerat till ett kort och kraftigt streck mellan M_3 och Cu_{1b} . Av bakvingarnas tre tvärband äro de två innersta tydliga och fullständiga, men det yttersta reducerat till en fläck mellan M_3 och Cu_{1a} .

Hab. Dlr.: Lima, Limesforsen, 1 ♂ juni 1927 i min samling.

Chiasma clathrata L. ab. *declathrata* nov.

Pl. I, fig. 6.

Hos denna form saknas framvingarnas andra tvärband, från vingroten räknat, under det att de övriga tvärbanden äro normalt framträdande. I bakvingarna saknas det innersta tvärbandet, det mellersta är normalt, det yttersta reducerat, i det dess främre hälft är inskränkt till två fläckar.

Hab. Dlr.: Lima, Limesforsen, 2 ♂♂ juni 1928 i min samling.

Jag vill slutligen till Dr FRITHIOF NORDSTRÖM, Stockholm, framföra min tacksamhet för granskning av här beskrivna former, vilka av honom utpekats såsom hittills obeskrivna.

