

- Coccinella septempunctata* L. 1910—1915, Umeå, allmän.  
*Coccinella hieroglyphica* L. 1 ex. 1912, Umeå.  
*Coccinella undecimpunctata* L. 1 ex. 1910, Umeå.  
*Paramysia oblongoguttata* L. 2 ex.  $\frac{2}{5}$  1919, Umeå, SVEN GAUNITZ.  
*Anatis ocellata* MULS. Ett par ex. ej årangivna, Umeå. Troligen omkr. 1910.  
*Myrrha octodecimpunctata* L. 1 ex. 1910, Umeå.  
*Calvia quatuordecimpunctata* L. Några ex. ej årangivna, Umeå. Trol. omkr. 1910.

**Coccinellider från södra Sverige.** Nedan upptagas blott mera intressanta arter, och anför jag som fyndort endast landskap och socken.  
*Cynegetis impunctata* L. Boh. l. Fiskebäckskil, Upl. Värmdö, Resarö.

*Adonia variegata* GOEZE. Sm. Ryssby. Krb. l.

*Anisosticta novemdecimpunctata* L. I Svenska Insekter, ALB. TULLGREN och EINAR WAHLGREN, angives p. 153 om släktet *Anisosticta*: »med två sällsynta arter, den ena i Lappland». *Anisosticta strigata* THBG är den norrländska arten, och den har jag aldrig funnit. Den sydliga arten *A. novemdecimpunctata* L. är enligt min uppfattning ingalunda en sällsynthet, blott den eftersökes på lämpliga lokaler — i den frodiga växtligheten vid sjö- och bäckstränder.

Fyndorter:

Småland: Ryssby, Krb. l. täml. allmän, Myresjö täml. allmän, Gårdsby ej sällsynt, Lemnhult ej sällsynt, Österkorsberga ej allmän, Hultsjö täml. allmän.

Östergötland: Linköping möjligen rätt sällsynt, Borensberg allmän.

Uppland: Hjalsta ej sällsynt.

Västergötland: Skövde ej allmän.

*Aphidecta oblitterata* L. Sm. Myresjö, Österkorsberga.

*Coccinella distincta* FALD. Arten torde vara rätt allmän, i varje fall utbredd över praktiskt taget hela Sverige, men möjligen förbisedd.

Fyndorter:

Småland: Ryssby Krb. l., Myresjö, Österkorsberga, Kvillsfors.

Södermanland: Stockholmstrakten söderut (Skrubba).

Östergötland: Linköping.

Gotland: Västerhejde, Etelhem.

*Coccinella hieroglyphica* L. Arten angives i Svenska Insekter som »rätt sällsynt». Så vitt jag kan döma av mitt material på c:a 150 ex. är arten en utpräglad myrart. I trakterna kring Ryssby—Målaskog—Tutaryd var den synnerligen talrik överallt på myrmarkerna, åtminstone åren 1923—1925.

Fyndorter: Sm. Ryssby Krb. l., Målaskog, Tutaryd, Myresjö, Öster-

korsberga, Klavrestrom, Gränna, Södra Vi. Sö. Stockholmstrakten: Stora Sköndal—Skrubba.

*Coccinella undecimpunctata* L. Boh. l. Fiskebäckskil. Vg. Göteborg.

*Tytthaspis cedecimpunctata* L. Gtl. Västerhejde.

*Myrrha octodecimguttata* L. Sm. Myresjö, Österkorsberga, Rumskulla.

*Calvia quatuordecimguttata* L. Arten angives i Svenska Insekter som sällsynt. Denna uppgift står icke, åtminstone icke vad beträffar Småland, i överensstämmelse med mina fynd.

Fyndorter:

Småland: Ryssby Krb. l. ej sällsynt, Myresjö mindre allmän, Gårdsby ej sällsynt, Österkorsberga ej allmän, Eksjö möjligen sällsynt, Hultsjö ej sällsynt, Södra Vi möjligen sällsynt, Fliseryd (sett 2 ex. i en liten samling från WELANDER).

Södermanland: Stockholmstrakten söderut: St. Sköndal—Skrubba e sällsynt, Dunker möjligen sällsynt.

Östergötland: Borensberg ej sällsynt.

Uppland: Ultuna sällsynt.

*Chilocoris bipustulatus* L. Sm. Ryssby Krb. l., Södra Vi. Sö. Stockholmstrakten (Skrubba). Ög. Linköping.

*Exochomus quadripustulatus* L. Ög. Linköping. Uppl. Hjalsta.

Släktena *Hyperaspis*, *Pullus* o. s. v. äro delvis företedda i samlingen, men materialet är ännu ej slutgiltigt bearbetat.

I ovanstående redogörelse över Coccinellider bortser jag helt från varianter i teckningen. Detta enär jag söker avvinna materialet variationsfrekvensen för olika lokaler, och jag har således ännu blott börjat mera ingående studium av varianter.

Österkorsberga i jan. 1929.

C. B. Gaunitz.

**Öländska fjärilar.** Under två månaders vistelse på Öland sommaren 1928 erhöll jag en del fjärilararter, som icke äro upptagna i E. WAHLGREN'S, F. NORDSTRÖMS och J. A. Z. BRUNDINS förteckningar över öländska fjärilar i denna tidskrift 1924, 1925 och 1928. Icke mindre än 32 av de funna arterna äro sådana, som icke varit publicerade från Sverige. Dessa har jag här nedan sammanfört i det första stycket. Somliga äro icke ens kända från något av våra grannländer, och för de märkligaste av dessa har jag lämnat uppgift om utbredningen. Flera äro steppdjur och förut bekanta från södra Ryssland och Ungern. Alla äro tagna i Vickleby socken.

*Dysauxes ancilla* L. — *Apteronia crenulella* BRD., flera säckar med larver vid Vickleby Storkarst; ingen larv uppföddes, men ändå kan med sannolikhet antagas, att det är fråga om den parthenogenetiska formen *helix* SIEB. — *Brephilia compositella* TR., på alvaret. — *Salebria formosa* HW. — *Oxyptilus tristis* Z. — *Cnephasia genitalana* PIERCE,