

THOMSON (Opusc. Entom. 1891) skall arten »äfvén vara funnen i Sverige», men WALLENGREN uppger endast Norge. En sällsynt art, som utom Skandinavien påträffats i Finland, Ryssland och Sibirien. (MART).

*L. diphyes* MC LACHL. Lpl. Gällivare sn, Juotsajaure <sup>23</sup>/<sub>7</sub> 1928, 1 ♂ (G. STHEN coll.). Ång. Bjurholms sn, Tyfaltjärn <sup>20</sup>/<sub>7</sub> 1928, 1 ♂ (G. STHEN coll.). En nordeuropeisk-sibirisk art, som förut var känd västligast från Finland.

*Chatopteryx obscurata* MC LACHL. Vb. Degerfors sn, Vindelälven vid Vindeln <sup>20</sup>/<sub>9</sub> 1928, 4 ♂♂. Förekommer i mell. Europas bergstrakter, Danmark, Finland, Ryska lappmarken, Minoussinsk.

*Glyphopsyche sibirica* MART. Lpl. Kvikkjokk 1877, 6 ♂♂ (Riksmuseum). Dlr. Idre sn, 1—2 km från Fjälån mittför Fjätersvåla, flygande <sup>29</sup>/<sub>1</sub> 1928, 1 ♂ (G. STHEN genom krj. O. BERGSTRÖM). (ULM). En ytterst sällsynt art, beskriven från Polar-Ural och sedan funnen i Sibirien vid Minoussinsk och vid Ajan på östkusten. Den har alltså en vidsträckt utbredning, men har utan tvivel blivit förbisedd på grund av sin egendomliga flygtid. Liksom *Chilostigma* torde den framkomma på senhösten och övervintra och som imago (obs. Idre-exemplaret är taget i januari!). Bland exemplaren från Kvikkjokk sitter också en ♂ av *Chilostigma* med samma lokaletikett som dessa, varför den troligen är tagen samtidigt.

*Sisyra dalii* MC LACHL. Hall. Breareds sn, Fylleån <sup>9</sup>/<sub>8</sub> 1928, Fylleån och Simlängen <sup>25</sup>/<sub>7</sub>—<sup>7</sup>/<sub>8</sub> 1929. Närmast funnen på Bornholm.

*S. jutlandica* ESBEN-PTSON. Hall. Tönnersjö sn, bäck från Bala-sjön <sup>14</sup>/<sub>7</sub> 1929, 1 ♀. Känd från Danmark och Finland.

K. H. Forsslund.

**Rättelse.** I Entomolog. Tidskrift 1926, sidd. 86—91, meddelade undertecknad en del fynd av sällsyntare *Coleoptera* från Småland och Blekinge. Vid senare av mig företagen granskning har det emellertid så småningom visat sig, att ett rätt stort antal arter tyvärr äro felbestämda. Bestämningarna hade i dessa fall gjorts av en numera avliden känd coleopterolog, på vars auktoritet jag då trodde mig kunna lita.

Följande arter skola såsom felbestämda strykas ur förteckningen:

*Bembidion nigricorne* GYLL., *B. octomaculatum* GOEZE., *B. clarki* DAWS., *Amara quenzeli* SCHÖNH., *A. convexiuscula* MARSH., *Harpalus ferrugineus* FBR., *Hydroporus vittula* ER., *H. neglectus* SCHAUM., *H. brevis* SAHLB., *H. melanarius* STRÖM., *Agabus biguttulus* THOMS., *Heterothops quadripunctula* GRAV., *Quedius brevicornis* THOMS., *Q. tristis* GRAV.,

*Q. scintillans* GRAV., *Philonthus mannerheimi* FAUV., *Ph. coruscus* GRAV.,  
*Ph. ventralis* GRAV., *Ph. virgo* GRAV., *Ph. exiguus* NORDM., *Xantholinus*  
*glaber* NORDM., *Neuraphes sparshalli* DENNY, *Hydrobius punctatus* STRM.,  
*Liodes cinnamomea* PANZ., *L. furva* ER., *Agathidium piceum* ER., *Apho-*  
*dius tristis* PANZ., *Helophorus brevipalpis* BED., *Cercyon terminatus* MRS.,  
*Epurcea palustris* J. SAHLBG., *Cryptophagus labilis* ER., *Cr. subdepressus*  
GYLL., *Cis elongatulus* GYLL., *C. bidentulus* ROSH., *Procræus tibialis*  
LAB., *Microcara bohemanni* MNH., *Anthicus luteicornis* SCHMIDT, *Longi-*  
*tarsus niger* KOCH, *Lepyrus palustris* SCOP., *Ceutorrhynchus mölleri* THOMS.,  
*Apion penetrans* GRM., *Trypophloeus granulatus* RATZBG.

Lars Brundin.