

Litteratur.

YNGVE SJÖSTEDT: Über einen dem Stockholmer Reichsmuseum gehörenden Zwitter von *Morpho rhetenor* CRAM. — Ark. f. zool., Bd 20 A. N:o 5. Stockholm 1928. 60 sid., 5 pl., 1 textfig.

Efter en kort historik av i litteraturen omnämnda gynandromorfa fjärilar — den första, *Lymantria dispar* L. beskrevs 1761 av SCHÄFFER — övergår förf. till att i ord och bild beskriva Riksmusei förvärf av ett praktfullt exemplar av *Morpho rhetenor* CRAM. från franska Guiana. Västra vingparet prunkar i ♂:s djupblå azurfärg, medan det högra bär ♀:s ockragula och mörkt bruna färger, dock med några mindre blå stråk i framvingen och ett brett blått band i bakvingens framkant. Den förträffliga färgplanschen av över- och undersidan kan dock ej återge originalets strålande prakt. (Fjärilen är utställd i riksmusei skådesamling.) Efter ytterligare beskrivning och avbildning av några andra exotiska fjärilar, däribland ett Riksmuseum tillhörigt, av Dr A. ROMAN från Rio Negro hemfört exempl. av *Papilio helas* CRAM. *ab. amazonis* ROTSCH. & JORD., kommer en översikt av hittills bekanta utomeuropeiska arter av gynandromorfa fjärilar. Härefter följer arbetets tyngdpunkt, en mycket värdefull och så gott som fullständig förteckning av litteratur över kända gynandromorfa fjärilar (p. 9—57), där arterna följa varandra i systematisk ordning (*Papilio machaon* L. — *Chimabache fagella* F.) och det sålunda är mycket lätt att finna sig tillrätta; sammanlagt nämnas 322 arter, former och variationer. Förf. säger (p. 5), att i Sverige har hittills såvitt bekant aldrig anträffats någon gynandromorf fjärl. Det har undgått förf., att ett par dylika omnämnts i Entom. Tidskr.: *Colias hecla* LEF. (W. MEVES 1889, p. 157), ena bakvingen en ♂-vinge, de 3 övriga ♀-vingar; *Lythria purpurata* L. (F. NORDSTRÖM 1927, p. 110), vänster ♂, höger ♀.

Förf. slutar det vackra arbetet med en översikt av den viktigaste litteraturen om fjärilhermafroditer.

F. N.