

H. albiceps Frey. Myresjö: Bjädesjön; våren 1922 träffad allm. vid en bäckmynning.

Campsicnemus curvipes Fall. Ryssby.

C. scambus Fall. Myresjö; Ryssby: Tuna.

Sven Gaunitz.

Fyndorter för arter av släktet *Chilosia* Meig. samt ett fynd av *Myiolepta ruficornis* Zett. (Diptera) i Sverige.

Om ett av A. v. Stackelberg, Leningrad, granskat eller determinerat syrphidmaterial utav D., B. och S. Gaunitz' samling meddelar jag en del fynduppgifter. Några exemplar ur en annan samling har jag även anfört i förteckningen. Dateringen, fallande inom 1919—31, har i allm. ej utsatts. Ryssby = Ryssby i Kronob. län.

Chilosia vicina Zett. Sm. Lemnhult: »Högatorps ängar»; Ryssby; Staffansbodasjön; Sorsele by: Pansborg.

Ch. pubera Zett. Fiskebäckskil: Klubban; Sm. Myresjö: Eka; Ultuna.

Ch. scutellata Fall. Bl. Brömsebro; Gotl. Etelhem; Gotl. Kneippbyn; Sm. Korsberga; Ryssby: Persatorp, Ugglagsryd.

Ch. longula Zett. Ryssby: Ässjön; Sorsele by: Pansborg, Prästjärn och Näckrostjärn; Sorsele: Vännäs; Stockholm: Skrubba.

Ch. pagana Meig. Ög. Borensberg: »Jägmästarängen»; Sm. Hultsjö: Prästgården; Sm. Korsberga; Sm. Lemnhult: »Högatorps ängar»; Ryssby by; Sorsele by: Pansborg; Ultuna.

Ch. variabilis Fall. Ög. Borensberg; Sm. Korsberga: »Kaplansbacken»; Sm. Målaskog: Holborna berg.

Ch. intonsa Loew. Ög. Borensberg; Eksjö; Sorsele by: Pansborg, »Långavamyren».

Ch. grossa Fall. (det. av förf.). Sm. Korsberga: Byestad, på Salix.

Ch. chrysocoma Meig. Lpl. Ammarnäs: Kvarnbäcken (det. av förf.); Sm. Korsberga; Ryssby.

Ch. albipila Fall. Ryssby: byn, Selleberg, Ässjön.

Ch. flavipes Panz. Ög. Borensberg: »Jägmästarängen», Ryssby: vid Ryssbybäcken, Ässjön; Ultuna.

Ch. gigantea Zett. Ög. Borensberg: Salsjön; Sorsele by: Pansborg; Stockholm: Skrubba.

Ch. impressa Loew. Sö. Dunker: Dunkershall.

Ch. albitarsis Meig. Ög. Borensberg: »Jägmästarängen»; Båstad: på Hallandsåsen; Eksjö; Fiskebäckskil: Klubban; Sm. Hultsjö: Prästgården; Sm. Lemnhult: »Högatorps ängar»; Sm. Målaskog: Holborna berg: Ryssby: byn, Selleberg; Sorsele by: Pansborg, »Nyodlingen», »Långavamyren»; Ultuna.

Ch. semifasciata Beck. Lpl. Saltoluokta; Tjäpores 14. 7. 28.
År 1914 uppgiven som ny för Finland. — Ny för Sverige.

Ch. morio Zett. Ög. Borensberg 9. 6. 29. Allm. på blommande Salix i Borensbergstrakten vårvarna 1929—32; Ryssby by 18. 5. och 23. 5. 24; Sorsele by: Pansborg 1. 6. 21.

Ch. vernalis Fall. Ög. Borensberg: »Jägmästarängen»; Fiskebäckskil: Klubban; Sm. Korsberga; Sm. Lemnhult: »Högatorps ängar»; Malmö; Ryssby: byn, Ässjön, Staffansbodasjön; Sorsele by.

Ch. velutina Loew. Sö. Dunker: Dunkershall 29. 7. 22.; Malmö 16. 7. 25.; Sk. Sibbhult 7. 8. 27.

Ch. mutabilis Fall. Gränna; Ryssby by.

Ch. ruralis Meig. Sm. Myresjö: Eka; Sm. Målaskog; Ryssby: Ässjön.

Myiolepta ruficornis Zett. Sorsele by: Pansborg 1. 7. 21. (D. Gaunitz). Ehuru denna art av Zetterstedt uppgivits såsom funnen i Sverige, torde något säkert synd av densamma ej ansetts föreliggan hitintills, ty den är ej upptagen i Svensk Insektfauna. Enligt benäget meddelande av Wolter Hellén, Helsingfors, är arten flera gånger anträffad i Finland.

Sven Gaunitz.

Meddelande från bibliotekarien.

Av tidskriftens redaktör, prof. Ivar Trägårdh har föreningens bibliotek i dagarna erhållit såsom gäva omkring 800 entomologiska separat, vilka utgöra ett synnerligen välkommet och värdefullt tillskott till dess separatsamling, i all synnerhet som de flesta av separaten äro utkomna under senare tid och omfatta avhandlingar inom de flesta insektgrupper. — Exemplet manar till efterföljd! Särskilt är bibliotekarien angelägen att få en möjligast fullständig samling separat av entomologernas egna avhandlingar.