

Scotosia transversata finnes i V. Mark.

Cidaria nigrofasciaria: V. Mark. — *C. quadrofasciaria*: V. Mark.
Sune Wendel.

Fyndorter för sydsvenska Diptera.

Hermione pygmaea Fall. Skåne: Råå kärr aug., Gotland: Visby juli.

Beris chalybeata Forst. Sk: Hälsingborg maj, Tollarp juni.

Chrysozona crassicornis Wahlb. Sk: Fagerhult, juli, Ringsjön juni, Sm: Timsfors.

Chrysops rufipes Meig. Sk: Söderåsen augusti. — *Ch. lapponicus* Loew. Sk: Söderåsen aug. Ett rätt märkligt fynd, då denna art förut endast varit känd från Lappland.

Atherix marginata Fabr. Sk: Åsljunga juli vid en bäck på sterna av ett brovalv. Förekom på denna begränsade lokal i rätt stor mängd.

Rhagio annulata Deg. Sm: Sandreda juli.

Oncodes gibbosus L. Sk: Åsljunga juli.

Acrocera globulus Panz. Gotl: Klintehamn juli.

Dysmachus trigonus Meig. Gotl: Visby.

Thereva marginula Meig. Sk: Råå juni på örtbevuxna sandfält nära stranden söder om Råå. — *Th. circumscripta* Loew. Sk: Arkelstorp, juni, juli, Sm: Sandreda juli, Öl: Böda juli.

Rhamphomyia nigripennis Fall. Allm. i Skåne juni, juli. — *Rh. umbripennis* Meig. Sällsyntare än den föreg., sannolikt allmännare norrut. Sk: Hälsingborg, Arkelstorp juni, juli. — *Rh. flava* Fall. Sk: Hälsingborg på umbellater. — *Rh. maculipennis* Zett. (Syn. *dissimilis* Zett.). Sk: Hälsingborg, Mölle, Båstad, Hallands Väderö på strandäng, maj, juni. — *Rh. anomalipennis* Meig. Sk: Hälsingborg maj, på Salix. — *Rh. barbata* Macq. (Syn. *pennata* Macq. enl. Collin). Sk: Hälsingborg juni, sälls. — *Rh. platyptera* Panz. Sk: Hälsingborg, Ängelholm maj. — *Rh. albipennis* Fall. Sk: Hälsingborg, maj, på Salix. — *Rh. obscura* Zett. Allm. på mossmarker i norra Skåne. — *Rh. tarsata* Meig. Sk: Hälsingborg, Hallandsåsen, Åsljunga, Arkelstorp, juni, juli. — *Rh. gibba* Fall. Sk: Hälsingborg, Söderåsen, Hallandsåsen, augusti. — *Rh. vespertilio* Zett. Sk: Skärälid maj, sälls. — *Rh. nitidula* Zett. Sk: Skärälid, Munka Ljungby, maj.

Empis borealis L. Sk: Allm. på blommande Salix invid mossar nära Rösjöholm samt på Salix i Ängelholms kronoplantering, maj. — *E. lucida* Zett. Sk: 1 ♂ på Salixhängen invid mosse nära Rösjöholm. Den förekom tillsammans med den föreg. och *Rhamphomyia sulcata* och fyndet är av intresse, då denna art ej förut är funnen så långt söderut i vårt land. Arten är eljest en karakteristisk företeelse i våra fjälltrakter och dess förekomst på myrmarkerna i norra Skåne

torde vara av relikartad natur. Samma torde förhållandet vara med ett par muscider, *Limnophora uniseta* Stein och *trigonota* Zett., vilka anträffades på samma lokal. — **E. lutea** Meig. Sk: Tollarp juni. Ny för Sverige. — **E. serotina** Loew. Sk: Hallandsås aug. Ny för Sverige.

Drapetis nigrifella Zett. (Syn. *nervosa* Lw., *aterrima* Lundb. enl. Collin). Sk: Kullaberg april. — *D. exilis* Meig. (Syn. *pusilla* Loew enl. Collin). Sk: Hälsingborg i augusti.

Tachista annulimana Meig. Sk: Hälsingborg, Arkelstorp, Sm: Sandreda.

Chersodromia arenaria Hal. Sk: Hälsingborg maj—aug., allm.* — **Ch. hirta** Walk. Sk: Hälsingborg, Skälderviken, maj, juni, sälls. på havsstrand. Ny för Sverige. — **Ch. difficilis** Lundb. Sk: Bedinge på havsstranden juli. Ny för Sverige. — **Thrypticus smaragdinus** Gerst. Sm: vid sjön Solgen nära Eksjö juli. Ny för Sverige. Arten förekom lokalt ej sällsynt bland Phragmites. Där uppehöll den sig på stråna, helst där dessa stodo ett stycke ute i vattnet. Visserligen erinrade den i sitt sätt att röra sig på stråna något om en *Medetera*, men det första intrycket var ej, att man hade att göra med en dolichopodid utan snarare med en rhagionid, av släktet *Chrysophilus* eller liknande. Den är också avsevärt större än de båda i Sverige förut funna arterna av släktet *Thrypticus*: *bellus* Loew. och *nigricanda* Wood. Troligen finnes flera av dessa intressanta arter i vårt land.

Chilosia canicularis Panz. Sk: Benestad augusti. — *Ch. chryso coma* Meig. Sk: Hälsingborg maj. — *Ch. fraterna* Meig. Sk: Hälsingborg, Munka Ljungby; ej sälls. maj, juni.

Triglyphus primus Loew. Sk: Hälsingborg på Anthriscus juni. Ny för Sverige.

Platychirus tarsalis Schumm. Sk: Hälsingborg, Hallands Väderö, juni. Ny för Sverige. — *P. immarginatus* Zett. Sk: Råå, Mölle, Gotl: Visby, Klintehamn; på strandängar, juli, aug.

Eriozona syrphoides Fall. Sk: Hälsingborg, Sm: Markaryd; sälls.

Syrphus latifasciatus Macq. Sk: Råå kärr, Åsljunga maj—sept. — *S. ochrostoma* Zett. Gotl: Klintehamn juli. — *S. nitens* Zett. Sk: Åsljunga, augusti. — *S. barbifrons* Fall. Sk: Hälsingborg maj, sälls.

Brachyopa conica Panz. Sk: Hälsingborg, Ängelholm; i eller i närheten av granplanteringar.

Volucella inanis L. Sk: Båstad, Hallandsås, Hälsingborg, Gotl: Visby, Klintehamn; juli, aug.

Eristalis lucorum Meig. Sk: Råå, Landskrona; på strandängar, ej sälls., maj—aug. — *E. vitripennis* Strobl. Sk: Skärälid, maj. — *E. oestraceus* L. Sk: Åsljunga, 1 ex. på Peucedanum palustre aug., sälls.

Helophilus affinis Wahlb. Sk: Hälsingborg, Arild, Skärälid, Arkelstorp; juli—sept. — *H. hybridus* Loew. Sk: Hälsingborg, Arild; aug.

Lampetia equestris Fabr. Sk: Ganska allm. i trädgårdarna i Hälsingborg.

Zelima pigra Fabr. Sk: Åsljunga, Fagerhult; juli. — *Z. abiens* Wied. Sk: Hälsingborg, juni, juli; ej sälls.

Chrysotoxum cautum Harr. Sk: Hälsingborg, Höganäs, Hal-lands Väderö, Tollarp; maj, juni. Ny för Sverige. — *Ch. arcuatum* L. Sk: Ängelholm, Arild, Söderåsen; ej sälls. i norra Skåne, juni—aug. — *Ch. elegans* Loew. Gotl: Visby, juli.

Microdon eggeri Mik. Sk: Ängelholm maj, juni, Sm: Sandreda juli. Ny för Sverige.

Conops quadrifasciata Deg. Sk: Hälsingborg, Ängelholm, Kulla-berg; Fagerhult, juli, aug.

Physocephala nigra Deg. Sk: Ängelholm juni. — *Ph. rufipes* Fabr. Sk: Hälsingborg på umbellater, aug., Skärälid på Cirsium, juli.

Ocemyia pusilla Meig. Sk: Hälsingborg, Arkelstorp, Gotl: Klinte-hamn; juni, juli.

Dalmannia punctata Fabr. Sk: Viken, juni.

Cordylura rufimana Meig. Sk: Fagerhult, Arkelstorp; juni, juli; ej sälls. i norra Skåne. — *C. aberrans* Beck. — Sk: Skärälid, maj.

Gonatherus planiceps Fall. Sk: Hälsingborg, maj.

Leptopa filiformis Zett. Sk: Hälsingborg, Ängelholm, Benestad, maj—aug.

Megaphthalma pallida Fall. Sk: Hälsingborg, Söderåsen, Fager-hult; juni—sept., ej sälls.

Amaurosoma articulatum Beck. Sk: Ängelholm, juni. Ny för Sverige. — *A. tibiellum* Zett. Sk: Hälsingborg, maj.

Pogonota barbata Zett. (Syn. *hircus* Zett.). Sk: Hälsingborg, Fa-gerhult, Köphult, Gotl: Visby; juni, juli.

Suillia inornata Loew. Sk: Hälsingborg, Söderåsen, Fagerhult; juli—okt., ej sälls. — *S. vaginata* Loew. Sk: Hälsingborg, Fagerhult, juli, aug.

Spanoparaea ruficornis Meig. Sk: Hälsingborg, Fagerhult, juli—okt.

Heteromyza oculata Fall. Sk: Hälsingborg, Söderåsen, aug., nov,

Thelida rotundicornis Zett. Sk: Hälsingborg, oktober.

Neoleria ruficauda Zett. Sk: Hälsingborg, april, maj.

Amoebaleria caesia Meig. Sk: Hälsingborg, april, juni. — **A. am-
plicornis** Czerny. Sk: Hälsingborg, april. Ny för Sverige.

Helomyza modesta Meig. Sk: Hälsingborg, mars.

Tephrochlamys tarsalis Zett. Sk: Hälsingborg, aug.

Phaemyia fumipennis Zett. Sk: Hälsingborg, Ängelholm, Åsljunga, juli, aug.

Melina annulipes Zett. Sk: Hälsingborg, juni.

Renocera strobli Hend. Sk: Hälsingborg, juli. — *R. striata* Meig. Sk: Råå, Fagerhult, maj—aug., ej sälls.

Tetanocera unicolor Loew. Sk: Råå, Skärälid, Fagerhult, maj—aug.

Limnia fumigata Scop. Sk: Åhus, juli.

Homalocephala albitarsis Zett. Sk: Åsljunga, Arkelstorp, juni, juli.

Phorellia zoë Meig. Sk: Hälsingborg, maj, juni.

O. Ringdahl.