

6. Ringdahl, O.: Våra *Cinxia* (*Sericomyia*) arter. *Ibid.* 1912, H. 2—3.
7. Stackelberg, A.: Übersicht der paläarktischen Arten der Unterfamilie *Cinxiinæ* (*Diptera*, *Syrphidæ*). *Akad. des Sciences de l'URSS. Matériaux de la comm. pour l'étude de la republique ASS Iakoute. Livr. 20. Leningrad 1927.*
8. Tjeder, B.: Beiträge zur Kenntnis schwedischer *Diptera Nemotocera* 1. *Limnobiinæ* und *Rhamphidiinæ* aus Dalecarlien. *Entom. Tidskr.* 1932, H. 2—3.
9. Wahlgren, E.: *Svensk Insektfauna. Diptera Nemocera.* Stockholm & Uppsala 1905—22.
10. Verrall, G. H.: *British Flies Vol. VIII.* London 1901.

Sven Gaunitz.

***Coenonympha pamphilus winbladi* n. subsp.**

Oberseite sehr licht ockergelb, Vorder- und Aussenränder der Vorderflügel sowie Aussenrand der Hinterflügel schmal hellgrau, selten bräunlich, Apikalauge der Vorderflügel fehlt (bei einem Stück — von 15 untersuchten — findet sich doch ein kleiner Apikalpunkt); auf den Hinterflügeln scheinen die Zeichnungen der Unterseite nicht so viel durch wie bei der Nominatrasse; Fransen weisslich grau. Die Unterseite der Vorderflügel mit kleinem Apikalauge, Vorderflügelspitze und -Aussenrand sowie die ganze Hinterflügelfläche hellgrau, die gelbweisse Querbinde der letzteren am öftesten zu einem kleinen Fleck am Zellende reduziert. Spannweite 24—27 mm.

Haparanda und Kalix, Norrbotten, Schweden, 65° 50' n. Br., 24—25 Juni 1934, leg. G. Winblad.

Frithiof Nordström.