

Bidrag till kännedomen om de svenska tachinidernas utbredning.

Av

O. RINGDAHL.

Efterföljande anteckningar om svenska parasitflugor grunda sig dels på mina egna insamlingar dels på Riksmuseets samling, som jag för en del år sedan var i tillfälle revidera efter nyare systematiska synpunkter. Denna samling var förut uppordnad efter Zetterstedts klassiska verk *Diptera Scandinaviae*, där som bekant huvudparten av arterna äro uppförda inom det stora samlingssläktet *Tachina*. Numera är detta släkte splittrat i en mångfald genera. Den svenska samlingen på Riksmuseum är trots sin ålder mycket vacker och även rikhaltig, och arterna ha till största delen blivit insamlade av våra frejdade entomologer Boheman och Wahlberg. Givetvis finnas många sällsyntheter i samlingen, men om dessa och för övrigt alla andra får man av etiketteringen endast veta, i vilket landskap exemplaren äro tagna jämte samlarens namn.

För alla i det följande anförda fynd ur Riksmusei samling ha därför endast provinsernas namn kunnat utsättas, men för mina egna fynd har jag även angivit fyndorterna. För att vidga vår kännedom om arternas utbredning inom landet har jag i förteckningen upptagit alla fynd från andra landskap än dem som redan finnas hos Zetterstedt jämväl för faunan nya arter, som utgöra mer än ett 50-tal. Vad nomenklaturen beträffar har jag huvudsakligen följt Stein och Lundbeck.

Gastrophilus pecorum Fabr. Riksm: Dlr. — *G. equi* Clark Riksm: Dlr.

Oestrus ovis L. Riksm: Vg.

Allophora hemiptera Fabr. Riksm: Sk. — Ny för Sverige. *A. subcoleoptrata* L. Riksm: Dlr.

Clytiomyia rotundiventris Fall. Sk: Skäralid på Angelicabl, sälls., aug. — *C. continua* Panz. Riksm: Sm., Uppl.

Tamiclea celer Meig. Sk: Åsljunga på blad av rönn, 1 ex. %s 1931.

Gymnosoma rotundata L. Riksm: Öl., Gl.

Cystogaster globosa Fabr. Riksm: Sm., Öl., Sdml., Uppl.

Phania vittata Meig. Sk: Skäralid och Klövahallar på Söderåsen. Mycket sällsynt på Angelicabl, aug., sept. Ny för Sverige.

Weberia thoracica Meig. Riksm: Ög., — Jämtl: Gäddede juli 1915 (regio sylvatica).

- Syntomogaster exigua** Meig. Riksm: Ög. Ny för Sverige.
- Rondania dimidiata** Meig. Lappl: Gällivara juli 1917, Gl: Visby och Östergarn juli 1936. De gotländska ex. togos på furor på hållmark. Ny för Sverige.
- Graphogaster fasciata* Macq. Riksm: Gl., Dlr., Sk: Hallands Väderö på sandmark $\frac{6}{10}$ 1926.
- Acemyia acuticornis* Meig. Riksm: Gl.
- Medoria anthracina** Meig. Sk: Hallands Väderö på blad av asp $\frac{7}{10}$ 1934. Ny för Sverige.
- Dionaea forcipula** Meig. Gl: Visby $\frac{8}{10}$ 1920. Ny för Sverige. — **D. setifacies** Rond. Gl: Visby och Östergarn på hållmark på småfuror, juni, juli 1936. Ny för Sverige.
- Anurogyne* sp. Jämtl: Undersåker $\frac{18}{10}$ 1914 1 ♀ (det. Dr. J. Villeneuve.)
- Ocyptera brassicaria* Fabr. Riksm: Boh. — *O. auriceps* Meig. Riksm: Öl. — *O. interrupta* Meig. Sm: Solgen $\frac{6}{10}$ 1930, Dlr: Ludvika $\frac{28}{10}$ 1936. — *Ocyptera pusilla* Meig. Riksm: Vg., Uppl., Dlr. — Sm: Markaryd $\frac{6}{10}$ 1927.
- Lophosia fasciata** Meig. Sk: Lärkesholm, Skärälid på umbellater, sälls. $\frac{26}{10}$ 1931 och $\frac{29}{10}$ 1934. Ny för Sverige.
- Cephenomyia trompe* L. Riksm: Lappl.
- Pollenia vagabunda** Meig. Förekommer i Skåne rätt allmänt om ej i så stor mängd som *rudis* och *vespillo*. Arten är ej förut omnämnd från vårt land men torde säkert ha varit känd för Zetterstedt, som väl då fört den in under *rudis* eller *atramentaria*; mars—sept.
- Lucilia bufonivora** Mon. Sk: Hälsingborg, juni. Ny för Sverige. — **L. flavipennis** Kram. Sk: Hälsingborg, Arild, Hallands Väderö, juni—sept. Ny för Sverige.
- Calliphora uralensis* Villen. Lappl., Jämtl. Förekommer ganska allmänt i fjälltrakterna och är av förf. påträffad i alla regionerna. — *C. germanorum* Villen. Lappl., Jämtl. I likhet med föreg. ej sälls. och anträffad av förf. i regio sylvatica och subalpina.
- Onesia aculeata** Meig. (det. Villeneuve). Sk., Sm., Öl., Jämtl., allm. maj—aug. Ny för Sverige. — **O. agilis** Meig. (det. Villeneuve) Sk., Sm., Gl., Jämtl. Möjligen allmännare än den föreg. Påträffad även i regio alpina på de jämtländska fjällen. De ex. jag funnit överensstämma med *O. biseta* Villen. i Diptera Danica. Ny för Sverige. Både denna och föreg. art voro på grund av sin allmänna förekomst självklart kända för Zetterstedt och ha av honom blivit kallade för *Sarcophaga Vespillo*, däri även *O. sepulchralis* Meig. ingår. Denna sistnämnda art är ej utbredd så långt mot norr som de bägge andra, och då Zetterstedt uppger *S. Vespillo* även för Lappland, torde detta gälla *O. aculeata* och *agilis*. — **O. stricta** Villen. (*floralis* Schin. det. Villeneuve) Sk: Hälsingborg, Ängelholm, maj—juli. Ny för Sverige. — **O. gentilis** Meig. Sk: Höganäs, aug. på blr av *Matricaria inodora*. Ny för Sverige.
- Steringomyia fuscipalpis* Zett. Lappl: Abisko i regio subalpina.
- Pseudomesia pubicornis* Zett. Arten är allmän i fjälltrakterna, företrädesvis i regio alpina och ses där oftast på marken. Den går även ner i barrskogsregionen, där jag t. ex. fångat den på stockar och vedstaplar, Jämt., Lappl.
- Sarcophaga sinuata* Meig. Dlr: Krylbo $\frac{16}{10}$ 1917, Lappl: Gällivara $\frac{29}{10}$ 1926. — *S. melanura* Meig. Gl: Klintehamn $\frac{20}{10}$ 1920. — *S. agnata* Rond. Sm: Markaryd $\frac{6}{10}$ 1927. — *S. crassimargo* Pand. Gl: Klintehamn $\frac{16}{10}$ 1920. — *S. clathrata* Meig. Sm: Sandreda $\frac{4}{10}$ 1927, Jämtl: Undersåker och Åre i regio sylvatica, juli. — **S. soror** Rond. Sk: Hälsingborg $\frac{24}{10}$ 1921, Gl: Visby, Fårön, Öja, juli. Ny för Sverige. — *S. incisilobata* Pand. Sk: Öl., Gl., Jämtl., allm., maj—aug. — *S. aratrix* Pand. Sm: Markaryd $\frac{6}{10}$ 1927. — *S. teretirostris* Pand. Sk: Skärälid $\frac{23}{10}$ 1921. — *S. tuberosa* Pand. Sk: Hälsingborg, maj—aug., Lappl: Abisko (regia subalp.). — *S. scoparia* Pand. Sm: Sandreda, Gl: Visby, Jämtl: Undersåker, Åre, juli, ej sälls. — **S. vicina** Villen. Sk:

Hälsingborg, Åsljunga, Arkelstorp, maj—aug. Ny för Sverige. — *S. frenata* Pand. Sk: Åsljunga ²⁷/₇ 1924, Jämtl: en av de allmännaste arterna i fjälltrakterna, där den även går upp i regio alp. Ny för Sverige. — *S. frenata* var. *cruentata* Pand. Sk: Hälsingborg, Väderön, Sm: Sandreda, Gl: Sundre, på alvarmark; maj—juli. Ny för Sverige. — *S. rosellei* Böttch. Jämtl: Undersåker, Åre (regio sylvatica) juni, juli. — *S. hirticrus* Pand. Gl: Sundre på alvarmark ³¹/₇ 1920. Ny för Sverige.

Blaesoxypa grylloctona Loew. Sk: Hälsingborg, aug., sept., sälls. Ny för Sverige. — *B. gladiatrix* Pand. Gl: Visby, Klintehamn, Östergarn, Öja, juni, juli, ej sälls., ofta på umbellater, Sk: Ängelholm, Arkelstorp. Ny för Sverige.

Agria affinis Fall. Öl: Borgholm, juli.

Angiometopa ruralis Fall. Gl: Visby på Daucusbl, juli 1936.

Brachycoma devia Fall. Riksm: Sm., Boh. — Jämtl: Undersåker (regio sylvatica), juni, juli. — *B. borealis* Ringd. Lappl: Abisko (regio subalp.), Vassijaure (regio alp.), Jämtl: Åre (regio sylv.), Snasen, Vällista och Storlien (regio alp.).

Miltogramma oestraceum Fall. Riksm: Boh., Sdml. — *M. punctatum* Meig. Riksm: Ög. — *M. germari* Meig. Riksm: Ög., Gl. — Hall: Laholm, Öl: Vickelby. — *M. brevopilum* Villen. Gl: Visby, Östergarn på hållmark, juni, juli. Ny för Sverige.

Hilarella stricta Meig. Riksm: Sm., Gl. — *H. hilarella* Zett. Gl: Visby, Klintehamn, Nb: Luleå, juli.

Paragusia elegantula Zett. Riksm: Sk., Öl. — Gl: Fårön, Uppl: Sandhamn, Nb: Luleå, juli, aug. Ny för Sverige.

Phrosinella nasuta Meig. (Syn. *Tachina pilularis* Zett.). Riksm: Sk. — Nb: Luleå ¹⁴/₇ 1917, Sm: Slättö sand norr om Bolmen ³⁰/₆ 1933. Vid granskning av typen till ovannämnda *Tachina*-art i Zetterstedts samling befanns denna, som beskrivs efter 1 ♂ ex. från Norge, vara identisk med ifrågavarande art.

Sphacapatia conica Fall. Riksm: Vg. — Nb: Luleå. — *S. imberbis* Zett. Riksm: Uppl. — Jämtl: Undersåker (regio sylv.) ej sälls., juni, juli.

Heteropterina multipunctata Rond. Öl: Hornsjön (leg. Anton Jansson). Ny för Sverige.

Ptychoneura rufitarsis Meig. Riksm: Sm., Ög., Uppl. — Gl: Fårön, Öja, juni, juli. — *P. cylindrica* Fall. Riksm: Ög., Jämtl. — Sm. vid sjön Solgen, Öl: Böda, Vickelby, juli.

Pachyophthalmus signatus Meig. Riksm: Ög., Uppl., Vrml.

Macronychia griseola Fall. Riksm: Sk. — Sm: Sandreda, juli. — *M. agrestis* Fall. Riksm: Bl. — *M. striginervis* Zett. Riksm: Ög. — Gl: Fårön, Tingstade, Visby, Öja. Sparsam på umbellater, juni, juli. — *M. polyodon* Meig. Riksm: Ög. Ny för Sverige.

Macquartia dispar Fall. Riksm: Sm., Ög., Vg., Gl., Boh., Uppl. — *M. tenebricosa* Meig. Riksm: Boh., Uppl., Dlr. — *M. buccalis* R. D. Riksm: Uppl. — Sk: Skärälid, Jämtl: Undersåker och Åre (regio sylv.). Ny för Sverige. — *M. chalconota* Meig. Sm: Solgen ⁶/₇ 1933. Ny för Sverige. — *M. pubiceps* Zett. Sk: Åsljunga, juli, aug.

Macroprosopa atrata Fall. Riksm: Vg. — Öl: Vickelby ¹⁴/₇ 1931.

Minella chalybeata Meig. Riksm: Sm., Vg., Boh. — *M. nigrita* Fall. Riksm: Ög., Boh., Uppl.

Ptilopsina nigrisquama Zett. Jämtl: Undersåker (regio sylv.).

Stevenia umbratica Fall. Riksm: Boh. — *S. atramentaria* Meig. Riksm: Ög.

Styloneuria cingulata Zett. Riksm: Ög., Boh. — Sk: Arkelstorp, Sm: Västervik, Öl: Borgholm, juni, juli.

Melanophora roralis L. Riksm: Bl.

Morinia nana Meig. Dlr: Krylbo, Jämtl: Undersåker i regio sylv. ej sälls.

Anthracomyia melanoptera Fall. Jämtl., Gäddede (regio sylv.).

- Plesina maculata* Fall. Riksm: Boh.
Angioneura acerba Meig. Riksm: Ög. — Sk: Skälderviken på fuktig äng nära Rönneåns utlopp ²⁹/₆ 1923.
Frauenfeldia rubricosa Meig. Riksm: Sdml. — Sm: Västervik.
Catharosia pygmaea Fall. Riksm: Sm., Gl.
Cinochira atra Zett. Riksm: Sm., Boh., Bl., Uppl. — Sk: Hälsingborg på Angelicabl, juli—sept.
Dexia rustica Fabr. Riksm: Boh. — *D. vacua* Fall. Riksm: Vg., Sdml.
Dexiosoma caninum F. Riksm: Uppl.
Billaea triangulifera Zett. Riksm: Uppl., Lappl. — Jämtl: Undersåker (regio sylv.) ej sälls. — **B. subrotundata** Rond. Riksm: Uppl. Ny för Sverige.
Homalostoma forte Rond. Riksm: Vrml. Ny för Sverige.
Morphomyia tachinoides Fall. Riksm: Sk., Sm., Uppl.
Meigenia mutabilis Fall. Riksm: Boh. — *M. incana* Fall. Riksm: Sm., Dlr.
Viviania cinerea Fall. Riksm: Sm., Boh.
Monochaeta albicans Fall. Riksm: Sm., Ög., Boh.
Masicera silvatica Fall. Gl: Visby ej sälls. på umbellater såsom Angelica och Daucus.
Ceromasia ferruginea Meig. Riksm: Ög. — Sk: ej sälls. Åsljunga, Hallandsås, Hälsingborg, juli—sept.
Lydella angelicae Meig. Riksm: Dlr. — Sk: Åsljunga. — *L. albisquama* Zett. Riksm: Gl. — *L. nigripes* Fall. Riksm: Ög.
Erycia vicina Zett. Sm: Ålem, Gl: Visby, Klintehamn, juli. Ny för Sverige.
Exorista confinis Fall. Dlr: Vansbro, Jämtl: Vallbo (regio subalp.), juli. — **E. tritaeniata** Rond. Sm: Unnaryd ²⁷/₆ 1933. Ny för Sverige. — *E. affinis* Fall. Riksm: Ög., Vg. — Gl: Visby, ej sälls. på umbellater. — *E. diligens* Zett. Riksm: Ög. — Sk: Arkelstorp, Skärälid, Öl: Böda, Gl: Visby, juni, juli. — **E. hortulana** Meig. Riksm: Boh. — Sk: Hälsingborg, Åsljunga, juli, aug. Ny för Sverige. — *E. glauca* Meig. Riksm: Sk. Sm. Ög. — Dlr: Vansbro.
Exorista agnata Rond. Gl: Visby ²⁷/₇ 1936. Ny för Sverige. Arten bestämd av Dr. Villeneuve. — *E. stolidia* Stein. Gl: Visby, juni, juli. — *E. westermanni* Zett. Riksm: Ög. Uppl. — *E. mitis* Meig. Riksm: Lappl., — Sk: Hälsingborg, Sm: Solgen, Gl: Visby, Öja, maj—aug.
Hemimacquartia paradoxa B. B. Sk: Höganäs, Hälsingborg, juni, sälls. Ny för Sverige.
Phryxe vulgaris Fall. Jämtl: Undersåker (regio sylv.). — *P. nemea* Meig. Riksm: Uppl.
Sturmia inconspicua Meig. Riksm: Sk., Ög. Uppl. — Gl: Visby, Östergarn, juli 1936.
Zenillia libatrix Panz. Sk: Åsljunga ²⁴/₇ 1924. — *Z. bonsdorffi* Zett. Sk: Hälsingborg ⁶/₇ 1911. — **Z. roseanae** B. B. Sk: Hälsingborg, maj, juni, aug. Ny för Sverige.
Phorocera obscura Fall. (Syn. *caesifrons* Macq., *Tachina ludens* Bohem.) Riksm: Ög., Öl., Gl., Uppl.
Campylochaeta praecox Meig. Riksm: Uppl.
Bothria subalpina Villen. Sk: Kullaberg på trädstammar och vissnade löv på marken, april 1926. Ny för Sverige.
Latigena longicornis Fall. Gl: Visby, Östergarn juli 1936. Förekom ej sälls. på barr av furor, växande på hällmark. Säkerligen voro de intresserade för där levande larver, möjligen växtstekellarver.
Staurochaeta albocingulata Fall. Riksm: Bl., Uppl., Dlr. — Gl: Visby, Östergarn, juli 1936. Var den på hällmarksfurorna vanligaste parasitflugan.

Diplostichus janithrix Hart. Gl: Visby, Östergarn, juli. Förekom på samma lokaler som de båda föreg. Vid flera tillfällen observerade jag ♀♀ omkring larvkolonier av *Lophyrus*.

Protopaea scutellaris Fall. Riksm: Sm., Gl.

Erynnia ocypterata Fall. (Syn. *nitida* R. D., *Tachina ocypterina* Zett. p. p.). Riksm: Vg.

Arrhinomyia morio Fall. (Syn. *tragica* Meig.). Riksm: Öl., Lappl. — *A. convexifrons* Zett. Öl: Vickleby ¹⁴/₇ 1931.

Apatelia innoxia Meig. Sk: Åsljunga ²⁷/₇ 1932, Sm: Unnaryd ²⁷/₆ 1933.

Winthemia speciosa Egg. Sk: Åsljunga på solbelysta ekblad, ♂♂, ♀♀ på blad av buskar, slutet av juli och början av aug., Skärälid ²⁷/₈. Ny för Sverige. Det kan måhända anses onödigt att belasta en fluga med några skönhetsattribut, men jag må säga, att mitt entomologiska jag sällan blivit mera hänryckt, än då jag första gången fick se hannarna till denna fascinerande, sällsynta art i naturen. Med sin svartglänsande thorax, kontrasterande mot den sidenskimrande gula abdomen torde den få räknas som en av våra vackraste tachinider. — *W. xanthogastra* Rond. Denna art har jag redan omnämnt som funnen i Sverige (Ent. Tidskr. 1917: Fyndorter för Diptera). Emellertid är detta ej samma art, som i Lundbecks Diptera Danica går under samma namn. Den sistnämnda är en mindre art, som mera erinrar om *quadripustulata*. De ex. jag fångat i Skåne äro större och påminna i hög grad om *Nemoraea pellucida* och tillhöra utan tvivel samma art, som Stein uppställt som *xanthogastra*. Vilken av de båda, som är den verkliga *xanthogastra* Rond., kan väl, som Villeneuve framhåller, endast genom typgranskning avgöras. — *W. quadripustulata* Fabr. Riksm: Boh., Jämtl. — *W. amoena* Meig. Sk: Ängelholm, maj, juni, Skärälid, Sm: Sandreda, juli. Ny för Sverige.

Carcelia gnava Meig. Riksm: Ög., Lappl. — *C. laxifrons* Villen. Riksm: Sk., Ög., Öl. — *C. separata* Rond. Sk: Åsljunga ¹/₈ 1931. Ny för Sverige.

Tachina larvarum L. Riksm: Öl. — Gl: Visby och Östergarn på hållmark, juni, juli. — *T. rustica* Fall. Riksm: Boh., Uppl., Vrml., Jämtl.

Tricholyga sorbillans Wied. Sm: Slättö sand ²⁹/₆ 1933.

Gonia ornata Meig. Riksm: Ög., Gl., Boh., Dlr. — *G. divisa* Meig. Sk: Rössjöholm på Salixhängen invid mosse, maj 1930. Ny för Sverige. — *G. fasciata* Meig. Riksm: Vg. — *G. flaviceps* Zett. Jämtl: Undersåker, Vallbo och Enafors i regio sylv., Snasen och Storlien (reg. alp.).

Histochoeta marmorata Fall. Riksm: Ög.

Rhacodineura pallipes Fall. (*antiqua* Meig.). Riksm: Uppl.

Hebia flavipes R. D. Sk: Hälsingborg maj, Skärälid ³/₆ 1934. Ny för Sverige.

Lydina aenea Meig. Riksm: Bl., Sm., Dlr., Jämtl.

Lypha dubia Fall. Riksm: Nb.

Eversmannia ruficauda Zett. Riksm: Sm., Dlr.

Gymnochoeta viridis Fall. Riksm: Vg.

Linnaemyia comta Fall. Riksm: Sm. — *L. haemorrhoidalis* Fall. Riksm: Boh., Vrml.

Micropalpus vulpinus Fall. Sdml: Sandhamn.

Chrysosoma auratum Fall. Gl: Visby omgivningar flerstädes på blr av *Daucus carota*, juli.

Trixa oestroidea R. D. Sm: Unnaryd på blad av *Pteris aquilina* på ett skogshygge med uppväxande smågranar, Sk: Åsljunga på blad av unga ekar, Fagerhult 1 ♀ på telefonstolpe, juni, juli.

Loewia foeda Meig. Sk: Hälsingborg i Pålssjö skog 1 ♀ på trädstam, där lockbete för fjärilfångst påstrukits ²⁷/₈ 1936. Riksm: Boh. Ny för Sverige.

Echinomyia grossa L. Riksm: Boh. — *E. magnicornis* Zett. Riksm: Boh., Uppl. — Öl: Borgholm, juli. — *E. marklini* Zett. Riksm: Jämtl., Vrml. — Dlr: Vansbro ²⁹/₇ 1936 1 ♀ på Angelicabl. — *E. alpina* Zett. Jämtl: Storlien, Otffället, Anarisfjällen, alla i regio alpina.

- Fabriciella ferox* Panz. Gl: Visby, Klintehamn, juli, ej sälls.
- Peleteria ferina* Zett. Riksm: Bl. — *P. popelii* Ports. Gl: Fårön (Ulla Hau), Östergarn på hällmark, juni, juli 1936. Ny för Sverige.
- Perichaeta unicolor* Fall. Riksm: Jämtl.
- Neaeropsis incurva* Zett. Riksm: Boh., Uppl.
- Admontia grandicornis* Zett. Riksm: Lappl., Jämtl., Dlr., — Sk: Hälsingborg i Pålssjö skog på granstam, $\frac{30}{6}$ 1931.
- Trichoparia blanda* Fall. Riksm: Nb., Lappl. — *T. seria* Meig. Riksm: Gl. — *T. decorata* Zett. Riksm: Gl., Uppl.
- Digonochaeta setipennis* Fall. Riksm: Vg., Uppl.
- Phytomyptera nitidiventris* Rond. (Syn. *Tachina nigrina* Zett. p. p.) Sk: Löderup $\frac{11}{8}$ 1923.
- Craspedothrix zonella* Zett. Sk: Hälsingborg i Pålssjö skog $\frac{26}{5}$ 1934. — **C. bohemia** Kram. Sk: Söderåsen $\frac{24}{8}$ 1923. Ny för Sverige.
- Actia nudibasis** Stein. Sk: Skärälid $\frac{27}{8}$ 1928. Ny för Sverige. — *A. pilipennis* Fall. Riksm: Gl., Boh., Uppl. — Sm: Sandreda $\frac{4}{7}$ 1927. — *A. crassicornis* Meig. Riksm: Sm., Ög., Uppl., Jämtl. — **A. nigroscutellata** Villen. Riksm: Ög., Dlr. — Sk: Vejbyslätt, Fagerhult, Gl: Visby, juli. Ny för Sverige. — **A. fissicornis** Strobl. Sk: Ängelholm, Skärälid, juni. Ny för Sverige. — *A. bicolor* Meig. Sk: Skärälid $\frac{29}{5}$ 1930. — **A. nigrohalterata** Villen. Sk: Hälsingborg i Pålssjö skog, Skärälid, maj, juni. Ny för Sverige. — **A. anomala** Zett. Sk: Skärälid $\frac{27}{8}$ 1928. Ny för Sverige. — *A. infantula* Zett. Riksm: Ög. — **A. verralli** Wainwr. Sk: Skärälid $\frac{28}{8}$ 1934. Ny för Sverige.
- Bucentes flavifrons* Staeg. Sk: Hälsingborg, Skärälid, Åsljunga, Bedinge, Jämtl: Åre (regio sylvatica) juli, aug. — **B. maculata** Staeg. Sk: Hälsingborg, april—juni. Ny för Sverige.
- Helocera delecta* Meig. Sk: Klövahallar, där arten ej var sälls. på Angelicabl., aug. 1933.
- Plagia vernalis** Kram. Ängelholms kronoplantering på furustam $\frac{26}{5}$ 1916. Ny för Sverige. Arten beskriven av Kramer efter ♂-ex., som han fångade tidigt på våren i Oberlausitz. Mitt ex., som är en ♀, stämmer fullständigt in på alla de kännetecken, som äro tillämpliga för arten ifråga. Ex är visserligen något mindre, 7 mm., än orginalex., som uppgivas vara 8—9 mm., men denna olikhet är sannolikt ej av någon betydelse, enär individernas storlek hos många tachinider är mycket växlande. Att arten hos oss även flyger tidigt på våren, kan man sluta sig till därav att ex. har mycket slitna vingar. Av könen har ju också honan den längsta flygtiden.
- Voria ruralis* Fall. Dlr: Ludvika, aug. 1936. — *V. trepida* Meig. Riksm: Lappl. — *V. antennata* Villen. Jämtl: Undersåker (regio sylv.). Storlien (regio alp.), juli 1914.
- Klugia marginata* Meig. Riksm: Boh. — Uppl: Stockholmstrakten $\frac{27}{6}$ 1922.
- Ernestia truncata* Zett. Sk: Hälsingborg, Ängelholm, maj, ej sälls. Vissa år ses arten talrikt, ofta snokande kring bland grästuvor. — *E. vivida* Zett. Riksm: Dlr. — *E. consobrina* Meig. Gl: Visby, Klintehamn, Tingstäde på blr av Angelica, juli. — *E. connivens* Zett. Riksm: Boh. Gl: som den föreg. — *E. conjugata* Zett. Riksm: Ög., Uppl. — *E. radicum* Fabr. Riksm: Sm. — Dlr: Ludvika, aug. — *E. caesia* Fall. Riksm: Ög., Sdml., Dlr. — Gl: Visby, juni, juli, på umbellater. — *E. rudis* Fall. Riksm: Gl., Uppl. — *E. nielseni* Villen. Sk: Hälsingborg, maj, juni. Vissa år allm. i lövskogarna på blad och trädstammar. — **E. vagans** Meig. Sk: Hälsingborg $\frac{18}{6}$ 1923, 1 ♂, Ny för Sverige.
- Helicobosca distinguenda* Villen. Öl: Vickleby, Gl: Visby, Öja, juni, juli, ej sälls. på umbellater. Jämtl: Undersåker, Åre (regio sylv.). Arten är förut känd fr. vårt land under namnet *muscaria* Meig.
- Steiniella callida* Meig. Riksm: Gl., Boh.

- Pelatachina tibialis* Fall. Riksm: Uppl. — Jämtl: Undersåker, Åre (regio sylv.) juni, juli.
- Rhaphiochaeta breviseta* Zett. Riksm: Gl., Sm., Boh., Dlr.
- 1927 *Pseudopachystylum goniaeoides* Zett. Riksm: Gl. — Sm: Sandreda ^{4/7} i granskog.
- Eriothrix rufomaculatus* De G. Riksm: Sm. — Jämtland: Undersåker (regio sylv.), juli. — E. *appeninus* Rond. Sk: Falsterbo ¹³ 1915 på sandfält. Ny för Sverige.
- Trafoia monticola* B. B. Sk: Vejbyslätt, Båstad på flygsandsfält, Åsljunga, juli, aug. Ny för Sverige.
- Myiobia inanis* Fall. Riksm: Vg.
- Solieria tibialis* v. Ros. Jämtl: Undersåker (regio sylv.) juli 1932, 1 ♂ 1 ♀ på Salixhängen. Ny för Sverige.
- Leskia aurea* Fall. Riksm: Vstml. — Sk: Ängelholm, Skäralid, Åsljunga, på umbellater, juli—sept.
- Zophomyia temula* Scop. Riksm: Boh.
- Phyllomyia volvulus* Fabr. Riksm: Bl., Vg., Jämtl., Vb.
- Petina erinaceus* Fabr. Riksm: Vg. Uppl.
- Pseudopetina stylata* B. B. Jämtland: Storlien ^{25/6} 1934, 1 ♀ i regio alpina på kalberget. Ett mycket intressant fynd, då denna art, efter vad jag kunnat finna, förut varit känd endast från Grönland. Bestämningens riktighet har jag kunnat övertyga mig om genom jämförelse med grönländska ex. på Köpenhamns Zool. Museum.
- Blepharomyia collini* Wainwr. Jämtl: Vallbo (regio sylv.) 1 ♂ på brädstapel ^{27/6} 1935. Ny för Sverige.
- Parastauferia crucigera* Zett. Jämtl: Undersåker och Åre (regio sylv.), Middagsvalen (regio subalp.) juli. Ex. insamlade på blr av Anthriscus.
- Wagneria nigrans* Meig. Riksm: Nb. — *W. costata* Fall. Riksm: Sm., Boh. — Jämtl: Åre (regio sylv.) på Anthriscus. — *W. carbonaria* Panz. Riksm: Ög., Sm., Boh., Uppl., Dlr. — *W. ringdahli* Villen. Jämtl: Undersåker (regio sylv.), Vällistafj. (regio subalp.) juli. — *W. lentis* Meig. Gl: Visby, juli, på furugrenar.
- Thelaira nigripes* Fabr. Gl: Öja, juli.
- Degeeria collaris* Fall. Riksm: Uppl., Dlr., Lappl. — Jämtl: Undersåker, Åre (regio sylv.), juli. — *D. luctuosa* Meig. Riksm: Gl. — Sk: Klövahallar 1 ♂ på Angelicabl, juli 1933.

Mitteilung über einige von Fallén beschriebenen *Tachiniden*.

Vor einigen Jahren hatte ich bei einem Besuch im Reichsmuseum zu Stockholm, Gelegenheit einige Fallénsche *Tachiniden*-typen zu untersuchen und teile ich hier unten meine Deutung einiger Arten mit, was vielleicht von einigem Interesse sein dürfte.

Tachina pallipes Fall. 1 ♂ 2 ♀. Das ♂ hat die 4. Längsader entwickelt, was zuweilen bei der Art vorkommt. Die ♀♀, die als Var. *monstrosa* bezeichnet sind, gehören zur Normaltypus mit unvollständiger Ader. Sämtliche Stücke sind mit *Rhacodineura antiqua* Meig. synonym.

Tachina scutellaris Fall. Stein hat in seinem Tachinidenwerk als Auctor für diese Art Zetterstedt bezeichnet, aber im Katalog der palaarktischen Dipteren ist Falléns Name gebraucht, was richtig ist.

Tachina ocypterata Fall. ist mit *Erynnia nitida* R. D. identisch. In Zetterstedts Sammlung ist dies auch der Fall.

Tachina obscura Fall. In Falléns Sammlung ist diese Art nicht vorhanden, aber in der allgemeinen Sammlung gab es ein Ex., das gewiss von Fallén herkommt. Das Stück ist identisch mit *Phorocera caesifrons* Macq.

Tachina morio Fall. Die Art ist mit *Arrhinomyia tragica* Meig. identisch. Ebenso in Zetterstedts Sammlung.

Tachina minuta Fall. 1 ♂ 1 ♀. Beide Stücke sind mit *Ptychoneura rufitarsis* Meig. identisch.

Musca azurea Fall. 2 ♂ 1 ♀. Sämtliche sind mit *Phormia terrae-novae* R. D. und *groenlandica* Zett. identisch.

Berichtigung.

Tachina obesa Zett. Über diese Art habe ich vorher mitgeteilt, dass sie mit *Carcelia rutilla* B. B. identisch sei. Dies ist aber nicht richtig. *T. obesa* Zett. wurde im Jahre 1859 beschrieben (Diptera Scandinaviae S. 6101) und schon vier Jahre später beschrieb Boheman eine andere Art mit demselben Namen (Vet. Akad. Öfvers. 1863) *T. obesa* Bohem also = *Carcelia rutilla* B. B. Die Zetterstedtsche Art ist dagegen nicht dieselbe sondern wahrscheinlich mit *Exorista lota* Meig. synonym.

Eine Namensänderung.

In meiner Übersicht schwedischer *Scopeumatiden* (Ent. Tidskr. 1936) habe ich eine lappländische *Scopeuma* Art den Namen *vulpina* gegeben. Da aber dieser Name bereits von Coquillett für eine amerikanische Art dieser Gattung verwendet ist, was ich nach einer brieflichen Mitteilung von Dr. J. R. Malloch erfahren habe, muss die schwedische Art einen anderen Namen haben, und schlage ich für sie den Namen *villosiventre* n. nom. vor.
