

Resultatet av en studieresa i Härjedalen.

Av

P. BRINCK och A. RINGDAHL.

Våren 1936 erhöll vi Grills stipendium, som gav oss ett länge efterlängtat tillfälle att stifta bekantskap med fjällens insektsfauna. Den ene av oss, Brinck, studerade härunder skalbaggar och den andre, Ringdahl, fjärilar. Våra viktigaste uppehållsorter blev Tännäs $\frac{29}{6}-\frac{2}{7}$, Tänndalen $\frac{3}{7}-\frac{20}{7}$, Gröndalen $\frac{8}{7}-\frac{11}{7}$, Ljungdalens och Helags $\frac{21}{7}-\frac{3}{8}$. Trakten kring Hede domineras av barrskog, och insektsfaunan var tämligen fattig. Vid en å med angränsande ängar gjordes de bästa fångsterna. I och med Tännäs kommo vi närmare fjällkedjan. Här voro rika blomsterängar beväxta med *Anthriscus silvestris*, *Lychnis rubra*, *Rinanthes major* m. fl. för de norrländska slätterängarna karakteristiska växter. Bland infångade skalbaggar böra nämnas *Amara similata* Gyll. och *Barypithes pellucidus* Boh., förut inte kända från fjälltrakterna. Ängarna besöktes huvudsakligen av vanligare dagfjärilar, såsom *Argynnis*- och *Lycæna*-arter, och mätare, men nattfjärilarna voro endast fataligt representerade. Tänndalen, som helt ligger inom regio subalpina, var den mest givande fångstplatsen. Intill ligger det något över 1000 m. höga Hamrafjället, ett typiskt sydberg, vars kalkrika mark givit upphov till en vegetation, som är känd för sin frodighet och artrikedom. Många fjärilarter utmärktes av en enastående individrikedom, och artrikedomen var också jämförelsevis stor. Lockbete-fångsten var mycket givande trots de svala och ljusa nättarna. Temperaturen var vid nattfly-fångsterna aldrig över + 10° C. Å andra sidan var det endast få skalbaggar, som uppträddde i något större antal som t. ex. *Potosia cuprea* L. I några små humusrika pölar mellan reg. subalp. och alp. infångades större delen av våra *Dytiscider*. På vägen till Gröndalen påträffades i en större vatten-samling i reg. alp. en mängd ex. av den lilla trevliga *Gyrinus minutus* F. tillsammans med *G. opacus* Sahlb. I närheten infångades ett ex. av *Anarta Staudingeri*, som flög i solskenet över en *Betula nana*-hed. Gröndalen ligger nära norska gränsen vid en av Ljungans källfloder och har samma rika subalpina växtlighet som Hamrafjället. I närheten ligga mäktiga norska fjällmassiv, och på

den svenska sidan reser sig det 1600 m. höga Skarsfjället, till största delen uppbyggt av kalkhaltiga bergarter. Under två nätter fångade vi på lockbete i björkskogen, varvid värdefulla fynd gjordes. *Hadena Maillardii* var inte ovanlig, och flera ex. av *Pachnobia konswoldensis* iakttogos. Anmärkningsvärt var den relativt rikliga förekomsten av jordlöpare och kortvingar på Skarsfjällets topp liksom på de andra fjälltopparna. Större delen av det boreala coleopterresultatet erhölls i Ljungdalens. Byn ligger i en moränfylld dalgång, varför växtligheten är tämligen torftig. Den rikligaste skalbaggsfångsten gjordes i några hölador på fuktiga och frodiga slätterängar. Liksom på övriga platser, där vi vistades en längre tid, utlade vi också här döda foreller såsom åtel på en kärräng. Det mest anmärkningsvärda fyndet var den för Sverige nya staphyliniden *Atheta spatula* Fauv. För övrigt lämnade sågverken talrika bidrag till samlingen, framför allt bockar och praktbaggar. I förhållande till de övriga platserna var Ljungdalen den mest artfattiga lokalen, vad fjärilarna beträffar. Visserligen togos några förut inte observerade arter, men dessa förekommo endast i enstaka exemplar. Lockbetesfångsten var här tämligen resultatslös, trots att vädret föreföll mycket lämpligare än förut. Från Ljungdalen gjorde vi en utflykt till Helagsfjället, vilken blev föga inbringande. Endast några kortvingar, bland dem den boreala *Acidota crenata* F., togos på och vid glaciären.

Försommaren i fjällen hade varit ovanligt varm och torr, vilket gjorde, att utvecklingen hade nått ganska långt. Strax efter vår ankomst började vädret att försämras, så att vi under större delen av juli knappast hade någon regnfri dag, och temperaturen nådde sällan upp till + 18° C. om dagen. Detta inverkade naturligtvis på resultatet, som torde blivit bättre under gynnsammare omständigheter. Sammanlagt togos 267 arter skalbaggar och 103 arter fjärilar. Vad Härjedalens *Macrolepidoptera* beträffar, ha överste C. Grill, doktor J. Peyron, adjunkt E. Vretlind och studeranden Hj. Virgin förut studerat dessa och samlat sammanlagt 77 arter. Till dessa komma nu ytterligare 25 arter *Macrolepidoptera* och 34 arter *Microlepidoptera*. Vid bearbetningen av det insamlade materialet ha vi vänt oss till en del specialister. Vi står i största tacksamhetsskuld till redaktör A. Jansson, som bestämt större delen av *staphyliniderna* och kontrollerat och bestämt övriga viktigare fynd, vilket utmärkes med A. J. Vidare ha vi att tacka Fil. D:r C. H. Lindroth för kontrollering av *carabider* och folkskollärare P. Benander för bestämning av småfjärilarna.

För det oss tilldelade reseunderstödet få vi även här framföra vårt värdsamma tack till Entomologiska Föreningen.

Använda förkortningar:

B (regio borealis), S (regio subalpina), A (regio alpina), Gb (Girtibauna), Ld (Ljungdalens), Td (Tänndalen), Ts (Tännäs), Gd (Gröndalen), mkt. a. (mycket allmän), a (allmän), m. a. (mindre allmän), t. a. (tämligen allmän). Asterisk betecknar för Härjedalen nya *Macrolepidoptera*.

Coleoptera.

Fam. Carabidae.

Cychrus caraboides L. v. *pygmaeus* Chd. i defekt ex. i uggleuppstötning. (Girtibauna).

Carabus catenulatus Scop. A: 2 ex. under stenar på topparna av Skars- (10/7) och Skarvfjällen (4/7). 2 ex. under stenar på fjällheden vid Helagsfj. — *C. violaceus* L. A: 1 ex. under sten på toppen av Hamrafj. (5/7). S: 2 ex. under stenar. Td. 16/7, 26/7. B: 1 ex. Ld. 31/7. — *C. glabratus* Payk. A: 1 dött ex. under sten på fjällheden. Storvallen.

Nebria gyllenhali Schönh. A: 6 ex. under stenar nedanför glaciären på Helagsfj. Samtliga ex. var *rufescens* Ström. 6 ex. under stenar på Hamra- och Skarsfj. 5/7, 10/7. B: 1 ex. under sten vid flodstrand. Hede. 27/6.

Pelophila borealis Payk. B: 2 ex. under sten vid flodstrand. Hede. 27/6.

Notiophilus hypocrita Putz. S: 1 ex. bland mossa på äng. Gd. 10/7. B: 1 ex. på en flodstrand. Hede. 27/6. — *N. aquaticus* L. A: 2 ex. under sten nedanför glaciären. Helagsfj. 26/7 samt bland mossa vid Hyddsjön 10/7.

Dyschirius globosus Hrbst. S: 2 ex. under sten på äng vid å. Td. 16/7.

Clivina fossor L. S: 1 ex. under sten på äng vid en å. Td. 16/7. B: tämligen allmän vid en å vid Hede. 1 ex. togs i Ld. 17/7.

Miscoderia arctica Payk. A: 2 ex. under sten vid en bäck. Hamrafj. 5/7. 1 ex. under sten nedanför glaciären på Helagsfj. 24/7.

Bembidion rupestre L. B: talrik på de småsteniga stränderna av en å vid Hede. 27/6. Några ex. under trädtycken på Ljungans grusiga stränder. Ld. 21/7. — *B. saxatile* Gyll. B: 1 ex. tillsammans med *rupestre*. Hede. 1 ex. Ld. — *B. prasinus* Duft. B: 1 ex. vid Hede. 28/6. — *B. virens* Gyll. B: 1 ex. vid Hede. 28/6.

Trechus rubens F. B: 1 ex. Hede. 27/6 (Lindroth det.).

Patrobus septentrionis Dej. A: under stenar, mestadels vid sjöar. — *P. assimilis* Chd. A: 2 ex. under sten på fjällheden. S: 12 ex. från olika platser.

Pterostichus adstrictus Eschz. B: 3 ex. under stenar på en äng. Hede. 28/6. (Lindroth det.). — *P. diligens* Strm. A: 1 ex. under sten på fjällheden. Helags. 24/7.

Amara similata Gyll. B: 1 ex. hävat på en äng. Ts. 29/6. — *A. quenseli* Schönh. S: 1 ex. under sten på en äng. Td. 15/7. B: 3 ex. på ängsmark. Ts. 29/6. Ld. 23/7. — *A. aulica* Panz. B: allmän i Tänndalen på odlad ängsmark. Arten satt i allmänhet uppkiven i enstaka ex. på *Taraxacum*. En gång iakttogs dock icke mindre än 7 ex. stående på huvudet i den utblommade blomkorgen av en *Taraxacum*, en del till och med kopulerande. Några ex. hävades i Ld. i slutet av juli. — *A. alpina* F. A: enstaka ex. under stenar på Hamra-, Skarv- och Helagsfj.

Europhilus fuliginosus Panz. A: 1 ex. under sten vid Helagsfj. 26/7.

Harpalus latus L. B: 1 ex. under sten på ängsmark. Hede. 27/6.

Bradycellus collaris Payk. S: 1 ex. under sten på ängsmark. Td. 15/7.

Calathus micropterus Duft. S: 2 ex. under stenar Gd. 9/7. Några ex. i Td. 6/7. B: 2 ex. under sten och mossa i Ts. 29/6. — *C. melanocephalus* L. S:

några ex. bland löv och mossa. Td. Gd. B: 1 ex. i hörlada Ld. $\frac{28}{7}$, samt 1 ex. av den melanistiska formen ab. *nubigena* Hal. Ts. $\frac{30}{7}$.

Fam. *Dytiscidae*.

Deronectes griseostriatus De G. (antagligen hybrider mellan denna art och *multilineatus* Falkenstr.) S: 1 ex. i en vattenpöl med tjockt lövlager på bottnen, Hamrafj. $\frac{3}{7}$. 1 ex. hävades i en klar sjö med stenig botten. Gd. $\frac{8}{7}$. Båda ex. äro typiska *multilineatus* Falk. (det. Falkenström).

Hydroporus lapponum Gyll. A: 4 ex. i en vattenpöl med slambotten. Skarsfj. $\frac{10}{7}$. (A. J.). — *H. palustris* L. S: 1 ex. i en sjö med storstenig botten. Td. $\frac{7}{7}$, 4 st. ex. hävades i liknande vatten i Gd. $\frac{8}{7}$. (A. J.). — *H. arcticus* Thoms. A: 1 ex. i en mindre vattensamling. Gd. $\frac{8}{7}$. — *H. umbrosus* Gyll. S: 1 ex. i vattensamling med slambotten. Td. $\frac{3}{7}$ (A. J.). — *H. tartaricus* Lec. S: 1 ex. i liknande vatten. Td. $\frac{8}{7}$. — *H. memnonius* Nicol. S: 1 ex. under sten i en strid bäck. Hamrafj. $\frac{7}{7}$. A: 1 ex. i en bäck med småstenig, sandig botten. Hyddsjön $\frac{10}{7}$.

Agabus guttatus Payk. A: 2 ex. i mindre vattensamling med gyttjebotten och enstaka Carex-tuvor Skarsfj. $\frac{10}{7}$. S: 7 ex. under stenar i en liten bäck Td. B: 1 ex. i en iskall källa Ts. $\frac{1}{7}$; 1 ex. i en bäck Ld. $\frac{24}{7}$. — *A. solieri* Aubé. A: 3 ex. i en pöl med slambotten, Skarsfj. $\frac{4}{7}$. — *A. arcticus* Payk. S: 1 ex. hävat i Td:s sjön. — *A. congener* Thubg. Samtliga regioner: allmän i rinnande och stillastående vatten av olika slag. Flertalet ex. tillhör var. *lapponicus* Thoms.

Platambus maculatus L. S: några ex. från steniga sjöstränder Td. och Gd. *Ilybius fuliginosus* F. S: 1 ex. i en större vattensamling med rik vegetation Td. $\frac{8}{7}$. — *I. aeneascens* Thoms. S: 1 ex. i en liten bäck. Td. $\frac{7}{7}$. —

I. angustior Gyll. S: 5 ex. i småvatten med slambotten. Td. $\frac{8}{7}$.

Colymbetes Paykulli Er. S: 2 ex. tillsammans med föreg. art. — *C. dolabratus* Payk. A: 1 ex. i en pöl på Skarvfj. $\frac{4}{7}$.

Fam. *Gyrinidae*.

Gyrinus minutus F. A: 2 ex. i en större vattensamling med rik vegetation av Carex. Gd. $\frac{8}{7}$. — *G. opacus* Sahlb. Allmän i samtliga regioner i vatten av olika slag.

Fam. *Staphylinidae*.

Aleochara moerens Gyll. S: ett 20-tal ex. på rutten fisk. Td. $\frac{15}{7}$, $\frac{16}{7}$, $\frac{17}{7}$. B: talrik i ruttnande strävsopp. Ld. $\frac{29}{7}$, 9 ex. på fisk. Ld. $\frac{23}{7}$, $\frac{30}{7}$.

Oxypoda spectabilis Märk. B: 1 ex. i bo av *Bombus terrestris*. Ld. $\frac{1}{8}$. 1 ex. i hörlada. Ld. $\frac{21}{7}$. — *O. sahlbergi* Seidl. (*borealis* Hellies, *subarctica* Bernh.) S: 1 ex. i kospillning. Td. $\frac{16}{7}$. — *O. procerula* Mnnh. B: 1 ex. i hörlada. Ld. $\frac{21}{7}$. — *O. annularis* Mnnh. S: 3 ex. under sten på fuktig ängsmark. Td. $\frac{17}{7}$.

Myrmedonia humeralis Grav. S: 1 ex. Td.

Atheta (Bessobia) excellens Kr. B: 1 ex. på rutten fisk. Ld. $\frac{28}{7}$. — *A. (Anopleta) arcana* Er. B: 2 ex. under granbark. Ld. $\frac{22}{7}$. — *A. (Microdota) spatula* Fauv. B: 46 ex. tagna på rutten fisk utlagd i starkt fuktig *Carex-Sphagnum* bevuxen kärrmark. Ld. $\frac{23}{7}$ — $\frac{30}{7}$. *A. spatula* är ny för Sverige. Arten är i Skandinavien förut känd från norra Norge. — *A. (Anopleta) corvina* Thoms. S: 1 ex. Td. $\frac{17}{7}$. — *A. (Traumocia) depressicollis* Tauv. B: 1 ex. i rutten strävsopp. Ld. $\frac{20}{7}$. 1 ex. under sten. Ld. $\frac{31}{7}$. — *A. (s. str.) diversa* Sharp. B: 9 ex. på rutten fisk. Ld. $\frac{23}{7}$, $\frac{29}{7}$.

- Atheta (Thinobaena) vestita* Grav. B: 1 ex. på ruttnande fisk. Ld. $\frac{23}{7}$. —
A. (Megista) graminicola Grav. B: talrik i hälada. Ld. $\frac{21}{7}$, 4 ex. på
 foecus hominis. Ld. $\frac{23}{7}$. — *A. (Megista) brunneipennis* Thoms. B: 1 ex.
 på foecus hominis Ld. $\frac{23}{7}$. — *A. (Liogluta) alpestris* Heer. B: 1 ex. i hö-
 lada. Ld. $\frac{21}{7}$. — *A. (Liogluta) laevicauda* J. Sahlb. S: 1 ex. Td. $\frac{7}{7}$. —
A. (Metaxya) elongatula Grav. B: 1 ex. i björkticka. Ld. $\frac{28}{7}$. — *A.*
(Metaxya) arctica Thoms. A: 1 ex. under sten vid Hyddsjön. $\frac{10}{7}$. — *A.*
(Chaetida) longicornis Grav. S: 1 ex. på rutten fisk. Td. $\frac{15}{7}$. — B: talrik på
 as och spillning. Ld. — *A. (Dimetrota) atramentaria* Gyll. S: 1 ex. i häst-
 spillning. Girtibauna $\frac{11}{7}$; 2 ex. i kospillning. Td. $\frac{15}{7}$. B: ej sällsynt på
 rutten fisk. Ld. — *A. (Dimetrota) picipennis* Mnnh. S: 1 ex. i hästspill-
 ning. Girtibauna $\frac{11}{7}$. B: ett 10-tal ex. på fisk. Ld. — *A. (Acrotona) fungi*
 Grav. S: 1 ex. bland löv. Td. $\frac{7}{7}$. B: 2 ex. i hälada; 1 ex. håvat. Ld.
Autalia puncticollis Sharp. S: 2 ex. i kospillning. Td. $\frac{16}{7}$.
Tachyporus chrysomelinus L. B: 1 ex. i torr hästspillning; 2 ex. under sten
 på äng. Ts. $\frac{29}{6}$, $\frac{29}{7}$.
Tachinus proximus Kr. S: i spillning och på rutten fisk. Td. B: på rutten
 fisk. Ld. — *T. pallipes* Grav. S: 1 ex. i kospillning. Td. $\frac{15}{7}$. B: 1 ex.
 i hästspillning. Ts. $\frac{29}{6}$; på rutten fisk. Ld. $\frac{20}{7}$ — $\frac{29}{7}$. — *T. laticollis* Grav.
 B: 1 ex. Ts. $\frac{29}{6}$. 3 ex. på foecus hominis i Ld. $\frac{23}{7}$. — *T. collaris* Grav.
 S: 1 ex. $\frac{5}{7}$. Td. 1 ex. under sten på flodstrand. Td. $\frac{17}{7}$. B: 2 ex. på
 rutten fisk. Ld. $\frac{29}{7}$. — *T. elongatus* Gyll. A: 1 ex. på stranden av Hydd-
 sjön. $\frac{10}{7}$.
Bolitobius pygmaeus F. B: 7 ex. i rutten strävsopp, Ld. $\frac{20}{7}$. 1 ex. i hälada,
 Ld. $\frac{31}{7}$.
Euryporus picipes Payk. B: 2 ex. på rutten fisk, utlagd i *Carex-Sphagnum*
 kärr. Ld. $\frac{17}{7}$.
Quedius laevigatus Gyll. B: 2 ex. Ld. $\frac{28}{7}$, $\frac{29}{7}$. — *Q. picipennis* Payk. var.
molochninus Grav. S: 7 ex. under stenar på ängsmark. B: 1 ex. i murken
 tallstubbe. Sveg, $\frac{27}{6}$. — *Q. boops* Grav. S: 1 ex. Td.
Creophilus maxillosus L. B: 2 ex. på rutten fisk. Ld. $\frac{3}{7}$.
Ontholestes murinus L. B: 1 ex. på ruttnande fisk. Ld. $\frac{3}{7}$.
Philonthus politus L. (*aeneus* Rossi). S: 1 ex. i lappkåta. Gd. $\frac{10}{7}$. 1 ex. på
 as. Td. $\frac{15}{7}$. B: 1 ex. på rutten fisk. Ld. $\frac{3}{7}$. — *Ph. subvirescens* Thoms.
 (nec. *atratus* Grav.) B: 1 ex. Hede $\frac{27}{6}$. — *Ph. nigriventris* Thoms. S: 1
 ex. på rutten fisk. Td. $\frac{15}{7}$. B: 1 ex. Hede $\frac{27}{6}$. — *Ph. albipes* Grav. B:
 1 ex. i torr hästspillning. Ld. $\frac{23}{7}$. — *Ph. varians* Payk. S: 3 ex. under
 kospillning. Td. $\frac{15}{7}$. — *Ph. puella* Nordm. B: 1 ex. i hästspillning. Ld.
 $\frac{23}{7}$. — *Ph. marginatus* Ström. S: 5 ex. i spillning. Td. B: 3 ex. under
 spillning. Ts. $\frac{29}{6}$.
Othius melanocephalus Grav. S: 4 ex. under sten, bland löv samt i hälada.
 Td. $\frac{13}{7}$ — $\frac{17}{7}$.
Xantholinus tricolor. F. S: 10 ex. under stenar på ängsmark. Td. $\frac{6}{7}$ — $\frac{17}{7}$.
Lathrobium fulvipenne Grav. B: 1 ex. under sten på ängsmark. Ts. $\frac{1}{7}$. —
L. punctatum Zett. S: 1 ex. Td.
Stenus Juno F. B: 1 ex. i hälada, 1 ex. håvat på frodig ängsmark vid en damm. Ld.
 — *S. clavigornis* Scop. B: 1 ex. håvat på fuktig ängsmark. Storsjö $\frac{29}{7}$. —
S. Strandii Ben. B: 1 ex. i en hälada, belägen på lågt liggande, fuktig ängs-
 mark. Ld. $\frac{21}{7}$. Ex., som är en ♀, torde tillhöra denna av L. Benick ny-
 ligen uppställda art, som står mycket nära *ruralis* Er. (Det. A. Jansson.).
S. buphtalmus Grav. B: 1 ex. håvat vid sjökan. Storsjö $\frac{28}{7}$. *S. canali-
 culatus* Gyll. B: 1 ex. i hälada. Ld. $\frac{21}{7}$. 1 ex. håvat på mosse. Storsjö
 $\frac{31}{7}$. Ex. torde tillhöra rasen *cordaticollis*. — *S. impressus* Grm. S: 1 ex.
 Td. $\frac{6}{7}$.
Platystethus arenarius Geoffr. S: 3 ex. i torr hästspillning. Girtibauna $\frac{11}{7}$.
 B: i dito: Ts. $\frac{29}{6}$ samt Ld. $\frac{23}{7}$.

- Haploderus caelatus* Grav. B: 1 ex. i torr spillning; Ld. $\frac{2}{7}$.
Oxytelus rugosus F. B: 1 ex. Hede. $\frac{27}{6}$. — *O. laequatus* Mrsh. S: tämligen allmän i spillning. Td. B: 1 ex. Ts. $\frac{1}{7}$.
Boreaphilus henningianus Sahlb. B: 1 ex. i en lågt liggande hölada. Ld. $\frac{21}{7}$.
Anthophagus alpinus F. A: 5 ex. på toppröset på Hamrafj. $\frac{5}{7}$. S: allmän på buskar och örter. Td. Gd. B: 2 ex. Ts. Hede. — *A. omalinus* Zett. S: 2 ex. tillsammans med föreg. art. Td. B: 2 ex. Ld. $\frac{22}{7}$.
Geodromicus globulicollis Mnnh. A: 1 ex. i mossa på Hyddsjöns sandstrand. $\frac{10}{7}$. S: 1 ex. under sten på äng, i närheten av en å. 1 ex. i en brunn. Td. B: 1 ex. på fäldstrand. Ts. 2 ex. i en hölada. Ld.
Lesteva monticola Kiesw. A: 1 ex. på toppen av Hamrafj. $\frac{5}{7}$.
Acidota crenata F. A: 2 (vinddrivna) ex. på glaciären på Helagsfj. $\frac{26}{7}$.
Arpedium quadrum Grav. B: Mycket talrik i en hölada: Ld.
Olophrum rotundicolle Sahlb. S: 1 ex. under sten på fäldstrand. Td. $\frac{16}{7}$.
Deliphrum tectum Payk. S samt B: allmän, mestadels på as.
Omalium rivulare Payk. S samt B: tämligen allmän på rutten fisk. — *O. septentrionis* Thoms. B: tillsammans med föreg. art.
Phyllodrepa linearis Zett. B: 1 ex. i en hölada. Ld. $\frac{21}{7}$.
Pycnoglypta lurida Gyll. B: 3 ex. i en hölada. Ld. $\frac{21}{7}$.
Acrolia inflata Gyll. S: 1 ex. under björkbark Gd. $\frac{9}{7}$. B: 1 ex. i en hölada. Ld. $\frac{21}{7}$.
Anthobium minutum F. B: 2 ex. hävade vid mosse. Storsjö $\frac{31}{7}$. — *A. lapponicum* Mnnh. A: 1 ex. hävat i vidregionen på Hamrafj.
Megarthus depressus Payk. B: 4 ex. på rutten fisk. Ld. — *M. denticollis* Beck. B: 1 ex. på rutten fisk. Ld. $\frac{30}{7}$.
Proteinus brachypterus F. B: 1 ex. i en starkt förruttnad strävsopp. Ld. $\frac{20}{7}$.

Fam. *Pselaphidae*.

- Euplectus* sp. B: 2 ex. i humlebo i ihålig granstock: Ld.

Fam. *Silphidae*.

- Catops coracinus* Kelln. B: 2 ex. på ruttnande fisk. Ld. $\frac{30}{7}$. — *C. morio* F. B: 1 ex. på foecus hominis. Ld. $\frac{23}{7}$. 1 ex. i hölada på rent ben. Ld. $\frac{21}{7}$. — *C. tristis* Panz. B: 2 ex. sannolikt i hölada. Ld. $\frac{20}{7}$. — *C. alpinus* Gyll. S: 1 ex. på utlagd fisk. Td. $\frac{4}{7}$. B: tämligen allmän på rutten fisk. Ld.
Necrophorus investigator Zett. S: 1 ex. på fisk. Td. $\frac{4}{7}$. — *N. vespilloides* Hrbst. S: ett 10-tal ex. på fisk. Td.
Thanathophilus lapponicus Hrbst. A: 20 ex. på en hartass, Hamrafj. $\frac{3}{7}$. B: 1 ex. på rutten fisk. Ld. $\frac{1}{8}$.

Fam. *Liodidae*.

- Hydnobius punctatus* Strm. var. *spinipes* Gyll. B: 1 ex. hävat på en äng vid mosse, Storsjö $\frac{31}{7}$. 1 ex. togs i ett bo av *Bombus terrestris*, beläget under en granstubbe i en glest och torrt gräsbevuxen skogsbacke. Ld. $\frac{1}{8}$.
Liodes obesa Schmidt. S: 1 ex. under sten på frodig ängsmark. Td. $\frac{16}{7}$.
Anisotoma axillaris Gyll. B: 2 ex. under barken på en tallstubbe. Sveg $\frac{27}{6}$. — *A. glabra* Kugel. B: 7 ex. tillsammans med föregående art. (A. J.).

Fam. *Ptiliidae*.

- Acrotrichis grandicollis* Mnnh. S: 1 ex. Td. $\frac{17}{7}$. — *A. fascicularis* Hrbst. B: 4 ex. i granticka. Ld. $\frac{22}{7}$.

Fam. *Histeridae*.

Hister unicolor L. S: 1 ex. på rutten fisk. Td. $\frac{15}{7}$.

Fam. *Scarabaeidae*.

Aphodius fimetarius Lin. B: 1 ex. i hästspillning. Ts. $\frac{29}{6}$. — *A. lapporum* Gyll. A: I spillning $\frac{3}{7}$ — $\frac{26}{7}$ (Hamrafj., Skarsfj., Skarvfj., Helagsfj.). S: I spillning. Td. Girtibauna. — *A. piceus* Gyll. A: I kospillning. Hamrafj. S: i dito. Td. Girtibauna. B: 1 ex. på rutten fisk. $\frac{23}{7}$. Ld. — *A. rufipes* L. S: I kospillning, ett och annat ex. på utlagda fiskar. B: 1 ex. Ts. $\frac{1}{7}$. *Aegialia sabuleti* Payk. B: Fanns talrikt på de sandiga stränderna av ån vid Hede, $\frac{27}{6}$.

Geotrupes stercorosus Scriba. S: 1 ex. krypande på en väg, Td. $\frac{15}{7}$.

Trichius fasciatus L. S: Tämligen allmän på *Cirsium heterophyllum*, *Geranium sylvaticum*, *Angelica*. Td. $\frac{3}{7}$ — $\frac{15}{7}$. B: 1 ex. $\frac{22}{7}$ på *Epilobium angustifolium*. Ld.

Potosia cuprea F. ab. *metallica* Hrbst. A: Ett 50-tal ex. erhölls på fjärillockbeten, som upphängts i videregionen på Hamrafj. mitt på dagen. S: allmän huvudsakligen på *Cirsium heterophyllum*. Td. B: några ex. på *Cirsium* Ld.

Fam. *Hydrophilidae*.

Helophorus glacialis Villa. S: 4 ex. på och under några stenar i en bäck. Hamrafj. $\frac{7}{7}$.

Linnebius truncatellus Thunb. S: 3 ex. tillsammans med föregående art.

Cercyon haemorrhoidalis ab. *erythropterus* Muls. B: 1 ex. i hästspillning. Ts. $\frac{29}{6}$ (A. J.). — *C. impressus* Strm. S: tämligen allmän i kospillning. Td. Girtibauna. B: I kospillning, 5 ex. på fisk. Ld. — *C. melanocephalus* L. S: 2 ex. i kospillning. Td. $\frac{16}{7}$. Girtibauna $\frac{10}{7}$. B: 9 ex. i hästspillning. Ts. $\frac{29}{6}$. — *C. unipunctatus* L. B: 1 ex. på rutten fisk. Ld. $\frac{30}{7}$. — *C. analis* Payk. S: 1 ex. under kospillning. Td. $\frac{15}{7}$.

Cryptopleurum minutum F. S: 1 ex. i hästspillning. Td. $\frac{17}{7}$. B: i hästspillning. Ts. $\frac{29}{6}$. 19 ex. $\frac{23}{7}$. Ld. 2 ex. på rutten fisk. Ld. $\frac{30}{7}$.

Fam. *Nitidulidae*.

Cateretes pedicularius L. B: 1 ex. håvat på en örtrik äng vid Hede, $\frac{27}{6}$.

Epuraea depressa Ill. B: 2 ex. togos på fjärillockbeten i Ts. $\frac{1}{7}$. 1 ex. i bo av *Bombus terrestris*. Ld. $\frac{1}{6}$. — *E. placida* Mäkl. (*lapponica* Reitt.) S: 2 ex. på blommande *Rumex*. Gd. $\frac{1}{7}$. 1 ex. på *Ranunculus*. Td. $\frac{18}{7}$. 4 ex. på älgräs. B: talrik i en hölada i Ld. — *E. pusilla* Ill. B: 2 ex. under granbark. Ts. $\frac{1}{7}$. — *Epuraea*-arterna har Dr. O. Sjöberg, Loos, godhetsfullt bestämt.

Glischrochilus quadripustulatus L. B: 2 ex. bland flisor av en nyhuggen gran. Ts. $\frac{1}{7}$.

Fam. *Rhizophagidae*.

Rhizophagus ferrugineus L. B: 1 ex. under granbark. Ts. $\frac{1}{7}$. — *Rh. dispar* Payk. S: 2 ex. under barken på en torr, stående björk. Gd. $\frac{1}{7}$. B: 2 ex. i *Polyporus* på björk. Ld. $\frac{28}{7}$.

Fam. *Cucujidae*.

Pediacus fuscus Er. B: 2 ex. krypande på en granplanka i starkt solsken.

Fam. *Cryptophagidae*.

Antherophagus pallens Oliv. B: 4 ex. i bo av *Bombus hypnorum*. Ld. $\frac{2}{8}$. I boet fanns endast dessa 4 imagines men stora mängder larver.

Cryptophagus scanicus L. S: 2 ex. i sågspän. Td. $\frac{15}{7}$. B: talrik i hälada i Ld. (A. J.). — *C. setulosus* Strm. B: 12 ex. i bo av *Bombus terrestris*. Ld. $\frac{1}{8}$. (A. J.).

Fam. *Lathridiidae*.

Enicmus minutus L. S: i Gd. togos 3 ex. under barken på en död björk. 5 ex. på blommorna av *Ranunculus* sp. Td. $\frac{18}{7}$. 1 ex. inomhus. Td. $\frac{16}{7}$.

Corticaria ferruginea Mrsh. B: 1 ex. inomhus. Ts. $\frac{1}{7}$. — *C. pubescens* Gyll. B: 3 ex. i hälada. Ld. $\frac{21}{7}$. — *Corticarina fuscula* Gyll. B: 2 ex. håvade Ld. $\frac{29}{7}$. (A. J.).

Fam. *Cisidae*.

Cis boleti Scop. B: 6 ex. i björksvamp. Ld. $\frac{28}{7}$. — *C. hispidus* Gyll. B: 2 ex. tillsammans med *boleti*. (A. J.).

Fam. *Colydiidae*.

Cerylon ferrugineum Steph. S: 6 ex. under barken på en död björk. Gd. $\frac{9}{7}$.

Fam. *Endomychidae*.

Endomychus coccineus L. B: På barken av en granstock togos den $\frac{22}{7}$ i nykläckt ex. samt 3 st. löst fastsatta, ljusröda puppor, vilka kläcktes några dagar senare. Ld.

Fam. *Coccinellidae*.

Coccinella bipunctata L. B: 1 ex. Hede $\frac{27}{6}$. — *C. septempunctata* L. B: 2 ex. Tännäs, Ld. På *Salix*.

Fam. *Byrrhidae*.

Cytilus sericeus Forst. B: 1 ex. i mossa under död fisk. Ld. $\frac{23}{7}$. — *C. auri-comus* Duft. B: 1 ex. på en grusig flodstrand. Ts. $\frac{27}{6}$.

Byrrhus fasciatus Forst. A: på sina ställen ganska allmän under stenar t. ex. Hamrafj, Helagsfj. — *B. pustulatus* Forst. B: 1 ex. Ts. $\frac{3}{7}$.

Syncalyptra cyclolepidia Munst. A: 1 ex. bland mossa på en sandbank, Hyddsjön (Gd.) $\frac{10}{7}$.

Fam. *Buprestidae*.

Anthaxia quadripunctata Lin. B: 1 ex. på blomkorg av *Hieracium* sp.; 3 ex. fångade flygande kring obarkade granstockar. Ld. $\frac{22}{7}$, $\frac{23}{7}$.

Chrysobothris chrysostigma L. B: 6 ex. flygande omkring ett stockupplag.
Ld. $\frac{28}{7}$.
Agrilus viridis L. S: 10 ex. från olika platser. De flesta tagna på björkstammar.

Fam. Elateridae.

Selatosomus aeneus L. B: 1 ex. under sten på en äng. Ts. $\frac{1}{7}$. — *S. incanus* Gyll. B: 12 ex. huvade på en äng vid en flodstrand. Hede, $\frac{28}{6}$. I Tänndalen huvades ett 10-tal ex. på en liknande lokal $\frac{3}{6}$.
Hypnoides dermestoides Hrbst. B: 9 ex. under mindre stenar på en grusstrand. Samtliga ex. tillhör huvudformen. Hede, $\frac{7}{6}$.
Cryptotyphlus rivularius Gyll. A: 1 ex. på sandstrand. Hyddsjön, $\frac{10}{7}$. S: 1 ex. på en sten vid bäck. Td. $\frac{13}{7}$. — *C. riparius* F. B: 6 ex. tillsammans med *Hypnoides dermestoides*. Hede $\frac{27}{6}$. 1 ex. under sten på flodstrand. Ts. $\frac{1}{7}$.
Denticollis linearis L. S: 6 ex. på björk. Td. $\frac{1}{7}$ — $\frac{4}{7}$.

Fam. Helodidae.

Helodes minutus, L. B: 1 ex. Td. $\frac{2}{7}$.
Cyphon variabilis Thunb. v. *nigriceps* Kiesv. B: 7 ex. på *Epilobium angustifolium*. Ld. $\frac{28}{7}$. — *Cyphon kongsbergensis* Munst. B: 2 ex. huvade på fuktig ängsmark i Storsjö $\frac{28}{7}$. Endast känd från Fennoskandia.¹ Beskrivningen finnes i Norsk Entom. Tidskrift 1923 p. 292. — *C. coarctatus* Payk. B: 3 ex. huvade på fuktig, *Salix*-bevuxen ängsmark. Hede $\frac{27}{6}$.

Fam. Cantharidae.

Dictyopteris Aurora Hrbst. B: 1 ex. fångat flygande kring en hög granstockar. Ts. $\frac{1}{7}$.
Podabrus alpinus Payk. B: 3 ex. på ängsmark. Hede $\frac{28}{6}$. 6 ex. på hallonbuskar. Ts. $\frac{1}{7}$.
Cantharis assimilis Payk. B: 3 ex. på fuktig, *Salix*-bevuxen ängsmark. Hede $\frac{27}{6}$, $\frac{28}{6}$.
Absidia pilosa Payk. Samtliga regioner: På frodig, buskbevuxen gräsmark. 12 ex. — *A. rufotestacea* Letzn. S: 2 ex. på liknande lokaler: Gd. samt Girtibauna.
Rhagonycha testacea L. B: 4 ex. huvade på äng i Hede $\frac{28}{6}$. 2 ex. på sankmark. Td. $\frac{2}{7}$. — *Rh. limbata* Thoms. B: 1 ex. Hede. S: 4 ex. på örtrik skogsäng. Td. — *Rh. elongata* Fall. B: 2 ex. Hede $\frac{28}{6}$. — *Rh. atra* Lin. A: 1 ex. på sandbank vid Hyddsjön. $\frac{10}{7}$.
Malthodes marginatus Latr. B: 1 ex. ♀ i en hölada. Ld. $\frac{21}{7}$. — *M. fuscus* Waltl. S: 1 ex. på örtrik ängsmark. Td. $\frac{13}{7}$. — *M. flavoguttatus* Kiesw. B: 3 ex. på fuktig, *Salix*-bevuxen äng. Ts. Hede. S: i Tänndalen allmän.

Fam. Ptinidae.

Ptinus fur L. S: 1 ex. i boningsrum. Td. $\frac{7}{7}$.

Fam. Serropalpidae.

Abdera affinis Payk. S: 1 ex. under barken på död björk. Gd. $\frac{9}{7}$.

¹ För Sverige har red. Jansson meddelat följande utbredning: Boh., Sm., Ög., Vg., Dalsl., Närke, Häls. samt Jämtl.

Fam. *Mordellidae*.

Mordella maculosa Naez. B: 1 ex. på granstubbe bevuxen med *Polyborus*. Ld. 1 ex. på brostolpe $\frac{2}{7}$. S: 1 ex. på torr, tickbevuxen stolpe. Td. $\frac{2}{7}$. — *Anaspis arctica* Zett. S: 1 ex. på älggräs. 1 ex. på Angelica. Td. $\frac{13}{7}$. — *A. flava* L. B: 1 ex. antagligen på *Cirsium heterophyllum*. Ld. $\frac{3}{7}$. *A. norvegica* Munst. B: 1 ex. Ts. $\frac{20}{6}$. Red. Jansson har haft ex. till påseende och anser också, att det sannolikt tillhör denna art. Ex. är emelertid starkt defekt.

Fam. *Oedemeridae*.

Oedemera virescens L. B: ett 20-tal ex. håvade på *Rhinanthus major* på torr gräsmark. $\frac{20}{6}-\frac{1}{7}$. Ts.

Fam. *Pythidae*.

Pytho depressus L. B: tämligen allmän på granstockar. $\frac{7}{6}-\frac{25}{7}$. I Ld. togos larverna talrikt under bark. *Sphaeristes Reyi* Ab. B: 1 ex. togs krypande på en planka i starkt solsken. Ld. $\frac{23}{7}$. (A. J.).

Fam. *Cerambycidae*.

Rhagium mordax De G. S: 1 ex. flygande. Td. $\frac{5}{7}$. 1 ex. på *Cirsium heterophyllum*. Td. $\frac{15}{7}$. — *Rh. inquisitor* L. B: i Ljungdalen påträffades larver, puppor och imagines talrikt under granbark: samtliga puppor kläcktes någon vecka senare.

Toxotus cursor L. B: ett defekt ex. i en springa i en granstör. Ts.

Pachytus lamed B: 1 ex. på en hög granplankor. Ld. $\frac{23}{7}$.

Evodinus interrogationis L. B: 6 ex. på blommande hallonbuskar och *Anthriscus silvestris*. Ts. A: allmän i videzonerna på *Geranium sylvaticum*, Hamrafj.

Gaurotes virginea L. B: 1 ex. på en granstock. Ts. $\frac{3}{6}$.

Acmaeops pratensis Laich. S: 1 ex. på *Chrysanthemum* $\frac{18}{7}$. Td. B: 3 ex. på *Carduus* $\frac{2}{7}$, 1 ex. på *Achillea millefolium*. Ld. $\frac{3}{7}$. — *A. septentrionis* Thoms. B: 1 ex. $\frac{7}{6}$ på en fönsterruta på stationen i Hede. Ett ex. $\frac{20}{6}$. Ts. 1 ex. Ld. $\frac{23}{7}$: båda på granstockar.

Leptura sexmaculata L. B: 1 ex. på granstock, tre ex. på blommande hallonbuskar, 1 ex. på *Anthriscus silvestris*. Samtliga ex. $\frac{1}{7}$. Ts. — *L. virens* L. B: 4 ex. på *Cirsium heterophyllum*. 1 ex. på en granplanka. Ld. — *L. inexpectata* Jansson & Sjöberg. B: 1 ex. på *Angelica*. Ld. $\frac{31}{7}$.

Asemum striatum L. B: 2 ex. på granstockar. Ts. 1 ex. på telefonstolpe, 1 ex. på en stock. Ld.

Tetrophium castaneum L. B: 3 ex. på granstockar (ett ex. 8 mm., ett annat 18 mm. långt).

Callidiump violaceum L. S: 2 ex. på en lada av granstockar. Td. B: allmän. *Monochamus sutor* L. B: allmän på barrträdsstockar.

Pogonoherus fasciculatus De G. B: i Tännäs tämligen allmän på granstockar. I Ljungdalen togs endast 1 ex. på dito.

Saperda scalaris L. S: 1 ex. på en vedstapel (björk). Td. $\frac{15}{7}$.

Fam. *Chrysomelidae*.

Plateumaris discolor Panz. S: 1 ex. håvat på starräng. Td.

Clythra quadripunctata L. A: 2 ex. på *Salix* i videzonerna $\frac{3}{7}, \frac{6}{7}$ (Hamrafj.).

- Cryptocephalus sexpunctatus* L. S: 1 ex. $\frac{9}{7}$. Gd. 1 ex. $\frac{13}{7}$. Td. B: 2 ex. $\frac{1}{7}$. Ts. 1 ex. $\frac{28}{6}$, Hede. Samtliga ex. på björk. — *Cr. distinguendus* Schneid. B: 1 ex. på björk. Ts. $\frac{29}{6}$. — *Cr. labiatus* L. A: ett ex. i videzonerna på Hamrafj. $\frac{5}{7}$. På dvärgbjörk (*Betula nana*).
Adoxus obscurus L. B: 4 ex. på *Epilobium angustifolium* Ts. $\frac{1}{7}$.
Chrysomela marginata L. B: 1 ex. Ts. $\frac{29}{6}$.
Gastroidea viridula De G. S: tämligen allmän. B: allmän på *Rumex*-arter.
Melasoma tremulae F. B: 1 ex. på asp. Ts. $\frac{1}{7}$.
Phytodecta linnaeana Schrank. B: 1 ex. på *Salix*. $\frac{29}{6}$. Ts. — *Ph. affinis* Schönh. A: 3 ex. i videzonerna $\frac{24}{7}$, Helags. S: 7 ex. på *Salix*. Td. — *Ph. quinquepunctata* F. A: 1 ex. $\frac{29}{7}$ Hyddsjön. I videzonerna på Hamrafj. allmän i början på juli. B: 1 ex. $\frac{27}{6}$, Hede. 1 ex. $\frac{1}{7}$. Ts.
Phyllodecta vulgarissima L. B: 1 ex. $\frac{29}{6}$, Hede. — *Ph. vitellinae* L. B: tämligen allmän på *Salix* och asp.
Hydrothassa marginella L. S: några ex. antagligen på *Caltha* $\frac{7}{7}$. Td.
Adimonia tanaceti L. B: 1 ex. $\frac{1}{7}$, Tännäs; 2 ex. $\frac{29}{7}$ samt $\frac{31}{7}$. Ld. S: 1 ex. $\frac{17}{7}$. Td. Samtliga på ängsmark.
Lochmaea capreae L. B: några ex. hävades på *Salix* i Hede $\frac{28}{6}$.
Crepidodera femorata Gyll. B: $\frac{28}{6}$, Storsjö, 2 ex. antagligen på *Caltha*.
Chaetocnema Sahlbergi Gyll. B: 2 ex. hävades på en mosse $\frac{31}{7}$, Storsjö.
Haltica oleracea L. B: 1 ex. på hjortron $\frac{31}{7}$, Storsjö.
Phyllotreta flexuosa Ill. B: 1 ex. hävat i fuktig ängsmark $\frac{28}{7}$, Storsjö.

Fam. Curculionidae.

- Otiorrhynchus dubius* Ström. A: här och där allmän under stenar. På Hamrafj. påträffades mängder av djur, som vandrade ner mot en strid bæk, där de rycktes bort av strömmen. B: 1 ex. Ts. $\frac{1}{7}$.
Strophosoma rufipes Steph. B: 3 ex. hävade på en örtrik äng. Ts. $\frac{29}{6}$ – $\frac{1}{7}$.
Sitona flavescens Marsh. B: 1 ex. hävat på en örtrik äng. Ld. $\frac{23}{7}$; 1 ex. Ld. $\frac{29}{6}$. — *S. decipiens* Håk. Lindberg. B: 4 ex. Ld. $\frac{29}{7}$; 1 ex. Ld. $\frac{23}{7}$; 1 ex. Ts. $\frac{29}{6}$. Samtliga ex. hävade på örtrik ängsmark. Denna art, som står *crinitus* Hbst mycket nära, har förut sammanblandats med närliggande arter. Beskrivningen finnes införd i Mem. Soc. F. et Fl. Fenn., 9, p. III. 1933, samt i H. Lindbergs översikt över Finlands *Sitona*-arter (Not. Ent. XIII, p. 92, 1933). Decipiens torde vara utbredd över hela Sverige. (Det. A. J.)
Hylobius abietis L. B: allmän i Ts.
Pissodes pini L. B: tämligen allmän.
Anthonomus rubi Hrbst. S: 1 ex. $\frac{1}{7}$. Td. B: 2 ex. hävade på ängsmark. Ts. $\frac{29}{6}$.
Magdalisa carbonaria L. S: talrik på en stapel björkved. Td. $\frac{15}{7}$.
Rhinoncus castor F. B: 1 ex. på en frodig äng. Ld. $\frac{29}{7}$.
Ceutorrhynchus punctiger Gyll. B: 1 ex. hävat. Hede $\frac{27}{6}$.
Polydrosus tereticollis De G. S: tämligen allmän på björk. — *P. ruficornis* Bonsd. B: 1 ex. Ld. $\frac{23}{7}$.
Apion apicranus Hrbst. B: 25 ex. hävade på ängsmark i Ld. $\frac{29}{7}$. — *A. crudentatum* Walt. B: 1 ex. tillsammans med föreg. art. (A. J.)
Rhyncites betulae L. Allmän—mycket allmän, särskilt i subalpina regionen. Vinddrivna ex. påträffades ofta i reg. alp. som t. ex. vid Hyddsjön (talrika ex. på de sandiga stränderna) och på Helagsfj.
Barypithecus fellucidus Boh. B: 1 ex. hävat på torr gräsmark. Ts. $\frac{29}{6}$. (A. J.)

Fam. Hippidae.

- Scolytus Ratzeburgi* Jans. S: Gångsystem av denna art iakttogets på några ställen.

Hylurgops palliatus Gyll. B: 4 ex. under den tunna barken på en fuktigt liggande granstock. Ld. $\frac{2}{7}$. — *H. glabratus* Zett. B: mycket talrik på den undre sidan av en liggande gran. Ld. $\frac{2}{7}$.

Hylastes cunicularius Er. B: ett 10-tal ex. från olika platser.

Crypturgus hispidulus Thoms. B: 3 ex. tillsammans med *Pityogenes chalcographus* L. under barken på översidan av en liggande gran. Ld. $\frac{2}{7}$.

Dryocoetes autographus Ratz. B: 1 ex. Ts. $\frac{2}{6}$. — *Dr. hectographus* Reitt. B: talrik under barken på en liggande gran samt på några stubbar. Ld. $\frac{2}{7}$.

Pityophthorus micrographus L. B: 1 ex. Ld. $\frac{2}{7}$.

Pityogenes chalcographus L. B: ett 20-tal ex. från Ld.

Ips acuminatus Gyll. B: 1 ex. Ts. $\frac{1}{7}$. — *I. typographus* L. B: 1 ex. Ld. $\frac{2}{7}$.

Lepidoptera.

**Pieris napi* L. 1 ♀ av huvudformen i Hede $\frac{2}{6}$. 1 ♂ av var. *adalwinda ab. suffusa* Ver. i Ld. $\frac{3}{7}$, förut sydligast tagen i norra Jämtland.

Eurymus palaeno L. 1 ♂ i Ts. $\frac{2}{6}$, i Td. $\frac{1}{7}$, i Gb. $\frac{1}{7}$. 1 ♀ i Ld. $\frac{2}{8}$.

Vanessa urticae L. 2 ex., ♀♂, i Td., S., $\frac{5}{7}$. Likna mycket var. *polaris* Stgr. M. a. Ts., B., och i Td., S.

Argynnis aglaja L. Mkt. a. i S. under juli månad, i synnerhet på fåbodvallarna. 1 ♀ är ab. *suffusa* Tutt. 1 ♂ från Ld., B., $\frac{1}{8}$, har vbr. 35 mm.

Brenthis selene Schiff. var. *hela* Stgr. T. a. i B. (Hede, Ts.) och S. (Td.) Flög mera över myrar än följ. och gick ej så högt upp. — *B. euphrosyne* L. Allm. än föreg. i alla reg. 1 ♂ från Gd., S., tillhör huvudform. De övriga tillhör var. *lapponica* och några ab. *obscurior* Stgr. Höll helst till på torrare marker och påträffades även ovan trädgränsen. Iakttogs under hela juli månad.

Boloria pales lapponica Stgr. M. a. i början av juni i S. och A., Td. Några ex. tillhör *f. isis* Hb. och flögo i A. eller nära denna på slätterängar med torr mark. — *B. p. aquilonaris* Stich. Mycket allmänna än föreg. i alla reg.; dock ovanlig i A. Var jämt *Erebia ligea* och *Plebejus idas* den vanligaste dagfjärilen.

Erebia ligea L. Mkt. a. i B. och S. under juli. Var. *dovrensis* Strand. allmänast, ofta flygande tillsammans med huvudformen. Mellan dessa funnos många övergångsformer och andra former: ab. *coeca* Kolinko, ab. *tricellata* Strand. Vanligast i björkskogens gläntor; ej ovanför trädgränsen. — *E. lappona* Thnbg. A. i A. till mitten av juli. Enstaka ex. påträffades nedanför trädgränsen. 1 ♀ är ab. *brunnea* Scheld., Td. $\frac{5}{7}$ A.

Callophrys rubi L. Endast 1 ex. (♀) fångades i Ts. $\frac{3}{6}$.

Heodes hippothoe L. var. *stieberi*. 7 ex., 1 ♀ från Td. och Gd., S. $\frac{1}{7}$ — $\frac{15}{7}$. Flög endast vid vackert väder och i terräng med kraftig busk och örтvegetation nära trädgränsen. — **H. amphidamas* Esp. 1 ♀ från Hede $\frac{2}{6}$ B.

Plebejus idas L. var. *lapponicus* Gerh. Mkt. a. under juli. T. a. ovan trädgränsen. Följande ab. fångades: *brunnea* Spul., *lutea* Car., *extenta* Strand., *sagittata* Courv. och *parvipunctata* Courv. — **Pl. medon* Esp. 1 ♀ och 1 ♂ från Ts., B.; båda tillhör ab. *allous* Hb. — *Pl. orbitulus* Prun. A. på Hamrafjällets (Td.) sydostsluttnings, där denna vid trädgränsen täcktes av en riklig örтvegetation med bl. a. *Astragalus alpinus* och *oroboides*. Vidare påträffades den tämligen sparsamt längs hela Hamrafjället till sjön Malmagen. Ovanför trädgränsen förekom den på fjällhedar med *Astragalus alpinus* i närheten av Gd. och var t. a. trots lokalernas stora avstånd till trädgränsen.

Polyommatus icarus L. Påträffades i enstaka ex. i Hede, B., Ts., B. och Td., S. i juli. 1 ex. torde tillhörta var. *septentrionalis* Fuchs. — **P. semiargus* Rott. 1 ♂, Hede $\frac{2}{6}$. — *P. optilete* Knoch. var. *cyperissus* Hb. M. a. i B. och S., ovanlig i A. Till mitten av juli.

Urbicola comma L. Mkt. a. i B. och S. på torrare marker under juli. *Var. catena* Stgr. förekom sparsamt bland huvudformen i båda reg.

Agrotis tecta Hübn. Enstaka ex. i S. och A. i ♂ fängades på Skarsfjället flygande över heden i solskenet $\frac{10}{7}$. — *A. hyperborea* Zett. Ett 10-tal ex., därav 3 ♀. På lockbete i Ts. och Gd., S., i mitten av juli. Ett ex. på fjällhed i närlheten av Fjällnäs. — *A. rubi* View. i ♀ på lockbete, Ts., B. $\frac{1}{7}$. — *A. mendica borealis* Zett. A. på lockbete i S. till mitten av juni. — *A. speciosa artica* Zett. Det allmännaste flytet i S. till senare hälften av juli. Endast på lockbete; på en kväll togos 60 ex. i Td. — *A. cuprea* Hübn. Var från slutet av juli den allmänna fjärilen. Besökte livligt *Carduus crispus* och om kvällarna även *Silene venosa*. — **A. recussa* Hb. 3 ♂♂, Ld., B., i slutet av juli. M. a. på lockbete och *Silene venosa* i Ld., B. — *A. occulta* L. M. a. på lockbete i Td., S., Gd., S. och Ld., B., från mitten av juli—början av augusti. I ex. är *ab. uniplicata* Lef. — **A. kongs-voldensis* Grönl. Godhetsfullt bestämd av amanuens Ehnbom. I ♀, 2 ♂♂ på lockbete, Gd., S. $\frac{10}{7}$. Dessutom observerades ännu några ex. på lockbetena.

Mamestra dentina Esp. 4 ♂♂, Ts., B. och Td., S. $\frac{1}{7}$ — $\frac{18}{7}$ på lockbete. Böra möjligen räknas till *var. latenai* Pierr.

Hadena maillardi Geyer. 10-tal ex. på lockbete och *Silene venosa*, Td., S. och Gd., S. $\frac{5}{7}$ — $\frac{20}{7}$. Allmänast i Gd. — *H. lateritia* Hufn. I ♀, 2 ♂♂ på *Silene venosa*, Ld., B. $\frac{27}{7}$. — *H. remissa* Hübn. I ♀ på lockbete, Td., S. $\frac{15}{7}$.

**Dianthoecia rivosa* Ström. 2 ♂♂ på *Silene venosa*, Td., S. $\frac{13}{7}$.

Charaeas graminis L. M. a. i Td., S. $\frac{15}{7}$ — $\frac{19}{7}$, mkt. a. i Ld., B. $\frac{21}{7}$ — $\frac{5}{8}$.

**Hyppa rectilinea* Esp. 2 ♂♂, 3 ♀♀ på lockbete i Td. och Gd., S. $\frac{5}{7}$ — $\frac{15}{7}$.

Anarta melanopa Thunb. I ♀, Td., S. $\frac{5}{7}$ på Azalea-hed. — *A. metaleuca* Thunb. I S. och allmänast i A. $\frac{3}{7}$ — $\frac{12}{7}$. Var i synnerhet allmän på ris-hedar och i Gröndalens björkskog. — **A. funebris* Hübn. I ♀ på landsväg genom granskog, Ts. $\frac{29}{6}$. — **A. lapponica* Thunb. I ♂ på *Vaccinium myrtillus*-hed, Td. $\frac{5}{7}$. — **A. Staudingeri* Aur. I ♀ på *Betula nana*-hed, halvvägs mellan Fjällnäs och Gd., $\frac{10}{7}$.

**Plusia iota* L. I ♀ på *Silene venosa*, Td., S. $\frac{14}{7}$. — *Pl. pulchrina* Hw. I ♂, Ts., B. $\frac{20}{6}$ på dagen. I ♂, I ♀ på *Silene venosa*, Td., S. $\frac{13}{7}$ på kvällen.

— *Pl. interrogationis* L. I ♂ på *Silene venosa*, Td., S. d. $\frac{14}{7}$ på kvällen.

I ♂ på mosse, Ld., B. $\frac{28}{7}$ på dagen. — **Pl. diasema* Boisd. I ♂ på klöveräng, Td., S. $\frac{17}{7}$.

Herminia tentacularia L. I ♂, Td., S. $\frac{6}{7}$ på kvällen.

**Geometra papilionaria* L. I ♂ i gles björkskog med *Salix*-snår, Td. $\frac{13}{7}$.

Acidalia fumata Steph. På sina ställen t. a. i B. och S. Även ovanför trädgränsen bland *Salix*-snår. Juli.

Psodos coracina Esp. Mkt. a. i A. Juli. Näst *Anthrocera exulans* den allmänna storfjärilen på fjällheden.

Pygmaena fusca Bsd. T. a. i A. Juli.

**Anaitis paludata* Thbg. T. a. på mossar, Ld., B. $\frac{21}{7}$ — $\frac{3}{8}$.

Gnophos sordaria Thunb. A. i B. och S. Ovanför trädgränsen t. a. kring mossar o. d. Till mitten av juli.

Lygris testata L. I ♂, I ♀ vid mosse, Ld., B. $\frac{3}{7}$. — *L. populata* L. 5 ♂♂ i björkskog, Ld., B. och S. $\frac{28}{7}$ — $\frac{3}{8}$.

**Cidaria sordidata* Fabr. I ♀ på mosse, Ld., B. $\frac{1}{8}$. — *C. albula* Schiff. Mkt. a. i B. och S. Den vanligaste mätaren; flög i mängder i björkskogen och över dess ängar. Flög även ovan trädgränsen till den egentliga fjällheden. Omkr. $\frac{1}{7}$ — $\frac{20}{7}$. — *C. luctuata* Hübn. 2 ♀♀, Td., S., i björkskog $\frac{7}{7}$. — *C. adaequata* Borkh. 2 ♀♀, 3 ♂♂, Td. och Gd., S. i björkskog $\frac{3}{7}$ — $\frac{10}{7}$. — *C. munitata* Hübn. A. i B. och S., i björkskog till omkr. $\frac{20}{7}$. — *C. montanata* Bork. A. i B. och S. i björkskog till omkr. $\frac{20}{7}$.

C. autumnata Bkh. T. a. i B. och S. i björkskog med mager veg. av enar, *Melampsyrum*, blåbär o. d. i juli. Huvudformen allmänt. Dessutom ab. såsom *schneideri* Lpa. och *coarctata* Nordstr. — *C. affinitata* Steph. M. a. i björkskog, $\frac{1}{7}$ — $\frac{15}{7}$. Även på fjällheden bland *Salix*- och *Betula nana*-buskage. — *C. hastata* L. M. a. i björkskog till slutet av juli. Ovan trädgränsen bland samma veg. som föreg. Förekom ovanligt sparsamt denna sommar. Ex. variera i storlek; de största äro dubbelt så stora som de minsta. 1 ♀ från Ts. tillhör huvudformen, de övriga var. (*C.*) *subhastata* Nolck. — *C. truncata* Hufn. 2 ♂♂, 2 ♀♀ på lockbete, Td., S. $\frac{15}{7}$. Den enda mätare, som besökte lockbete. — **C. variata* Schiff. 2 ♂♂, Ld., B. $\frac{1}{8}$ på mosse.

Arctia plantaginis L. M. a. på slätterängar i B. och S., $\frac{2}{6}$ — $\frac{20}{7}$. Alla ex. tillhör huvudformen; dock torde några närliggande sig var. *hospita* Schiff.

Anthrocera exulans Hochenw. Mkt. a. till slutet av juli. Allmänt i A., där den uppträdde i sådana mängder, att små »vallar» bildades på fjällsjöarnas stränder av enbart denna fjäril. *Var. vanadis* allmänna än huvudformen.

Hepialus humuli L. Mkt. a. i mitten av juli. — *H. fuscunebulosus* De Geer. Under några dagar, $\frac{3}{7}$ — $\frac{7}{7}$, mkt. a. på slätterängarna i Td., S. Stod ej att finna före eller efter denna tid utom i enstaka ex. — *H. hecta* L. T. a. i Td., S. omkr. mitten av juli.

Dessutom har flera ex. av *Pieris brassicae* iakttagits i Ts. i början av juni. I Ld. togs ett mycket slitet ex. av *Vanessa antiope* och larver till *Cossus cossus* och *Pygaera pigra*.

Vidare lämnas en förteckning över insamlade *Microlepidoptera*, vilka godhetsfullt bestämts av folkskollärares P. Benander.

Pineea decrepitalis H. S., *P. nebulalis* Hb., *P. inquinatalis* Z., *Catastia marginata* Schiff., *Salebria fusca* Hw., *Pyrausta purpuralis* L., *Crambus per tellus* Sc., *Cr. truncatellus* Zett., *Cr. margaritellus* Hb., *Cr. maculalis*, *Cr. dumetellus* Hb., *Cr. pratellus* L., *Scoparia sudetica* Z., *Cnepharia osseana* Sc., *Argyroploce sororculana* F., *A. bipunctana* F., *A. sauciana* Hb., *A. schultziana* F., *Phiaris metallicana* Hb., *Ph. nebulosana* Zett., *Epinotia mercuriana* Hb., *Tortrix forsterana* F., *Lipoptyla plumbagana* Tr., *Monopis rusticella* Hb., *Gelchia viduella* F., *G. lugubrella* F., *G. infernalis* H. S., *Leioptilus tephradactylus* Hb., *Platyptilia calodactyla* Schiff., *Phalcnia deutschiana* Zett., *Argyroploce palustrana* Z., *Epinotia ericetana* Hb.