

C. infuscata Tngstrm. $^{23}/_6$ 36 1 ex. i Syrholn. — *C. latefasciata* Stgr. $^{21}/_7$ 36 1 ex. i Syrholn. — *C. siterata* Hufn. $^{21}/_9$ 36 1 ex. på lampa i Syrholn och i september 37 flera ex. på lampa samma lokal. — *C. quadrifasciaria* Cl. $^{23}/_7$ 1 ex. och $^{24}/_7$ 36 1 ex. i Syrholn samt $^{8}/_7$ 37 1 ex. samma lokal. — *C. ferrugata* Cl. $^{21}/_6$ 35 i Syrholn och $^{22}/_6$ 35 vid Igelviken (Flosjön). — *C. unidentaria* Hw. $^{3}/_8$ 37 1 ex. på lampa i Syrholn. — *C. suffumata* Hb. $^{4}/_6$ och $^{8}/_6$ 36 i Syrholn. — *C. designata* Rott. $^{10}/_7$ 35 i Syrholn; juni 36 allmän samma lokal; $^{9}/_6$ 37 i Sälje. *C. albicillata* L. Juli 35, $^{22}/_6$ och $^{12}/_7$ 36 samt i juni 37 allmän i Syrholn; $^{11}/_6$ 36 i Sandvikens fäb. — *C. lugubrata* Stgr. $^{17}/_6$ 36 i Sandvikens fäb.; $^{21}/_6$ 37 2 ex. i Syrholn och $^{30}/_6$ 37 vid Stora Hälla (Flosjön). — *C. luteata* Schiff. $^{14}/_6$ 35 och $^{9}/_6$ 37 i Syrholn. — *C. otregiata* Metz. $^{4}/_7$ 35 och $^{9}/_6$ 37 i Syrholn. — *C. taeniata* Stph. Juli 35, $^{21}/_7$ 36 och $^{31}/_7$ — $^{33}/_7$ 37 i Syrholn samt $^{21}/_7$ 35 i Sandvikens fäb. — *C. firmata* Hb. $^{25}/_8$, $^{28}/_8$, $^{2}/_9$ 35 i Syrholn och $^{7}/_6$ 37 1 ex. samma lokal på lampa.

Euchoeca nebulata Scop. $^{1}/_7$, $^{8}/_7$ och $^{10}/_7$ 35 i Syrholn samt $^{9}/_7$ 35 vid Stora Hälla (Flosjön).

Eupithecia venosata F. $^{23}/_6$ 36 och $^{12}/_7$ 37 i Syrholn. — *E. assimilata* Dbld. $^{26}/_6$, $^{4}/_7$ och $^{11}/_7$ 35 i Syrholn. — *E. tantillaria* Bsd. $^{14}/_6$ 35, $^{6}/_6$ 36 och $^{1}/_6$ 37 vid Stora Hälla (Flosjön); $^{18}/_8$ 35 i Sandvikens fäb. och $^{17}/_6$ 35 och $^{31}/_5$ 36 i Syrholn. — *E. indigata* Hb. $^{20}/_5$ 35 och $^{18}/_5$ 36 i Syrholn; $^{19}/_5$ 36 vid Stora Hälla (Flosjön). — *E. hyperboreata* Stgr. $^{7}/_6$ 36 1 ex. vid Lillsundet (Flosjön). — *E. conterminata* Z. $^{22}/_5$ och $^{25}/_5$ 36 vid Stora Hälla (Flosjön).

Chloroclystis reclangulata L. $^{13}/_7$ och $^{31}/_7$ 36 i Syrholn. — *C. debiliata* Hb. $^{23}/_7$ 35, $^{13}/_7$ och $^{17}/_7$ 36 samt allmän i juli 1937 i Syrholn.

Ellophia prosapiaria L. $^{6}/_7$ 35 i Syrholn och $^{20}/_6$ 37 i Sandvikens fäb.

Erannis aurantiaria Esp. $^{29}/_9$ 35 i σ^7 i Syrholn. — *E. defoliaria* Cl. $^{5}/_{10}$ 36 1 ex. på lampa i Syrholn, σ^7 .

Biston betularia L. $^{23}/_8$ 36 larv på Salix på Harpikön i Flosjön; $^{16}/_6$ 37 i Syrholn och $^{2}/_7$ 37 från Mossel-Noret.

Boarmia cinctaria Schiff. $^{9}/_5$ 35 1 ex. på sälg i Syrholn och $^{12}/_5$ 36 1 ex. å samma lokal.

Lithosiidae.

Comacla senex Hb. Juli 1935 4 ex. å kärmark i Syrholn; $^{22}/_7$ 36 1 ex. å samma lokal samt juli 1937 3 ex. i Syrholn.

Cybosia mesomella L. $^{25}/_6$ 37 1 ex. i Syrholn.

Arctiidae.

Diaphora mendica Cl. $^{12}/_6$ 36 1 ex. vid Stora Hälla (Flosjön), sjöstrand.

Arctia caja L. $^{21}/_7$ 37 1 ex. på lyse i Syrholn. Sällsynt.

Anthroceridae.

Anthrocerus meliloti Esp. Juli 1936 3 ex. i Kläbergets fäb. och 1 ex. i Fagerbergets fäb.

Psychidae.

Acanthopsyche atra L. Maj 35 anträffades 3 puppkokonger å sten vid Stora Hälla (Flosjön). Den $^{26}/_5$ kläcktes två hanar och $^{29}/_5$ en hane. $^{29}/_5$ 36 anträffades en kokong å tallstam ut Ennäsmyra i Syrholn och $^{17}/_6$ en kokong i Sandvikens fäb. Den $^{24}/_5$ samma år infångades på blomsteräng å Harpikön i Flosjön en hane, som fladdrade i solskenet.

Canephora unicolor Hufn. Den $^{5}/_6$ 37 insamlades på stammen av en torr tall å blötmossen Hundbärsflyta vid Syrholn en puppkokong, varur ett σ^7 -ex. kläcktes den $^{12}/_6$. Kokongen fästad nära marken. Ny för Dalarna.

Talaeoporia borealis Wck. Juni 35 anträffades pergamentartad säck å ladvägg i Syrholm. Den $\frac{1}{6}$ kläcktes ett σ -ex. I maj 37 en säck å vägg vid Stora Hälla (Flosjön), varur $\frac{3}{6}$ kläcktes en hane. Den $\frac{1}{6}$ samma år en säck å tallstam vid Ennäsmyra i Syrholm. Ur denna kläcktes $\frac{1}{6}$ likaledes ett σ -ex. Den $\frac{2}{7}$ 37 påträffades en gammal säck å ladvägg i Löfbergets fabod. Ny för Dalarna.

I första delen av denna förteckning omnämnde jag, att *Colias palaeno* L. icke iakttagits av mig. Åren 1936 och 1937 har arten talrikt förekommit å vid Syrholm belägna mossar och myrar. *Vanessa antiopa* L. har sedan 1934 uppträtt mycket allmänt. En art, som rikligt förekommit i juni och förra hälften av juli 1937, är *Thyatira batis* L., varav jag insamlade ett 40-tal exemplar. Arten har tidigare förekommit mycket sparsamt. *Catocala fraxini* L. synes ej vara sällsynt under flygtiden. Arten har förutom å i förteckningen angivna lokaler infångats bl. a. i Sjurberg, Rättviks socken, den $\frac{13}{9}$ 36. I Nordström: »Våra Fjärilar» är den angiven från »Sk.—s. Dlr».

Av de av min broder Bo Tjeder (B. T.) insamlade i förteckningens första del omnämnda, då icke av mig anträffade arter, hava samtliga av mig numera anträffats med undantag av *Urbicola comma* L., *Epicnaptera ilicifolia* L., *Chamaepora euphorbiae* F., *Acidalia incanata* L. och *Lithosia lutarella* L., vilka synas vara sällsynta.