

en kokong med puppa i min hemtrakt i Floda (Dalarna). Jag har därefter härstädes sökt arten men icke återfunnit densamma förrän denna sommar å följande platser: d. $\frac{5}{4}$ en gammal kokong å tallstam vid Sivikberget; d. $\frac{13}{5}$ död parasiterad larv å tall vid Sångåns utlopp i Flosjön; d. $\frac{15}{5}$ gammal kokong vid Stampdammen, Sångån, samt d. $\frac{1}{8}$ kokong å samma plats och slutligen d. $\frac{25}{8}$ en larv å tallstam vid Idtjärn nära Ekfännbergets fäbod.

Holsåker i augusti 1938.

Tord Tjeder.

Rättelse. Då undertecknad läste P. Brincks och A. Ringdahls redogörelse i Ent. Tidsk. 1938, 1—2 häftet, för resultatet av en studieresa i Härjedalen, studsade jag inför namnet *Atheta* (*Thinobaena*) *vestita* Grav. (sid. 45). Denna uteslutande marina, fukofila art är ju otänkbar i Härjedalens fjälltrakter. Emellertid hade jag själv faktiskt bestämt ex., som fått detta felaktiga namn på lappen på grund av en fonetisk lapsus.

A. vestita har egendomligt nog förut en gång av misstag blivit upptagen bland våra fjälltrakters Coleoptera. I Ent. Tidskr. för 1910 nämner nämligen F. Eichelbaum (»Liste der von mir im Jahre 1910 in Schweden aufgefundenen Staphyliniden») *A. vestita* Grav. bland vid Abiskojokk funna Col. I detta fall får man antaga, att en förväxling ägt rum och att arten bör inräknas bland de under tång vid skånska kusten funna Col., vilka E. i samma uppsats omnämner.

Anton Fansson.

Euphyia corylata THUNB.

En ♀ funnen av mig på Blidö 1917 har mittfältet och rotfältet entonigt brungula, det senare med nästan rak färggräns; yttre och inre mellanfältens skuggningar av samma färgton. Torde kunna kallas ab. *brunnescens*.

D. Ljungdahl.