

Bidrag till kännedomen om flugfaunan (*Diptera Brachycera*) på Hallands Väderö.

Av

O. RINGDAHL.

De undersökningar över flugfaunan på Hallands Väderö, som framläggas i denna uppsats, grunda sig i synnerhet på insamlingar, gjorda under somrarna 1934, 1937 och 1939, då jag under några veckors tid bodde på ön och hade tillfälle att rätt bra lära känna öns insektsfauna. Dessutom har jag under årens lopp vid skilda tillfällen under kortvarigare besök gjort anteckningar över sedda dipterer.

Öns fattigdom på insekter är för entomologen iögonfallande, det må nu vara i bokskogen, blandskogen, alkärren eller annorstädes. Endast på havsstranden på ävja och strandäng kan insektlivet vara nog så rikt. Av insektsarter inom vissa grupper är dock individrikedom mycket stor. Överallt myllrar det av myror och måhända kan man häri se en orsak till många arters individfattigdom. Växtvärlden är visserligen mångenstädes yppig, men verkliga lövängar, som man finner dem på fastlandet, saknas. Bördig jord finnes ingenstädes, då jordmånen överallt är starkt sandblandad. Det närmast liggande fastlandet torde ej heller hysa någon rikare fauna.

Om sålunda art- och individfattigdomen är uppenbar inom många insektsgrupper, leva dock på ön många intressanta arter, som man emellertid ej under ett kortare dagsbesök lär känna. Hur häpen blev jag inte, då jag första gången fick se de stora skalbaggarna *Osmoderma eremita* och *Prionus coriarius* sitta på bokstammarna och *Gnorimus variabilis* belamrad med myror krypa fram ur en stubbe invid en myrstack. Dessa »baggar» äro hänvisade till gamla träd och komma kanhända inom en snar framtid på grund av den rationella skogsvården att dö ut. Den förstnämnda såg jag vid många tillfällen i Söndreskog både på bok och ek. Man märker ofta djuret på den balsaminliknande doften det utsöndrar, och ej sällan kunde man, vägledd av denna, få se den präktiga skalbaggen sitta på en stam, gärna vid hålet efter en avbruten gren. Även fyndet av en sällsynt knäppare, *Athous villosus*, är av intresse.

För att återgå till ordningen *Diptera* så har denna många intressanta representanter på ön, om vilka särskilt följande må framhållas. År 1913 fångade jag i Kulla Gunnarstors skog n. om Hälsingborg ett ex. av en stor för vetenskapen okänd *Phaonia*-art, som sedermera av anthomydkännaren Professor Stein erhöll namnet *setifemur*. Denna art eftersökte jag förgäves under många år tills år 1934, då jag till min stora glädje återfann den på Väderön och kunde insamla rätt många ex. på trädstammar i Söndreskog. Troligen försiggår denna arts utveckling i murket trä eller också hos fladdermöss. Jag fick nämligen vid ett tillfälle se honor av denna art och den ej sällsynta *querceti* Bouché springa omkring på en hög bokstubbe, där en stor koloni av *Vesperugo pipistrellus*, som är mycket allm. på ön, slagit sig ned. De kröpo som oftast ner i en spricka, sannolikt för att lägga sina ägg i fladdermös sens exkremtsamlingar. Av dolichopodidsläktet *Systenus* var hittills från vårt land endast känd *bipartitus* Loew. Märkligt nog fann jag på ön utom denna även tvenne andra arter av detta släkte, nämligen *pallipes* v. Ros och *leucurus* Loew, bågge alltså nykomlingar för vårt lands fauna. Larverna leva mest i murket trä, varför även dessa arter äro beroende av de gamla träden på ön. Den sällsynta syrphiden *Mallota cimbiciformis* uppenbarade sig under heta soliga dagar på rubusblommor. Arten ses mycket sällan och dess larver äro påträffade i ihåliga gamla träd. På blommande lind erhölls en hanne av *Tabanus miki* Brauner, en av våra sällsyntaste bromsar. På en stubbe i Söndreskog upptäcktes ett ex. av den sällsynta rhagioniden *Chrysopilus latus* ZETT., som förut endast var känd i ett ex. Bland undervegetationen i Nörreskog erhölls en för Sverige ny helomyzid, *Suillia variegata* LOEW. Om dessa och andra sällsyntare tvåvingar, som förekomma på ön, redogöres något närmare i slutet av uppsatsen.

Trots den förut framhållna fattigdomen på *Diptera* leva sålunda många sällsynta och intressanta arter på ön, men det tarvar omsorgsfulla undersökningar för att finna dem, då de flesta endast uppträda i fätaliga individ.

På ön har jag insamlat eller antecknat 644 arter av *Diptera Brachycera*. Självfallet förekomma där flera arter än dem jag lyckats påträffa. Ön har jag ej besökt på våren, och naturligtvis förekomma en del vårarter, som ej kommit med i förteckningen. Sälgen, som är sådana formers näringsväxt framför andra, är emellertid sällsynt på ön. Flera familjer ha också blivit mer eller mindre försummade, såsom *Phoridae*, *Chloropidae*, *Agromyzidae* m. fl. Trots ovannämnda brister är jag dock ganska övertygad om att artförteckningen skall lämna en ganska god bild av flugfaunans sammansättning.

En entomologisk undersökning borde naturligtvis beledsagas av en beskrivning av öns naturförhållanden. Då emellertid dessa i stora drag äro skildrade bl. a. i Johan Erikssons lilla orienterande bok om Hallands Väderö, vill jag därför hänvisa till denna. Botaniskt är ön myc-

ket väl känd, och såväl floristiska som omfattande ekologiska undersökningar äro där utförda. Enligt Lektor H. Vallins uppgift i Bot. Notiser för 1936 s. 530 äro närmare 600 fanerogamer och kärlkryptogamer påvisade för ön. Även fågelfaunan har blivit studerad (Bertil Hanström i Skånes Natur 1937: »Fåglarna på Hallands Väderö». Ett första inventeringsförsök samt Carin Eklundh i K. Vetenskapsakademiens Skrifter i Naturskyddsärenden: Kvalitativa och kvantitativa undersökningar av fågelfaunan på Hallands Väderö 1937). Några entomologiska publikationer från ön ha först under senaste året sett dagen. Över *Lepidoptera* och *Coleoptera* har sålunda Agne Ringdahl redogjort i Opuscula Entomologica 1939, s. 170—184.

Om öns naturförhållanden vill jag som sagt hänvisa till förefintlig litteratur och särskilt till ovannämnda arbeten. Några kortare upplysningar om vegetation m. m. har jag likväld ansett att även här bör lämnas.

Ön är 3 km. lång, har en yta av c:a 3 kvkm. och skiljes från fastlandet genom ett 3 km. brett sund. Det största skogspartiet, Söndreskog, är inhägnat med gärdesgård och härigenom skyddat för skadegörelse av de många kor och hästar, som sommartid beta på ön. Skogen består av bok, ek, björk, al, rönn samt enstaka lindar och några andra trädslag. Barrskog är inplanterad på flera ställen. Riklig undervegetation av buskar och örter, såsom *Rhamnus*, *Crataegus*, *Corylus*, *Rubus*, *Rosa*, *Lonicera periclymenum*, *Sambucus nigra*, *Stachys silvatica*, *Spiraea ulmaria*, nässlor, gräs, ormbunkar m. m. Norra skogspartiet eller Nörreskog är mera söndersprängt än det södra men är på sina ställen synnerligen omväxlande och fagert. Lövträden äro desamma men med fler lindar. Små aspbestånd finnas här och var på ön.

I de egendomliga alkärren med sin nästan tropiska vegetation av höga ormbunkar är luften under varma sommardagar nästan drivhuslik. Av insekter ses där ej mycket, och det är mest harkrankar man skrämmar upp, då man tränger sig fram därinne.

Stora delar av ön, särskilt i väster och norr, upptagas av enmarker, omväxlande med gräsmark och Juncuskärr.

Endast smärre vattensamlingar finns, och dessa kunna under torra somrar så gott som helt uttorka. De viktigaste äro Hälledammen i Söndreskog och Oakärret eller Uvkärret mitt på ön. Det förra, vackert inramat av ek, björk, brakved och sälg — sparsamt på ön — är till största delen igenvuxet av i bälten växande *Carex* och *Scirpus*. I Carexbältet växer rikligt med *Lysimachia vulgaris* och *Lythrum salicaria* (båda f. ö. mycket allmänna på ön). Hälledammen torde väl vara ungefär 100 m. lång och 50 m. bred. Oakärret på öns smala mittparti ligger öppet, är särskilt i sin södra del bevuxet med små träd eller buskar av al, björk, brakved, björnbär och några få sälgbuskar, vilka årligen brukar vara angripna av bladlöss, som locka till sig flugor av skilda slag. Kärret är f. ö. igenvuxet av *Carex*, *Juncus*, *Eriophorum*

Scirpus, *Comarum*, *Sparganium*, *Potamogeton natans*, *Iris* m. fl. Det är måhända ett par hundra meter långt och c:a 75 m. brett. Kärrmarker och små vattensamlingar finns dessutom i alkärren, i sänkor både i enområdet och längs stranden.

I bukter, där ävjan ligger tung och jäsande, trives en mycket kraftig örvegetation. Vid en dylig ävjebukt strax söder om Sandhamn noterade jag följande växter, som växte i större och mindre samlingar: *Scirpus maritimus*, *Rumex maritimus*, *Polygonum lapatifolium*, *Atriplex*, *Matricaria inodora*, *Bidens tripartita*, *Lythrum*, *Lycopus* och *Urtica*. Längst inne på gränsen till alkärret ett 10-tal ex. av *Angelica silvestris* (av förf. endast sedd på denna lokal, då däremot *A. litoralis* är ymnig på flera ställen i den steniga strandängen), *Iris pseudacorus* samt snår av hallon, slån och björnbärsbuskar.

Björnbärsbuskarna böra måhända särskilt omnämñas, då jag på deras blad och blommor infångat en mycket stor del av öns *Diptera*. Särskilt givande voro vissa buskar av *Rubus radula* i Söndreskog på vilka det fanns honungsdagg. Att få tag på de insekter som röra sig på dessa buskar är ej alltid så lätt för de vassa taggarnas skull, och ytterst försiktigt får man gå tillväga, om ej håven inom kort skall bli söndertrasad. Man skulle kunna säga att största delen av ön är genomvävd av Rubussnår. Även inne i skogen krypa de förrädiska revorna omkring och hindra hävning i vegetationen. Man finner dem så gott som överallt, på öppna marker, som bärder vid skogskanten, inne i alkärrens dunkel, i klippskrevor o. s. v. De vanligaste svartfruktiga Rubusarterna på ön äro *plicatus*, *lindebergi*, *radula*, *scanicus* och *insularis*.

Det största sandområdet finns i öster längs St. Sandhamnsbukten. Psammabältet här är väl ett par hundra meter långt men endast 5—7 m. brett. Det är tämligen rent, inblandat endast med spridda ex. av ett antal örter, såsom *Atriplex*, *Matricaria*, *Cakile*, *Crambe*, *Hieracium umbellatum*, *Solidago*, *Cirsium lanceolatum*, *Conium* m. fl. Gräsbevuxna sandmarker finns på öns mittparti, i norra delen samt vid Kapellhamn. På dessa sandmarker äro insektblommor sparsamma. Sandområdena äro dock av för ringa omfattning för att något större antal specifika sandinsekter där kunna väntas bli påträffade.

Skären kring ön sakna träd och buskar, och den örvegetation som finns är väl i stort sett densamma som den steniga stranden på ön har att uppvisa. På Orskär, klippan med den väldiga gråtrutskolonien, växer t. o. m. ett litet bestånd av vass. Till dessa skär lockas också på grund av trutarnas träck och döda fåglar såväl coprophaga som necrophaga insekter.

På grund av öns ringa utsträckning sprida sig många insekter med lätthet omkring och uppträda ofta i sådan omgivning, där de rättelegligen ej höra hemma. Så ser man ofta fångflugor i mängd inne på ön t. ex. på blr eller på växter med bladlöss. Ett studium av de olika biotopernas insekter vore naturligtvis av stort intresse. Detta har

jag ej medhunnit, men jag har sammanfört ett flertal arter i ekologiska grupper.

Väderön har sedan gammalt lovprisats för sin egenartade naturskönhet och detta med rätta. Alla som besökt ön en vacker sommardag ha säkerligen det angenämaste minne av vistelsen där ute. Förr i tiden var väl de besökandes antal ej så stort, men nu, sedan Torekov tack vare ön blivit en mycket känd badort, besökes ön varje sommar av ett stort antal människor. Man må också hoppas att denna pärla bland öar i all framtid måtte bli bevarad och ej vandaliserad genom bebyggelse eller annan förstörelse av naturen.

Artförteckning:

Förkortning: S (Söndreskog), N (Nöreskog), O (Oakärret, Oet), H (Hälledammen), U (Ulagapet), Sh (Sandhamn), E (enmarkernas område).

Stratiomyidae.

Geosargus irridatus Scop. S på blad. — *G. flavipes* Meig. S på blad och på eksav, O på Salix med bladlöss.

Chloromyia formosa Scop. På rubusblad, juli.

Microchrysa flavicornis Meig. O på Salix.

Tabanidae.

Therioplectes tropicus Panz. S enstaka kringflygande honor, juni. — *T. solstitialis* Schin. 1 ex. kringflygande i E $\frac{14}{7}$.

Tabanus bovinus L. 1 ex. kringflygande vid stranden $\frac{20}{7}$. — *T. miki* Brauer 1 hanne på lindblommor vid Sh $\frac{14}{7}$. — *T. bromius* L. 1 ex. inomhus på fönsterruta $\frac{21}{7}$.

Chrysazona pluvialis L. Ej sälls.

Chrysops quadratus Meig. 1 ex. på fönsterruta inomhus $\frac{24}{6}$.

Rhagionidae.

Rhago lineola Fabr. Ej sälls. på blad juli, aug. — *R. scolopacea* L. S på trädstammar, ej allm. juni.

Chrysopilus leta Zett. 2 ex. på bokstubbe i S, aug.

Symporomyia crassicornis Panz. 1 ex. på rubusblad i S, juli.

Ptiolina obscura Fall. 1 ex. på bokstubbe i S, $\frac{30}{6}$.

Asilidae.

Gonyptes guttiventris Zett. S och N på gräs i skogsbryn, juli, aug. — *G. cylindrica* Deg. bland gräs på klippor, juni.

Dioctria flavipes Meig. S i skogsglänta på gräs och blad, juli, aug.

Lasiopogon cinctus Fabr. S på gårdesgård och i glänta, början av juni.

Philonicus albiceps Meig. Gårdesgård vid sandig åker, juli, aug.

Machimus atricapillus Fall. S på bokstammar (nykläckta ex.), f. ö. ganska allm. på blad, juli—sept.

Neoitamus cyanurus Loew. S ej sälls. på bokstammar, slutet av juni, juli.

Bombyliidae.

Anthrax paniscus Rossi. Ofta sedd på sandmarker, 1 ex. på ekblad på klipp-häll, juni, juli.

Phthiria pulicaria Mikn. Sh på sandmark, juni, juli.

Therevidae.

Thereva nobilitata Fabr. E, juni, juli. — *T. plebeja* L. S på rubus- och sambucus-blad, juni, juli. — *T. circumscripta* Loew. Som föreg. juli. — *T. subfasciata* Schumm. S på fläderblad, E juli. — *T. bipunctata* Meig. Äng vi U, 1 ex. på rubusblad, juli. — *T. annulata* Fabr. Ej sälls. på sandmarkerna, juni, juli.

Empididae.

Noeza femorata Müll. Ej sälls. på blad juli, aug. — *N. culiciformis* Fabr. Som föreg.

Bicellaria nigra Meig. S på blad juli.

Rhamphomyia maculipennis Zett. E, kretsande över vattensamling i ett Juncuskärr, på Anthriscusblr vid Sh, juni. — *R. tibiella* Zett. 1 ex. på blad i S, juni. — *R. dentipes* Zett. Ett ex. på blad i N, juni. — *R. gibba* Fall. 1 ex. i H, aug. — *R. taridata* Meig. Hannar kretsande under fläderbuske i kanten av S, ^{19/6}. — *Empis aestiva* Loew. H, juli. — *E. prodromus* Loew 2 ex. på Anthriscus ^{1/6}. — *E. maculipes* ZETT. Ej sälls. på Anthriscus vid Sh, juni. — *E. livida* L. U-ängen, juli. — *E. tessellata* Fabr. Allm. på hagtorns-, hallon- och björnbärnsblr, juni. — *E. stercorea* L. 1 ex. i S, juni. — *E. univittata* Loew 1 ex. på blad i S, juni.

Hilara maura Fabr. Kretsande ovan havsvattnet vid stranden, N på blad, juni. — *H. interstincta* Fall. 1 ex. på blad i S, juni. — *H. discoidalis* Lundb. H, S, juli. — *H. lundbecki* Frey. 2 ex. på Anthriscus vid Sh. — *H. cornicula* Loew. 1 ex. på rubusblad i S, juli. — *H. gallica* Meig. 1 ex. på blad i N, ^{1/6}. — *Trichina clavipes* Meig. 1 ex. på blad i S, juni. — *Oedalea stigmatella* Zett. S på blad, juli. — *Ocydromya glabricula* Fall. S på blad, juli.

Leptopeza flavipes Meig. S på blad, juni. — *L. sphenoptera* Loew. 1 ex. på blad i S, ^{26/6}.

Phyllodromia melanocephala Fabr. U, N, juli på blad.

Trichopeza longicornis Meig. S på blad, juli.

Lepidomyia melanocephala Fabr. På blad i U och N, juli.

Phyllodromia vocatoria Fall. U på blad, juli.

Stilpon graminum Fall. H, juni.

Tachypeza nubila Meig. Allm. på trädstammar i S, juni, juli.

Tachista arrogans L. På trädstammar i S, juli.

Elaphropeza ephippiata Fall. Bland skuggig örтvegetation i N, juli.

Chersodromia difficilis Lundb. Allm. på fuktig sandstrand vid Kapellhamns-bukten, juli.

Coryneta ciliaris Fall. På blad i U och N, juli. — *C. pectoralis* Fall. — U, S på bad, juli. — *C. lutea* Meig. På blad i S, juli. — *C. albocapillata* Fall. På blad i S, juli.

Dolichopodidae.

Sciapus platypterus Fabr. På stammar i S, ej sälls., juni, juli. — *S. wiedemannii* Fall. E på gärdesgård, på rubusblad i S, juli. — *S. contristans* Wied. På sandiga ställen vid Sh och Kapellhamn, ej allm., juni, juli.

Neurogona pallida Fall. S på bokstammar, ej allm., juni, juli. — *N. erichsoni* Zett. Säls. på bokstammar i S, 1 ex. på lönnblad i S, juni, juli. — *N. quadri-fasciata* Fall. Allm. på trädstammar i S, N och U, juni, juli. — *N. suturalis* Fall. På en ekstam vid Kapellhamn ^{24/6}.

Hygrocoleuthus latipennis Fall. Allm. på ävja i U-bukten samt på strandäng, juni—aug. — *H. diadema* Hal. Allm. på ävja som föreg. samt funnen vid H, juli.

Dolichopus lepidus Stæg. H juli. — *D. atripes* Meig. U-bukten på ävja samt i O, juli. — *D. vitripennis* Meig. H, U-ängen, juli—aug. — *D. clavipes* Hal. Orskär ^{13/7}. — *D. claviger* Stann. På rubusblad i S, på bladlusad Salix vid O samt i U, juni, juli. — *D. nigricornis* Meig. U-ängen, N, E, juli. — *D. migrans* Zett. 1 ex. på eksav i S. — *D. plumipes* Scop. Allm. även på ävja, juli—aug. — *D. wahlbergi* Zett. På rubusblad i S och N, ej säls, juli, aug. — *D. pennatus* Meig. U-bukten på ävja, U-ängen, juli. — *D. popularis* Wied. S, N, U på blad, juni, juli. — *D. nitidus* Fall. Allm. på rubusblad i S samt i H, O och U-ängen, juli. — *D. nubilus* Meig. U-bukten på ävja, allm. på strandäng, juli, aug. — *D. sabinus* Hal. U-ängen ^{22/7}. — *D. signifer* Hal. Orskär, juli, 1 ex. på rubusblad i S. — *D. simplex* Meig. H, U-ängen. — *D. unguilatus* L. Allm. på ävja vid U, juli.

Hercostomus fulvicaudis Walk. N bland skuggig örtevegetation säls., juli. — *H. nigrilamellatus* Macq. Ej säls. på rubusblad i S, även sedd på bokstubar och stammar, slutet av juni. — *H. nigripennis* Fall. 1 ex. på rubusblad i S samt flera ex. på blad av *Potentilla reptans* i E, juli. — *H. cupreus* Fall. S bland örtevegetation, juni. — *H. ærosus* Fall. U-bukten på ävja, juli. — *H. metallicus* Stann. Mycket allm. särskilt i H, juni, juli. — *H. angustifrons* Stæg. S och H, juni, juli.

Poecilobothrus nobilitatus L. U-bukten på ävja, allm., även allm. på många andra lokaliteter ej minst på rubusblad, juni—aug.

Chrysotus gramineus Fall. U-ängen, juli. — *C. pulchellus* Kow. H, juli. — *C. cupreus* Macq. 1 ex. på blad i S, juli.

Argyra leucocephala Meig. 1 ex. på blad i N, ej säls. på fuktig stig i S, slutet av juni—aug. — *A. diaphana* Fabr. Flera ex. på rubusblad i S, slutet av juni, juli. — *A. magnicornis* Zett. Honor ej sälssynta på rubusblad i S. 1 hanne på bladlusad fläder i S, juli.

Rhaphium longicorne Fall. 1 ex. i O ^{6/6}.

Porphyrops elegantula Meig. H, juni—aug. — *P. consobrina* Zett. U på stenar vid stranden, allm. på dy vid Kapellhamnsbukten. — *P. communis* Meig. 1 ex. på rubusblad i S ^{26/6}.

Syntormon pallipes Fabr. U-ängen samt strandängar, aug. — *S. tarsatus* Fall. U på ävja, juli.

Xiphandrium fasciatum Meig. H, aug.

Systemus bipartitus Loew. 1 ex. på bokstam i S ^{27/7}. — *S. pallipes* v. Ros. 1 ex. som föreg. — *S. leucurus* Loew. 1 ex. som föreg. ^{10/7}.

Achalcus flavicollis Meig. 1 ex. i N bland örtevegetation ^{24/7}.

Thrypticus bellus Loew. Orskär, 1 ex. ^{18/7}.

Medetera diadema L. På gärdesgård i E. — *M. jacula* Fall. På trädstammar och gärdesgårdar, allm., juni, juli. — *M. apicalis* Zett. Ej säls. på trädstammar i S, juni, juli. — *M. muralis* Meig. S på gärdesgård samt på klipphällar.

Hydrophorus balticus Meig. U-bukten på ävja, juli. — *H. præcox* Meig. I vattenhålor på strandängar, Kapellhamnsbukten, juli, aug. — *H. bipunctatus* Lehm. U-ängen samt på ävja, H juli, aug.

Campsicnemus scambus Fall. H, U på ävja, juli, aug. — *C. curvipes* Fall. U på ävja, juli. — *C. armatus* Zett. Allm. på strandäng, U på ävja, Orskär, juli, aug. — *C. compeditus* Loew, 1 ex. i O ^{6/6}.

Sympycnus annulipes Meig. Allm. på strandäng, juni—aug.

Xanthochlorus tenellus Wied. På örtevegetation i U, juli. — *X. ornatus* Hal. Som föreg. U, N, S juli.

Schoenophilus versutus Walk. E i kärr ^{6/7}.

Musidoridae.

Musidora tristis Meig. Allm. på skuggiga ställen — *M. lutea* Panz. Ej sälls. på liknande ställen.

Syrphidae.

Paragus tibialis Fall. På rubusblad i S, juli.

Pipiza lugubris Fabr. På rubusblr i S, på Angelica i Sh, juli.

Pipizella virens Fabr. H, juli.

Cnemodon vitripennis Meig. 1 ex. i S, juni.

Orthoneura nobilis Fall. 1 ex. på rubusblad i S, juni.

Liogaster metallina Fabr. U-ängen, aug.

Chrysogaster chalybeata Meig. På Angelicabl vid Sh, juli.

Chilosia pagana Meig. E på kärrmark, 1 ex. på blad i S, juli. — *C. variabilis* Panz. 1 ex. på Anthriscusblr vid Sh, juni. — *C. mutabilis* Fall. Ej sälls. på rubusblad i S, juli.

Platychirus immarginatus Zett. 1 ex. på ekblad, juli. — *P. manicatus* Meig. E, juli. — *P. scutatus* Meig. 1 ex. i S på rubusblad, juli. — *P. albimanus* Fabr. H, juli. — *P. clypeatus* Meig. Ej sälls. vid H, aug. — *P. tarsalis* Schumm. 1 ex. i S $\frac{6}{6}$.

Pyrophæna rosarum Fabr. På rubusblad i S, juli. — *P. granditarsa* Forst. H, juni, juli.

Melanostoma scalare Fabr. H samt på strandäng, juli, aug. *M. mellinum* L. på strandäng, aug.

Leucozona lucorum L. 1 ex. i S, slutet av maj.

Didea alneti Fall. På rubusblad i S, juni, juli. — *D. fasciata* Macq. 1 ex. på Sedum telephiumblr, aug. — *D. intermedia* Loew. 1 ex. på rubusblad i S, 1 ex. på Sedumblr, juli, aug.

Lasiophthicus pyrastri L. På rubusblad, ljung- och hundkäxblr, juni—aug. — *L. sceleniticus* Meig. På ljungblr i E, aug.

Syrphus tricinctus Fall. 1 ex. vid O på Salix. — *S. venustus* Meig. E, juni, juli. — *S. torvus* O. S. På blad i S, juni. — *S. lineola* Zett. På rubusblad i S. — *S. ribesii* L. allm. i S, juni, juli. — *S. nitidicollis* Meig. På hagtornsblr vid Sh samt på blad i S, juni. — *S. nitens* Zett. På rönnblr vid Sh $\frac{1}{2}$ samt på rubusblad i S $\frac{1}{2}$. — *S. arcuatus* Fall. 1 ex. på Leontodonblr i S, aug. — *S. corolla* Fabr. Allm., E på ljungblr, på rubusblad, H, Orskär, juli, aug. — *S. luniger* Meig. 1 ex. på ekblad, E på ljungblr, S på rönn- och lindblr, juni, juli. — *S. bifasciatus* Fabr. På rönnblr i S, på hagtornsblr i Sh, juni. — *S. balteatus* Deg. H, Orskär, juli, aug., ej sälls. — *S. cinctellus* Zett. På rubusblr i S, juli. — *S. euchromus* Kow. 1 ex. på rönnblr vid Sh $\frac{1}{2}$. — *S. umbellatarum* Fabr. 1 ex. på rubusblad i S, aug.

Sphaerophoria scripta L. Ej sälls., H, aug.

Baccha elongata L. Ej sälls. på blad i S, slutet av juni, juli.

Doros conopeus Fabr. 1 ex. på rubusblad i S, 1 ex. på furubarr vid Sh, slutet av juni.

Neoascia floralis Fall. — H, juli. — *N. podagriva* Fabr. Allm. juli, aug.

Rhingia campestris Meig. 1 ex. på rubusblad i S, även på blr såsom *Stachys silvatica* och *palustris*, aug.

Volucella pellucens L. Flera ex. sedda på rubusblr och kretsande i luften, slutet av juni—aug. — *V. inanis* L. 1 ex. på rubusblr i S, juli. — *V. bombylans* L. var. *typica* och *plumata*. Ej sälls. på rubusblr i S, slutet på juni och början på juli.

Eristalis œneus Scop. Allm. Kring huset, där jag bodde, flög arten under soliga dagar som ett bi med tonande ljud utmed väggarna, kröp emellanåt in i brädernas knasthål eller flög in i rummen, då fönstren stodo öppna. Den tar sig på hösten i stora mängder in i rummen och massor av döda ex. tillsammans med sådana av *Pollenia rudis* kan på våren sopas bort från golv och fönsterkarmar. —

E. sepulcralis L. Mycket allm. över hela ön och troligen den vanligaste större flugan där. Synnerligen allmän är den på ävjan, där den ger sig till känna genom ett fint ljudande surr. — *E. intricarius* L. Ej sälls., ses ofta kretsande i luften, dessutom på blad och diverse blr, juni—aug. — *E. tenax* L. Mycket allm. såsom på Solidagoblr. De första ex. visade sig 1939 redan i slutet av juni. — *E. antophorinus* Fall. 1 ex. på rubusblr vid Sh ^{19/6}. — *E. arbustorum* L. På rubusblr i S, juni, juli. — *E. horticola* Deg. Allm. på rubusblr och rönnblr i S och Sh, juni, juli, i aug. allm. på *Sedum telephium* och *Calluna*. — *E. rupium* Fabr. På ljung, aug.

Tubifera pendula L. Allm. på olika slags blr, juni—aug. — *T. hybrida* Loew. Ej sälls. på rubusblr i S, på *Lythrum*- och *Stachys palustris* blr i ävjebukten vid Sh, f. ö. sedd på rönn- och lindblr, juni—aug. — *T. affinis* Wahlb. 1 ex. på rubusblr i S ^{19/6}. — *T. trivittata* Fabr. Ej sälls. vid vattensamlingar i strandängarna samt på olika slags blr, juli. — *T. lineata* Fabr. 1 ex. på *Lythrum* blr vid Sh, juli.

Myiatropa florea L. Allm. i S på blad och rubusblr, juni, juli.

Mallota cimbiciformis Fall. Sälls. men flera ex. erhållna på rubusblr i S, slutet av juni, 1 ex. på lindblr ^{15/7}.

Tropidia scita Harr. 1 ex. på rubusblr i S, slutet av juni.

Criorrhina asilica Fall. 2 ex. på hagtorntbl i S samt flera ex. på *Rubus idaeus* och *plicatus*, slutet av juni. — *C. berberina* Fabr. 1 ex. på *Rhamnus* blr i S, 1 ex. på rubusblr samt 1 ex. vid basen av en bok, slutet av juni.

Zelima segnis L. På blad i S och N, juli, aug. — *Z. abiens* Wied. På lindblr i S samt på rubusblad, juli. — *Z. lenta* Meig. Flera ex. på rubusblr i S, 1 ex. på trädstam, slutet på juni. — *Z. sylvarum* L. Flera ex. på blad och bokstubbar i S, juni—aug.

Syritta pipiens L. Allm., juni.

Eumerus ?flavitarvis Zett. 1 ex. på rubusblad i S, ^{6/7}.

Ferdinandea cuprea Scop. Enstaka ex. på trädstammar i S.

Cinxia borealis L. 1 ex. på *Anthriscus* blr vid Sh ^{1/6}.

Temnostoma vespiforme L. Ej sälls. i S i slutet av juni och början av juli på rubusblr. Denna art såg jag ej till på ön förrän sommaren 1939. Det är anmärkningsvärt, vad denna stora vackra art påminner om en geting, särskilt under flykten. Den håller då de svarta frambenen framåtsträckta, vilket gör, att dessa komma att likna getingens antenner.

Chrysotoxum bicinctum L. På blad i skogsbyrnen, 1 ex. på *Anthriscus* blr, juli. — *C. caustum* Harr. På *Anthriscus*- och *Crataegus* blr vid Sh, juni. — *C. festivum* L. 1 ex. på *Stachys* blr i S, juli.

Doriladidae.

Dorilas thomsoni Beck. På blad i S, juni, juli. — *D. zonatus* Zett. 1 ex. på blad i S, juni. — *D. fuscipes* Zett. 2 ex. på blad i S, juni. — *D. terminalis* Thoms. 2 ex. på blad i S, juli.

Verrallia aucta Fall. Ej ovanlig på blad i S, juli. — *V. pilosa* Zett. S på blad, juni.

Chalarus spurius Fall. Allm. på blad i S, juni.

Phoridae.

Dohrniphora crassicornis Meig. På blad i S, juli.

Aphiochæta picta Lehm. E, N, juli. — *A. ?ruficornis* Meig. N, juli.

Platypezidae.

Callimyia amoena Meig. På blad i S, juni, juli.

Larvaevoridae.

- Gastrophilus equi* Clark. Ej sälls. kring hästar. E $\frac{3}{8}$.
- Allophora pusilla* Meig. 1 ex. på rubusblad i S, juli.
- Rhodogyne rotundata* L. På Pimpinellablr i E på norra och östra delen av ön, flera ex.
- Ocyptera interrupta* Meig. Glänta i S bland gräs, $\frac{17}{7}$.
- Lophosia fasciata* Meig. På lindblr och rubusblad i S, juli.
- Graphogaster fasciata* Macq. 1 ex. på sandmark vid Sh, $\frac{6}{6}$.
- Pollenia rudis* Fabr. På gärdesgård, juli. Se anm. under *Eristalis œneus*.
- Lucilia sericata* Meig. E, juli, allm. på Orskär $\frac{19}{7}$. — *L. simulatrix* Pand. Gärdesgård i E, juli, allm. på Orskär $\frac{19}{7}$. — *L. flavipennis* Kram. Flera ex. på blad i S, juli. — *L. cæsar* L. På blad i S, juli.
- Calliphora erythrocephala* Meig. Allm., även på Orskär. — *C. vomitoria* L. 1 ex. på liksvamp i S, juli, även enstaka ex. på andra lokaler men synes vara rätt sälls. på ön.
- Acrophaga subalpina* Ringd. 1 ex. på blad i S $\frac{20}{7}$.
- Onesia sepulcralis* Meig. E, aug. — *O. aculeata* Pand. Allm. i E, på rubusblad i S, juni—aug. — *O. biseta* Villen. På rubusblad i S, juli.
- Phormia azurea* Fall. (*groenlandica* Zett.). 1 ex. på husvägg, flera ex. på telefonstolpar i E, juli.
- Cynomyia mortuorum* L. Flerstädes, även på Orskär, juni, juli.
- Sarcophaga striata* Fabr. (*hematodes* Meig). Allm. på torra ställen, juli. — *S. sinuata* Meig. E, H, juli, aug. — *S. melanura* Meig. E, juni, juli. — *S. incisibata* Pand. På gärdesgårdar, aug. — *S. aratrix* Pand. 1 ex. på blad i S $\frac{21}{7}$. — *S. teretirostris* Pand. 2 ex. på blad i S, juli. — *S. tuberosa* Pand. 1 ex. i E, 1 ex. på blad i S, juli. — *S. scoparia* Pand. S, aug. — *S. carnaria* (L.) Meig. Allm., juni—aug., även på Orskär. — *S. vicina* Villen. 1 ex. på blad i N, aug. — *S. haemorrhoa* Meig. 1 ex. i E, aug. — *S. frenata* Pand. var. *cruentata* Pand. Ej sälls. i E och S, juni—aug.
- Angiometa ruralis* Fall. 1 ex. på en sten i S, även sedd i E, juni.
- Sarcophila latifrons* Fall. E på gärdesgård, Sh på ett harskelett, juli.
- Brachycoma devia* Fall. På fristående träd vid Sh, ej sälls., juli.
- Miltogramma punctatum* Meig. 1 ex. på klipphäll, på ljungblr i E, aug.
- Metopia campestris* Fall. På rubusblad i S, juli. — *M. leucocephala* Rossi. 1 ex. sett på blad i skogsplantan av N, juni.
- Sphecapate conica* Fall. Sandmark, allm. vid Sh, juni, juli.
- Macronychia polyodon* Meig. S 1 ex. på fläder med bladlöss, juli.
- Ptychoneura rufitarsis* Meig. O på Salix, juli. — *P. cylindrica* Fall. På rubusblad i S, juli.
- Macquartia dispar* Fall. Sh $\frac{6}{6}$. — *M. tenebricosa* Meig. O $\frac{6}{6}$.
- Plesina maculata* Fall. Enstaka på blad och trädstammar i S, juli.
- Frauenfeldia rubricosa* Meig. Allm. i olikartade biocoenoser, även på hällmarkerna, dessutom sedd på stenar vid själva havsstranden, där vid ett tillfälle ett 20-tal individ uppehöll sig på fägelträck, juni, juli.
- Cinochira atrata* Zett. 1 ex. på blad i N, aug.
- Dexia vacua* Fall. 2 ex. på blad i S, aug. — *D. rustica* Fabr. O på Salix, S på lindblr och rubusblad, enstaka, juli.
- Dexiosoma caninum* Fabr. Allm. nästan överallt i skogen på blad av buskar och örter, juli—aug.
- Dinera griseescens* Fall. På sandig åker, juli.
- Meigenia mutabilis* Fall. På blad i skogsbrun, juni.
- Viviania cinerea* Fall. 2 ex. på blad i S, juli.
- Monochæta albicans* Fall. På blad i S $\frac{6}{6}$.
- Exorista westermanni* Zett. 1 ex. på rubusblad i S, juli. — *E. fimbriata* Meig. 2 ex. på bladlusangripen Solidago, juli. — *E. mitis* Meig. 1 ex. på lindblr i S, juli. — *E. confinis* Fall. 1 ex. på ekblad på hällmark, juli.

Nemorilla floralis Fall. Allm. i E och på sandig mark, enstaka vid O på Salix juli—aug.

Phryxe vulgaris Fall. Ej sälls. på blad, juli. — *P. nemea* Meig. 1 ex. på ekblad på hållmark $\frac{8}{8}$.

Erycia aurulenta Meig. 1 ex. på fläder i S $\frac{9}{7}$. — *E. vicina* Zett. 1 ex. på rubusblad i S, juni.

Phorocera cæsifrons Macq. Enstaka ex. på trädstammar i S början av juni. *Parasetigena media* Rond. 1 ex. på blad i S $\frac{24}{6}$.

Campylochæta inepta Meig. 1 ex. på blad i S, juli.

Erynnia ocypterata Fall. (*nitida* R. D.) Enstaka ex. på sandmark i E, 2 ex. på rubusblad i S, juli—aug.

Carcelia gnava Meig. 1 ex. på ekblad på hållmark, enstaka ex. på rubusblad i S, juli—aug.

Rhacodineura flavipes Fall. (*antiqua* Meig.) Enstaka på blad i S, juli.

Lydina ænea Meig. På ljungblr i E, 1 ex. på bokstam i S, 1 ex. på *Anthriscus* vid Sh, juni—aug.

Micropalpus vulpinus Fall. 1 ex. på ljungblr i E, 1 ex. på rubusblr i S, juni, aug.

Loewia foeda Meig. 1 ex. på bokstubbbe i S $\frac{10}{8}$.

Echinomyia grossa L. 1 ex. på ljungblr i E, aug.

Peleteria nigricornis Meig. 2 ex. på strandklippor, 1 ex. i E, juni, aug.

Atractochæta angustata Zett. 1 ex. bland Psamma vid Sh, juli.

Admontia amica Meig. Enstaka ex. på rubusblad och trädstam i S, juni, juli.

Trichoparia decorata Zett. 1 ex. på bokstam, 1 ex. på rubusblad i S, juli.

Digonochæta setipennis Fall. På förtorkat träd vid Sh, allm. på gärdesgård vid Kapellhamnen, även funnen på husvägg samt på fönsterrutor inomhus, juni, juli.

Craspedothrix zonella Zett. 2 ex. på fönsterruta inomhus, $\frac{15}{8}$.

Actia pilipennis Fall. 1 ex. på rubusblad i S $\frac{14}{7}$. — *A. infantula* Zett. 1 ex. på blr av Angelica silvestris vid Sh $\frac{24}{7}$. — *A. nigroscutellata* Villen. 2 ex. i E, 1 ex. på blad i S, juli.

Bucentes flavifrons Stæg. Allm. på *Oenanthe* i H, juli. 1 ex. på blad i N, juli, aug.

Voria trepida Meig. Enstaka ex. på blad och lindblr i S, 1 ex. på *Solidago* med bladlöss, juli, aug. — *V. ruralis* Fall. O på Salix, på blad vid Sh, aug.

Ernestia connivens Zett. Ej sälls. i S på rubusblad, juli. — *E. radicum* L. På ljungblr i E, aug. — *E. rufis* Fall. Flera ex. i S på blad, juni.

Aphria longirostris Meig. 1 ex. på sandmark vid Sh $\frac{18}{7}$.

Eriothrix rufomaculatus Deg. Allm. på gräsmark på *Achillea millefolium*, slutet av juli, aug.

Wagneria nigrans Meig. Enstaka ex. på gärdesgård och sandig mark vid Sh, juni, juli.

Thelaira nigripes Fabr. Ej sälls. på blad i S, juli.

Medoria anthracina Meig. 2 ex. på aspblad i en liten dunge vid N, $\frac{7}{8}$.

Muscidae.

Graphomyia maculata Scop. Enstaka ex. på blad i S samt i E, juli, aug.

Morellia simplex Loew. Enstaka ex. flerstädes, juni—aug. — *M. hortorum* Fall. Allm., juni—aug. — *M. œnescens* R. D. Allm. på *Oenanthe* vid H, juli.

Musca domestica L. allm. inomhus. — *M. corvina* Fabr. Sedd på fristående trädstammar vid Sh. — *M. tempestiva* Fall. Allm. på boskapen och på kospillning, juni—aug.

Orthellia cæsarion Meig. Allm. på kospillning.

Mesembrina meridiana L. 1 ex. på blad i S, juli.

Stomoxyx calcitrans L. Allm. på kor.

Hæmatobiamstimulans Meig. Allm. på kor, även på blad.

Lyperosia irritans L. Mycket allm. på kor.

Muscina stabulans Fall. Sedd kring boningshusen. — *M. assimilis* Fall. Enstaka på trädstammar i S. — *M. pubulorum* Fall. På ekstam i skogsbrun, juli. — *M. pascuorum* Meig. På solbelysta bokstammar i S $\frac{1}{2}$, flera ex. på eksav, juli—aug.

Polites lardaria Fabr. Allm. på blad, trädstammar och spillning, juni—aug. *Pseudomorellia abolineata* Fall. Ej sälls. på blad, juni—aug.

Phaonia incana Wied. På blad i S, U-ången, juli. — *P. basalis* Zett. Allm. på rubusblr i S, allm. på ljung och Sedum, juli—aug. — *P. lugubris* Meig. Flera ex. på blad i S, juni. — *P. serva* Meig. Flera ex. på blad i S, juni. — *P. erratica* Fall. Enstaka ex. på blad i S, 1 ex. på gärdesgård i E, juli. — *P. signata* Meig. Rätt allm. på gärdesgård i E, juli — *P. errans* Meig. Som föreg. art. På trädstammar i S och N, 1 ex. på kospillning, juni—aug. — *P. perdita* Meig. Ej sälls. på gärdesgård i E $\frac{25}{5}$, 1 ex. på trädstam i S, juli. — *P. vagans* Fall. 1 ex. på Salix vid O $\frac{31}{7}$. — *P. erronea* Schnabl, 1 ex. på blad i S, 1 ex. på eksav, juli. — *P. fuscata* Fall. På trädstammar i S, enstaka ex., juni—aug. — *P. vittifera* Zett. 1 ex. på bokstam i S, 1 ex. på trädstam i N, aug. — *P. palpata* Stein. Ej sälls. på blad i S och N, 1 ex. på ekblad på hällmark, juli. — *P. pallida* Fabr. Allm. på blad, allm. på bladlusad Salix vid O, allm. på eksav, juli—aug. — *P. scutellaris* Fall. Ej sälls. på blad och trädstammar, juli—sept. — *P. variegata* Meig. På trädstammar i S, juli—aug. — *P. lata* Fall. Enstaka ex. på trädstammar i S, juli—aug. — *P. cincta* Zett. Sälls. på trädstammar i S och N, juni—sept. — *P. setifemur* Stein. Sälls. på ek- och bokstammar i S, juli—aug. — *P. trimaculata* Bouché. 2 ex. på liggande linden i N, $\frac{27}{7}$. — *P. crinipes* Stein. På eksav vid foten av ekar, även på blad samt på gångstig med »solfläckor» i S, slutet av juni.

Alloeostylus simplex Wied. Ej sälls. på trädstammar i S, aug.

Lasiops semicinereus Wied. Ej sälls. på blad i S, juni, juli. — *L. hirsutulus* Zett. Som föreg. juni.

Drymeia hamata Fall. Ej sälls., aug.

Hydrotæa dentipes Fabr. Allm., även på Orskär, juni—sept. — *H. similis* Meade. Enstaka ex. på blad i S, juli. — *H. palæstrica* Meig. 2 ex. på rubusblad i S, juli. — *H. occulta* Meig. Ej sällsynt $\frac{25}{5}$. — *H. pilipes* Stein 2 ex. på fläder med bladlöss i S $\frac{9}{7}$. — *H. albipuncta* Zett. Ej sälls. i E, t. ex. kretsande i lä vid buskar, juni, juli. — *H. armipes* Fall. 1 ex. på blad i E, juli. — *H. irritans* Fall. Mycket allmän överallt på ör. Kan under varma dagar vara rätt besvärande. — *H. parva* Meade. 2 ex. bland Psamma vid Sh, juni, aug. — *H. glabricula* Fall. Denna lilla art ses ej sällan på kläderna, oftast i E, slutet av juni, juli.

Ophyra leucostoma Wied. Kretsande under trädgrenar vid Kapellhamn och S, juli.

Fannia canicularis L. Inomhus, även funnen på Orskär. — *F. scalaris* Fabr. På trädstammar i S och N, juli. — *F. difficilis* Stein. Flera ex. på eksav i S $\frac{6}{8}$. — *F. manicata* Meig. På trädstammar i S, ej sälls. — *F. hamata* Macq. Kretsande under trädgrenar i S. 1 ex. på blad, juni, juli. — *F. fuscula* Fall. 1 ex. på ljungblr i E. 1 ex. på blad i S, juli, aug. — *F. coracina* Loew. 1 ex. på blad i S, $\frac{6}{8}$. — *F. armata* Meig. Mycket allm. kretsande under träd, även allmän på Anthriscus och på bladlusangripen sälg vid O, maj—juli. — *F. nodulosa* Ringd. 1 ex. på blad i S, juni. — *F. ærea* Zett. Ej sälls. på sälg vid O, juli. — *F. subumbrosa* Ringd. 1 ex. i N, $\frac{7}{7}$. — *F. polychæta* Stein. Allmän kretsande under träd, juli—sept. — *F. sociella* Zett. Allm. på Anthriscus vid Sh, $\frac{6}{8}$. — *F. similis* Stein. 1 ex. på blad i S $\frac{11}{7}$. — *F. serena* Fall. S. på blad, juni. — *F. postica* Stein. O på Salix $\frac{19}{7}$. — *F. parva* Stein. På ekblad på hällmark, 1 ex. på rubusblad i S, aug.

Hebecnema umbratica Meig. På kospillning, aug. — *H. vespertina* Mall. (nec Fall). 1 ex. på bokstam i S, H, juli. — *H. vespertina* Fall. På blad i S och N, juni—sept. — *H. nigricolor* Fall. Enstaka ex. i N på blad och kospillning, juli—aug.

Mydöea pagana Fabr. På blad och kospillning, aug. — *M. tincta* Zett. 1 ex. på blad i S. — *M. urbana* Meig. På blad och kospillning, aug. — *M. electa* Zett. 1 ex. på blad i S, ¹/₇.

Myiospila meditabunda Fabr. På kospillning i E, aug.

Helina lucorum Fall. Enstaka ex. här och var på ön, juni—sept. — *H. annosa* Zett. Sällsyntare än föreg., på blad i S. — *H. latitarsis* Ringd. Ej sälls. på Anthriscus vid Sh, ¹/₆, O, N, juli—aug. — *H. obscurata* Meig. Juncusförsumpning i E, H, juli—aug. — *H. impuncta* Fall. På blad i S, O på sälg, juli, aug. — *H. depuncta* Fall. Som den föreg. — *H. consimilis* Fall. På gärdesgård i E, ej sälls., ⁶/₇. — *H. lasiophthalma* Macq. 1 ex. på blad i S, ¹⁹/₆. — *H. pubescens* Stein. Hanar ej sällsynta på blad i S, på sälge vid O, slutet av juni, juli. — *H. pertusa* Meig. Ej sälls. på bokstammar i S samt på eksav, juni—sept. — *H. fratercula* Zett. På enbuskar i E, ej sälls., ⁶/₇. — *H. maculipennis* Zett. U-ängen ²²/₇. — *H. calceata* Rond. 1 ex. i E, ⁶/₆. — *H. parcepilosa* Stein, 1 ex. på gärdesgård i E ²⁷/₇. — *H. quadrum* Fabr. På bokstammar i S, aug. samt på eksav. — *H. duplicata* Meig. O på sälge, aug. — *H. duplaris* Zett. Enbuskar i E, S på blad, O på sälge, juli—aug. — *H. quadrimaculata* Fall. Ej sälls. på fristående trädstammar i N, juni, juli. — *H. allotalla* Meig., allm. i H och i kärr, juli—sept.

Azelia gibbera Meig. O på sälge, juli. — *A. aterrima* Meig. På Anthriscus vid Sh, på bokstammar i S, juli. — *A. zetterstedti* Rond. 1 ex. på blad i S, juli.

Limnophora notata Fall. Allm. på stenar i H, Kapellhamnsbukten på dy, juni, juli. — *L. denigrata* Meig. Ej sälls. på blad i S och N, juni, juli. — *L. dispar* Fall. Ej sälls. i E och O, juli. — *L. surda* Zett. U-ängen, juni, juli. — *L. litorea* Fall. U på ävja, juli. — *L. contractifrons* Zett. O ¹⁹/₇. — *L. aerea* Fall. U-ängen, Kapellhamnsbukten på dy, juli. — *L. vana* Zett. 1 ex. på Psamma vid Sh, ¹⁶/₈. — *L. baltica* Ringd. 1 ex. tillsammans med den föreg. — *L. humilis* Zett. 1 ex. i O, ¹⁶/₇.

Pseudocoenosia longicauda Zett. O ⁷/₇.

Lispa tentaculata Deg. Vid vattenhålor på strandklippor, juli, Kapellhamnsbukten. — *L. litorea* Fall. Vid lagun på nordöstra sidan av ön, till största delen uttorkad samt med tjock ävgegryta vid sidorna, på dy vid Kapellhamnsbukten, ej sälls., juli. — *L. loewi* Ringd. Tillsammans med föreg. art på förstnämnda lokal ³⁰/₇. — *L. uliginosa* Fall. På samma lokaler som de båda föregående samt i U-ängen, H och på Orskär, juli—aug. — *L. pygmæa* Fall. H, O, juni, juli.

Lispocephala alma Meig. U på ävja ⁷/₇. — *L. erythrocerca* R. D., H, juli, aug.

Fucellia maritima Hal. Allm. längs stränderna samt på Orskär. — *F. fucorum* Fall. Ehuru ej antecknad från ön förekommer den utan tvivel där, då den är vanlig på havsstranden i nordvästra Skåne.

Anthomyia pluvialis L. E, H, även på Orskär, juli.

Pegomyia præpotens Wied. 1 ex. på blad i N ¹⁴/₈. — *P. virginea* Meig. Noch S, ej sälls. på blad, O på Salix. — *P. silacea* Meig. 1 ex. i S på fläder, 1 ex. i U-ängen, juli, aug. — *P. hyoscyami chenopodii* Rond. Bland Atriplex på stranden, allmän, även på Orskär, juni, juli. — *P. bicolor* Wied. På bokstam i S — *P. nigritarsis* Zett. På rubusblad i S, juli. — *P. transversa* Fall. Ej sälls. kretsande under trädgrenar i S och N samt på bokstammar, juli. — *P. winthemi* Meig. Flera ex. på blad i S, juli. — *P. rufipes* Fall. På ekblad i skogsbyr, juli. — *P. tenera* Zett. 1 ex. på eksav, ⁶/₈.

Eustalomyia histrio Zett. På trädstammar och högre stubbar i S, flerstädes, juni—sept. — *E. hilaris* Fall. 1 ex. på trädstam, 1 ex. på gärdesgård i S, slutet av juni. — *E. vittipes* Zett. 1 ex. på blad i S, ¹⁹/₆.

Acroptena divisa Meig. H, bland Phragmites på Orskär, juli—aug. — *A. ambigua* Fall. H, juli—sept. — *A. wierzejskii* Mik. Ej sälls. i H, U-ängen, juli, aug. — *A. caudata* Zett. Allm. på gängstig i S, juni, juli, H ²⁷/₈. — *A. annulata* Pand. 1 ex. på gängstig i S ⁶/₇.

Hydromyia conica Wied. Allm. maj—aug.

Hylemyia strigosa Fabr. Allm. — *H. variata* Fall. Ej sälls. på blad i S, E,

juli. — *H. variabilis* Stein. 1 ex. i S, $\frac{6}{8}$. — *H. lasciva* Zett. 1 ex. på blad i S $\frac{9}{7}$. — *H. latipennis* Zett. Flera ex. i S och vid Sh på blad, juni. — *H. floralis* Fall. På högre gräs i skogsbyrnen, Orskär, flera ex. på vass, juli. — *H. tristriata* Stein. På blad i S, N, H, juni, juli. — *H. lamelliseta* Stein. Flera ex. på Calamagrostis vid Kohallen $\frac{12}{8}$ s. — *H. criniventris* Zett. Allm. på blad i S, ekblad på hållmark, eksav, juli—aug. — *H. coarctata* Fall. S på blad, Sh på Psamma, Orskär, juni—aug. — *H. nuda* Strobl. På gärdesgård och ljungtbl i E, U-ängen, juli—aug. — *H. tarsifimbria* Pand. H, $\frac{7}{7}$. — *H. fusciceps* Zett. På gärdesgård i E, H, Orskär, juni, juli. — *H. florilega* Zett. Ej sälls. på torrare ställen. — *H. candens* Zett. På sandmark, juni, juli. — *H. fugax* Meig. Ej sälls. på blad, även på Orskär, juni, juli. — *H. meadei* Kow. 1 ex. på gärdesgård, 1 ex. på blad i S, juli. — *H. cinerella* Fall. Allm. på stenar i gräsmark på norra delen av ön, på gärdesgård i E, juni, juli. — *H. pratensis* Meig. På blad vid Sh, juni. — *H. longula* Fall. På gräsmark, juni—aug. — *H. intersecta* Meig. Kretsande under grenar i skogsbyrnen, juli. — *H. exigua* Meade. 1 ex. på blad i S, juni. — *H. latipalpis* Stein. 1 ex. på blad i S $\frac{15}{8}$ s. — *H. pullula* Zett. På blad i S, Orskär på vass flera ex., juli.

Pycnoglossa flavipennis Fall. 1 ex. på Örnbräken, aug.

Prosaplia silvestris Fall. På blad i S, juli.

Coenosia tigrina Fabr. 1 ex. på blad i S, H, juli—aug. — *C. intermedia* Fall. På blad i N, juli. — *C. trilineella* Zett. H, juli, aug. — *C. mollicula* Fall. O på Salix, H, juli, aug. *C. decipiens* Meig. Ej sälls. på gräsmark och strandäng, aug. — *C. geniculata* Fall. Ej sälls. på strandäng, juli, aug. — *C. tricolor* Zett. 1 ex. på Anthriscus vid Sh, juni.

Dexiopsis lacteipennis Zett. E på gärdesgård, O på Salix, juni, juli. — *D. minutalis* Zett. 1 ex. på Psamma vid Sh, juli.

Schoenomyza litorella Fall. Allm. på strandäng, aug.

Scopeumatidae.

Cordylura aberrans Beck. Ej sälls. i H, juli, aug.

Parallelomma albipes Fall. S på blad, juni.

Cnemopogon apicalis Meig. 2 ex. i H, aug.

Megaphthalma pallidula Fall. På blad i S, N, U, juli—aug.

Chaetosa punctipes Meig. Allm. i H och O, juli—sept.

Spathiophora hydromyzina Fall. 2 ex. på Orskär på vass.

Norellisoma spinimana Meig. 1 ex. på Orskär, juli.

Coniosternum obscurum Fall. H $\frac{7}{7}$.

Scopeuma stercorarium L. Allm., även på Orskär. — *S. lutarium* Fabr. E på ljungtbl. — *S. squalidum* Meig. 1 ex. i S på blad, juli. — *S. suillum* Fabr. På strandäng samt i H och O, juli—aug. — *S. scybalarium* L. 1 ex. på strandäng, 1 ex. i O, aug. — *S. litoreum* Fall. Mycket allm. på havsstranden, även på Orskär, juli—aug.

Conopidae.

Physocephala rufipes Fabr. Flera ex. på Lythrumbl vid Sh, $\frac{24}{7}$.

Conops quadrifasciata Deg. 1 ex. i skogsglänta i S.

Coelopidae.

Fucomyia frigida Fabr. Allm. på tång.

Heteromyza buccata Fall. Allm. på tång, Orskär på vass, juli, aug.

Coelopa pilipes Hal. Havsstranden $\frac{6}{8}$.

Orygma luctuosa Meig. Troligen ej sälls. bland tång.

Cypselidae.

Cypselia equina Fall. E, juli. — *C. vitripennis* Meig. E, juli.
Limosina limosa Fall. H, U på ävja, juli—aug.
Sphaerocera subsultans Fabr. E, juli.

Dryomyzidae.

Dryomyza flaveola Fabr. På blad i S och N, juni, juli, ej sälls.
Neuroctena anilis Fall. På blad i S och på eksav, aug.

Clusiidae.

Clusia flava Meig. På trädstubbar och blad i S, juni, juli.
Clusiodes albimana Meig. Ej sälls. på bokstubar i S, juni. — *C. ruficollis* Meig. 1 ex. på bokstubbe i S, juli.

Helomyzidae.

Suilla lœvifrons Loew. På blad i S, juli, aug. — *S. fuscicornis* Zett. 1 ex. i N, juli. — *S. bicolor* Zett. På blad i N aug. — *S. notata* Meig. På blad i S och N, juli. — *S. pallida* Fall. På blad i N, juli. — *S. variegata* Loew. 2 ex. på blad i N $\frac{14}{8}$.

Spanoparæa ruficornis Meig. På blad i N, juli.
Amoebaleria cæsia Meig. 1 ex. i O $\frac{16}{7}$.
Tephrochlamys flavipes Zett. 1 ex. på blad i S, juni. — *T. tarsalis* Zett. 1 ex. på en ekgren i S, juli.

Sciomyzidae.

Melina annulipes Zett. Allm. på alla murkna bokstubar i S, juni, juli. — *M. dorsata* Zett. H, U, juli—aug. — *M. pallidiventris* Fall. På blad i S, H, juli—aug. — *M. nana* Fall. O, juli. *Dichrochira nigrimana* Meig. H, aug.

Ditænia grisescens Meig. Orskär, juli. — *D. schönherrii* Fall. Kärrmark i E, aug.

Tetanocera elata Fabr. På blad i S, U-ängen, juli—aug. — *T. ferruginea* Fall. U-ängen flera ex. H, juli—aug. — *T. robusta* Loew. 1 ex. i H, aug. — *T. unicolor* Loew U-ängen juli.

Dictya umbrarum L. O, juli.
Trypetoptera punctulata Scop. S, E, juni—juli.
Elgiva albisetæ Scop. Juncuskärr i E, juli—aug. — *E. lineata* Fall. U-ängen, O, H, juli—aug.
Limnia unguicornis Scop. U-ängen, N, aug.
Sepedon sphægeus Fabr. O, H, juli—aug.

Lauzanidae.

Minettia longipennis Fabr. På blad i S, juli. — *M. lupulina* Fabr. På blad i S, juli. — *M. fasciata* Fall. U-ängen, H, E, juli.
Sapromyza basalis Zett. U på blad, juli. — *S. rorida* Fall. På blad i S, juli. — *S. pallidiventris* Fall. På blad och stamar i S, juni, juli. — *S. decempunctata* Fall. 1 ex. på blad i S, juni. — *S. illota* Loew. S på blad, juni. — *S. ?hyalinata* Meig. På blad i S, juni.

Lonchaeidae.

Palloptera parallela Loew. E, juli. — *P. trimaculata* Meig. 1 ex. på Angelica silvestris vid Sh, juli. — *P. umbellatarum* Fabr. 1 ex. på blad i S, juli.
Lonchaea chorea Fabr. På bokstubbe i S, H, juli.

Ortalididae.

Ortalis urticæ Fall. H, aug—sept.
Meliera crassipennis Fabr. Flera ex. i H, juli.
Tanypeza longimana Fall. På rubusblad i S, juli.

Tephritidae.

Euphranta connexa Fabr. På rubusblad i skogsbyn vid N samt på blad vid klipphäll, juli.

Phillophylla heraclei L. 1 ex. på rubusblad i S, juli.

Euribia leontodontis Deg. På rubusblad i S, juli. — *E. ruralis* Loew. På ljungtbl i E, aug.

Ensina sonchi L. E, aug.

Myolio cæsio Harr. 1 ex. på blad i S, juli.

Oxyna elongatula Loew. På ljungtbl i E, Orskär, juli—aug.

Zonosema alternata Fall. På rubusblad i S och N, juli.

Terellia serratulæ L. På Cirsium lanceolatum i E, juli.

Sepsididae.

Sepsis incisa Strobl. E, juli. — *S. punctum* Fabr. H, juli.

Nemopoda cylindrica Fabr. U, N, juli.

Enicita annulipes Meig. U-ängen, O, juli.

Themira putris L. Otroligt allm. på ävja, även på Orskär, juli. — *T. minor* Hal. O, juli. — *T. germanica* Duda. 1 ex. i H $\frac{1}{2}/8$.

Piophila casei L. Inomhus, juli.

Megamerina loxocerina Fall. På rubusblad i S, på ekblad i skogsglänta, juli—aug.

Tylidae.

Trepidaria cothurnata Panz. N, juli. — *T. cibaria* L. N, juli.

Psilidae.

Loxocera ichneumonea L. Ej sälls. på blad i S, juli—aug. — *L. elongata* Meig. På blad i S, juli.

Chyliza annulipes Macq. På blad i S, juli.

Chloropidae.

Meromyza pratorum Meig. Gräsmark, juli.

Melanum laterale Hal. Som föreg.

Cetema cereris Fall. Som föreg.

Diplotoxa ruficeps Zett. Som föreg.

Epichlorops puncticolis Zett. Som föreg.

Elachiptera cornuta Fall. Som föreg.

Siphonella oscinina Fall. Som föreg.

Notonaulax cincta Meig. Som föreg.
Oscinella frontella Fall. Som föreg.

Ephydriidae.

- Notiphila cinerea* Fall. U-bukten på ävja, H, juli. — *N. riparia* Meig. H, juli.
 — *N. dorsata* Stenh. O, juli.
Dichæta caudata Fall. O, H, juli—aug.
Hecamede albicans Meig. Allm. på sandmark, juli.
Hydrellia griseola Fall. H, N, juli.
Ephydria riparia Fall. Allm. i vattenhålor i strandklippor och på Orskär, juli.
Cænia fumosa Stenh. Vid strandhålor, U-bukten på ävja, H, juli—aug. —
C. palustris Fall. H, aug.
Scatella stagnalis Fall. Allm. i buktarna på ävja, H, juli—aug.
Lamproscatella dichæta Loew. Orskär, juli.

Drosophilidae.

- Amiota alboguttata* Wahlb. Flera ex. på eksav, E på ljungblr, aug.
Scaptomyza apicalis Hardy. På blad i N, juli.
Parascaptomyza graminum Fall. Orskär, juli.
Drosophila funebris Fall. Inomhus, juli. — *D. obscura* Fall. På eksav, aug. — *D. phalerata* Meig. På bokstam i S, aug. — *D. fenestrarum* Fall. På bokstam i S, aug.
Microperiscelis annulata Fall. 1 ex. på bokstam i S, juli.

Geomyzidae.

- Diastata unipunctata* Zett. 1 ex. på gräsmark, juli.
Opomyza germinationis L. E på ljungblr, U-ängen, juli—aug. — *O. florum* L. U-ängen, N, juli.
Geomyza combinata L. E på ljung, aug.
Anthomyza pallida Zett. U, juli.
Trixoscelis frontalis Fall. Orskär, juli.

Chamaemyiidae.

- Chamæmyia juncorum* Fall. E på kärrmark, Orskär, juli.

Agromyzidae.

- Odinia maculata* Meig. På skivling på bokstam i S, juli.
Agromyza spirææ Kalt. O, juli.
Ophiomyia ?pinguis Fall. På blad i S, juli.
Dizygomyza iræos Gour. U-ängen, juli. — *D. capitata* Zett. U-ängen, juli.
 — *D. geniculata* Fall. O, juli.
L. ?flaveola Fall. N, juli. — *L. ?pectoralis* Mall. N, juli.
Phytomyza rufipes Meig. E på ljungblr, aug. — *P. ranunculi* Schr. E, aug.
 — *P. patricornis* Meig. Orskär, juli.
Cerodonta denticornis Panz. E, aug.

Hippoboscidae.

- Ornithomyia avicularia* L. Inomhus, juli.

Vad arternas ekologiska natur beträffar, har jag i det följande endast uppräknat de arter, som äro mera utpräglat xerophila eller hydrophila och av mesofila endast de arter, som vanligen vistas på trädstammar. Eristalis-arterna m. fl. syrphider söka som imagines sin näring i biotoper av skilda slag under det larverna uppehålla sig i vatten. De äro här upptagna i den hydrofila gruppen. Övriga, ej uppräknade arter, äro nog de flesta mer eller mindre mesofila eller ubiquister.

Xerophila.

(De mera utpräglade sandarterna ha utmärkts med en *.)

<i>Gonyptes guttiventris</i>	<i>Erynnia ocyptera</i>
» <i>cylindrica</i>	<i>Micropalpus vulpinus</i>
* <i>Philonicus albiceps</i>	<i>Peleteria nigricornis</i>
<i>Lasiopogon cinctus</i>	* <i>Atractochæta angustata</i>
* <i>Anthrax paniscus</i>	* <i>Aphria longirostris</i>
<i>Pthiria pulicaria</i>	<i>Wagneria nigrans</i>
* <i>Thereva annulata</i>	<i>Helina parcepilosa</i>
» <i>subfasciata</i>	* <i>Dexiopsis lacteipennis</i>
» <i>bipunctata</i>	» <i>litoralis</i>
<i>Medetera diadema</i>	<i>Hylemyia coarctata</i>
<i>Sciopus contristans</i>	» <i>nuda</i>
<i>Paragus tibialis</i>	» <i>fusciceps</i>
<i>Pipizella vires</i>	» <i>florilega</i>
<i>Allophora pusilla</i>	» <i>tarsifimbria</i>
<i>Rhodogyne rotundata</i>	* » <i>candens</i>
<i>Ocyptera interrupta</i>	» <i>variata</i>
<i>Sarcophaga striata</i>	» <i>variabilis</i>
» <i>melanura</i>	» <i>cinerella</i>
» <i>tuberosa</i>	» <i>longula</i>
» <i>teretirostris</i>	» <i>pullula</i>
<i>Angiometopa ruralis</i>	<i>Euphranta connexa</i>
<i>Sarcophila latifrons</i>	<i>Ensina sonchi</i>
* <i>Miltogramma punctatum</i>	<i>Trixoscelis frontata</i>
<i>Metopia campestris</i>	<i>Meromyza pratorum</i>
» <i>leucocephala</i>	<i>Melanum laterale</i>
* <i>Sphecapata conica</i>	<i>Cetema cereris</i>
<i>Macronychia polyodon</i>	<i>Epichlorops puncticollis</i>
<i>Dinera grisescens</i>	<i>Siphonella oscinina</i>
<i>Nemorilla floralis</i>	<i>Oscinella frontella</i>

Hydrophila.

I. Havsstrands- Brackvattens- och Strandängsarter:

<i>Rhamphomyia maculipennis</i>	<i>Hydrophorus balticus</i>
<i>Hilara lundbecki</i>	» <i>præcox</i>
<i>Dolichopus nubilus</i>	<i>Porphyrops consobrina</i>
» <i>sabinus</i>	<i>Syntormon pallipes</i>
» <i>signifer</i>	<i>Campsicnemus armatus</i>
» <i>clavipes</i>	<i>Eristalis Æneus</i>
<i>Hygrocoleuthus latipennis</i>	» <i>sepulcralis</i>
» <i>diadema</i>	<i>Chersodromia difficilis</i>

<i>Helophilus trivittatus</i>	<i>Scopeuma litoreum</i>
<i>Limnophora aerea</i>	<i>Fucomyia frigida</i>
» baltica	<i>Coelopa pilipes</i>
<i>Lispa litorea</i>	<i>Orygma luctuosa</i>
» loewi	<i>Heteromyza buccata</i>
<i>Fucellia maritima</i>	<i>Cænia fumosa</i>
» fucorum	<i>Ephydria riparia</i>

2. *Hydrophila* arter även förekommande inuti landet:

<i>Hilara gallica</i>	<i>Platychirus clypeatus</i>
» maura	» tarsalis
» <i>interstincta</i>	<i>Pyrophæna rosarum</i>
» <i>discoidalis</i>	» granditarsa
» <i>cornicula</i>	<i>Neoascia floralis</i>
<i>Stilpon graminum</i>	» podagrifica
<i>Dolichopus lepidus</i>	<i>Eristalis intricarius</i>
» <i>atripes</i>	» <i>tenax</i>
» <i>vitripennis</i>	» <i>cryptarum</i>
» <i>claviger</i>	» <i>arbustorum</i>
» <i>nigricornis</i>	» <i>horticola</i>
» <i>migrans</i>	» <i>rupium</i>
» <i>plumipes</i>	<i>Helophilus pendulus</i>
» <i>wahlbergi</i>	» <i>hybridus</i>
» <i>pennatus</i>	» <i>afbinis</i>
» <i>popularis</i>	» <i>lineatus</i>
» <i>nitidus</i>	<i>Myiatropa florea</i>
» <i>simplex</i>	<i>Tropidia scita</i>
» <i>ungulatus</i>	<i>Cinxia borealis</i>
<i>Hercostomus rothi</i>	<i>Musidora tristis</i>
» <i>nigripennis</i>	» <i>lutea</i>
» <i>angustifrons</i>	<i>Sarcophaga sinuata</i>
» <i>metallicus</i>	<i>Macquartia tenebricosa</i>
» <i>ærosus</i>	<i>Graphomyia maculata</i>
<i>Poecilobothrus nobilitatus</i>	<i>Phaonia incana</i>
<i>Hydroporus bipunctatus</i>	<i>Helina allotalla</i>
<i>Thrypticus bellus</i>	» <i>latitarsis</i>
<i>Rhaphium longicorne</i>	<i>Limnophora notata</i>
<i>Porphyrops elegantula</i>	» <i>dispar</i>
» <i>communis</i>	» <i>denigrata</i>
<i>Xiphandrium fasciatum</i>	» <i>surda</i>
<i>Syntormon tarsatus</i>	» <i>contractifrons</i>
<i>Argyra leucocephala</i>	» <i>litorea</i>
» <i>diaphana</i>	» <i>vana</i>
» <i>magnicornis</i>	» <i>humilis</i>
<i>Campsicnemus scambus</i>	<i>Pseudocoenosia longicauda</i>
» <i>curvipes</i>	<i>Lispa tentaculata</i>
» <i>compeditus</i>	» <i>pygmæa</i>
<i>Sympycnus annulipes</i>	» <i>uliginosa</i>
<i>Schoenophilus versutus</i>	<i>Acroptena divisa</i>
<i>Liogaster metallina</i>	» <i>ambigua</i>
<i>Orthoneura nobilis</i>	» <i>wierzejskii</i>
<i>Chrysogaster chalybeata</i>	» <i>caudata</i>
<i>Platychirus immarginatus</i>	<i>Hylemyia lamelliseta</i>
» <i>manicatus</i>	<i>Coenosia trilineella</i>
» <i>albimanus</i>	» <i>pumila</i>

<i>Coenosia geniculata</i>	<i>Dictya umbrarum</i>
» <i>decipiens</i>	<i>Trypetoptera punctulata</i>
<i>Schoenomyza litorella</i>	<i>Elgiva albisetata</i>
<i>Cordylura aberrans</i>	<i>Limnia unguicornis</i>
<i>Cnemopogon apicalis</i>	<i>Sepedon sphgeus</i>
<i>Norellisoma spinimanum</i>	<i>Meliera crassipennis</i>
<i>Chætosa punctipes</i>	<i>Enicita annulipes</i>
<i>Coniosternum obscurum</i>	<i>Themira minor</i>
<i>Spathiophora hydromyzina</i>	» <i>putris</i>
<i>Limosina limosa</i>	» <i>germanica</i>
<i>Melina dorsata</i>	<i>Notiphila cinerea</i>
» <i>pallidiventris</i>	» <i>riparia</i>
» <i>nana</i>	» <i>dorsata</i>
<i>Ditænia griseascens</i>	<i>Dichæta caudata</i>
» <i>schönherri</i>	<i>Cænia palustris</i>
<i>Tetanocera elata</i>	<i>Scatella stagnalis</i>
» <i>ferruginea</i>	<i>Lamproscatella dichæta</i>
» <i>? robusta</i>	<i>Dizygomyza iræos</i>
» <i>unicolor</i>	<i>Anthomyza pallida</i>

Mesophila arter som mestadels anträffas på trädstammar:

<i>Tachypeza nubila</i>	<i>Muscina pascuorum</i>
<i>Medetera jacula</i>	<i>Phaonia lœta</i>
» <i>apicalis</i>	» <i>cincta</i>
<i>Systemus bipartitus</i>	» <i>vittifera</i>
» <i>pallipes</i>	» <i>fuscata</i>
» <i>leucurus</i>	» <i>trimaculata</i>
<i>Neurogona quadrijasciata</i>	» <i>setifemur</i>
» <i>pallida</i>	» <i>crinipes</i>
<i>Sciopus platypterus</i>	<i>Helina pertusa</i>
<i>Chilosia pagana</i>	» <i>consimilis</i> (på gärdesgårdar)
<i>Ferdinandea cuprea</i>	<i>Fannia difficilis</i>
<i>Brachycoma devia</i>	<i>Eustalomyia histrio</i>
<i>Plesina maculata</i>	» <i>hilaris</i>
<i>Monocheta albicans</i>	» <i>vittipes</i>
<i>Muscina assimilis</i>	<i>Odinia maculata</i>
» <i>pabulorum</i>	<i>Microperiscelis annulata</i>

Mesophila arter som gärna vistas på stubbar:

Chrysopilus lœta, *Zelima lenta*, *Z. sylvarum*, *Clusia flava*, *Melina annulipes*, *Clusiodes albimana*, *C. ruficollis*.

Anmärkningar till några av öns sällsyntare dipterer.

Tabanus miki Brauer. Denna sällsynta bromsart togs i ett hanex., under det honan redan förut tagits i Åsljunga (Ent. Tidskr. 1917 s. 302). Dessa båda ex. äro de enda hittills i vårt land kända. Även i Danmark är den sällsynt.

Chrysophilus lœta Zett. Denna ytterst sällsynta art var, sedan den beskrevs av Zetterstedt 1842 efter ett ex. från Esperöd i sydöstra Skåne,

taget 1818, ej återfunnen i vårt land. De påträffade ex. äro bågge honor. Ej känd från Danmark.

Thereva circumscripta Loew. Sannolikt är *T. ursina* Wahlb. samma art. För Zetterstedt var arten känd från Lappland och Bohuslän. Förf. har emellertid även funnit den i Jämtland, Småland, Skåne och på Öland. Den är lätt att förväxla med *T. plebeja* L.

Rhamphomyia dentipes Zett. Arten har förut av förf. anmälts från Skåne (Ent. Tidskr. 1914 s. 71). Arten är allmännare norrut. Enl. Lundbeck är den mycket sällsynt i Danmark.

Empis prodromus Loew. Ej förut antecknad för Skåne. Svensk Insektafauna uppger Öland och ?Gotland.

Leptopeza sphenoptera Loew. Var ej förut känd från vårt land. I Danmark lär den enl. Diptera Danica vara mycket sällsynt. Arten är lätt igenkännlig på vingarnas diskfält, som är långt och smalt och på prothorax, som är vitpudrad.

Chersodromia difficilis Lundb. Förut känd från Bedinge på Skånes sydkust (Ent. Tidskr. 1935 s. 202).

Neurogona erichsoni Zett. I våra trakter liksom vad fallet är i Danmark synes arten vara mycket sällsynt, och Väderön är den enda lokal, där förf. hittills anträffat den. Zetterstedt kände däremot på sin tid åtskilliga lokaler i s. Sverige mot norr till Uppland.

Dolichopus signifer Hal. Från Skåne kändes denna art förut från Arild (Ent. Tidskr. 1928 s. 182). Ej känd från Danmark.

Hercostomus fulvicaudis Walk. Även denna art är okänd från Danmark. I vårt land endast från ytterligare ett par lokaler i Skåne.

Argyra magnicornis Zett. Märkt nog var denna från Skåne ej förut kända art ej sällsynt på ön sommaren 1939. Att döma av fynd, gjorda i Storlien, kan arten lokalt påträffas rätt talrikt.

Rhaphium longicorne Fall. Ett för ön intressant fynd. Det är eljest en typisk art för våra myrar från Skåne till reg. alpina i de lappländska fjällen. Från Danmark omnämnes den ej av Lundbeck.

Systemus bipartitus Loew, *S. leucurus* Loew och *pallipes* v. Ros. Att påträffa tre arter av detta släkte, vilket av Zetterstedt ej var känd från vårt land, var rätt oväntat. Endast den förstnämnda arten var av mig förut funnen i landet (Ent. Tidskr. 1928 s. 194). Tyvärr lyckades det mig ej, trots ivrigt sökande, att få tag i hannen till någon av arterna, men jag hoppas likväl de äro rätt bestämda. De trenne arterna skilja sig sålunda i honkönet från varandra på följande sätt:

1. 4. ribban bågböjd, mot spetsen starkt närmade sig den 3., antennerna gula, 3. ledens i spetshalvan mer eller mindre svart *pallipes* v. Ros.
- 4. ribban knappt böjd, 3. och 4. parallella, antennerna svarta 2.
2. Baklår vid spetsen tydligt svartbruna, antennborst vitt, 3. antennledens knapp längre än bred *bipartitus* Loew
- Baklår utan begränsad svartbrun fläck, antennborst mörkt, 3. antennleden c:a dubbelt så lång som bred *leucurus* Loew

Campsicnemus compeditus Loew. Arten tillhör liksom *Raphium longicorne* egentligen mossarnas fauna. Den var ej känd för Zetterstedt men har av förf. anträffats såväl i nordligaste Lappland som i norra Skåne. Är ej känd från Danmark.

Schoenophilus versutus Walk. En sällsynt skånsk art, hittills endast känd från några få ställen i provinsen.

Mallota cimbiciformis Fall. Denna präktiga, sällsynta syrphid, av Zetterstedt betecknad som mycket rar, hade jag aldrig förut fått se i naturen. Till utseende och storlek påminner den rätt mycket om den allmänna *Eristalis tenax*, men dess rörelsesätt är helt annorlunda. Den är livligare och mera flyktig och erinrar härvidlag mycket om *Criorrhina asilica*. Den visade sig som nämnts i fyndlistan på rubusblommor men endast i soligt väder samt mycket sparsamt och flög vanligen hastigt från den ena blomman till den andra.

Lophosia fasciata Meig. En karakteristisk tachinid, som Zetterstedt kände från Danmark men ej från Sverige. I Ent. Tidskr. 1937 s. 32 har jag anfört den bland annat från Söderåsen, där jag anträffat den på Angelica vid Skärån.

Acrophaga subalpina Ringd. Allmän i norra Sverige blir arten sällsyntare söderut och i Skåne förekommer den nog mest i skogsbygden. Dock har jag träffat ett ex. även vid Hälsingborg. Ej känd från Danmark.

Macronychia polyodon Meig. Förut endast funnen i Östergötland (Ent. Tidskr. 1937 s. 33). Utom exemplaret från Väderön fann jag ett par ex. i Skäralid på blommor av *Aegopodium podagraria*. Ej känd från Danmark.

Erycia vicina Zett. Var förut ej känd från Skåne. (Ent. Tidskr. 1937 s. 34.)

Parasetigena media Rond. Denna bekanta nunneparasit är förut funnen i landet men troligen ej omnämnd i litteraturen härifrån. I min samling finnes ett ex. från Gualöv i Skåne. Själv har jag funnit den i Pålsjö skog i Hälsingborg, en lövskog med ek, bok, björk m. m. men med grangrupper här och där.

Loewia foeda Meig. En i Sverige sällsynt art, som förut endast var känd i ett ex. från Hälsingborg (Ent. Tidskr. 1937 s. 35).

Admontia amica Meig. (*podomyia* B. B.) Från Skåne endast en lokal känd förut (Ent. Tidskr. 1937 s. 16). I södra Sverige sällsynt i Norrland vanligare.

Trichoparia decorata Zett. Sällsynt art, förut från Skåne endast känd från Lindholmen (Dipt. Scand. s. 6089).

Medoria anthracina Meig. Hittills är denna art inom vårt land endast känd från Väderön. Ej känd från Danmark.

Hydrotæa parva Meade. En av de sällsyntare arterna av släktet, endast funnen i nv. Skåne.

Hebecnema vespertina Fall. och *H. vespertina* Malloch. Den art som

Malloch i sina skrifter kallar *affinis Mall.* är enligt min åsikt den verkliga *vespertina Fall.* I beskrivningen hos Zetterstedt säges, att svängkolvarna äro gulaktiga. Hos Mallochs *vespertina*, båda arterna äro funna på Väderön, äro dessa svartaktiga och härigenom skiljes arterna lätt från varandra. Då Mallochs tydning av Falléns art sålunda torde vara felaktig, föreslår jag här namnet *halterata* n. nom. för *vespertina* Mall.

Suillia variegata Loew. Arten är ej förut funnen i landet. Den igenkännes lätt på sina starkt fläckade vingar, som förutom fläckade tvärribbor även ha en stor kraftig fläck vid spetsen över 2., 3. och 4. ribborna, yttersta vingspetsen med två klara partier, 2. och 3. ribbornas förgreningsställe med svart punkt.

Melina annulipes Zett. Från Skåne förut endast bekant från Helsingborg. Levnadssättet synes vara olikt övriga arters inom släktet, vilka leva på kärrmark. Som nämnts i fyndlistan påträffades i den i skogen allmänt på stubbar, särskilt sådana som voro murkna. I kärrträffades den däremot ej.

Euphranta connexa Fabr. Förut känd från Gotland och Uppland. Då *Cynanchum*, i vars frukter larverna leva, är rätt allm. på ön, är förekomsten av denna vackra art måhända ej så märklig.

Themira germanica Duda. Var förut endast känd från Hälsborgstrakten och från Lappland.

Melanum laterale Hal. Förut inom landet endast känd från Lappland.

Microperis celis annulata Fall. Var förut endast känd från Östergötland och Öland.

Odinia maculata Meig. Var hittills i vårt land sydligast känd från Östergötland.