

Smärre meddelanden och notiser.

Coleopterologiska notiser.

Vid entomologiska insamlingar händer förvisso, att många påträffade arter icke noteras annat än i minnet, då man utgår från, att de äro så väl kända också beträffande utbredning, att ingenting nytt är att meddela. Ett studium af Janssons m. f. Catalogus visar emellertid, att ännu finnas luckor i vetandet om skalbaggnas utbredning. Ett litet bidrag må illustrera det sagda!

Cicindela hybrida L. — Pixbo, Västergötland.

Acilius canaliculatus L. — Boden.

Oeoeptoma thoracicum L. — Karlskrona. Denna art, som ju brukar ströva omkring i skogarna och vistas på avfallsprodukter, exkrement, as o. dyl., anträffades på utsipprande eksaft i Karlskrona. Det var ej mindre än 22 exemplar, som tätt intill varandra sutto på eken i fråga.

Silpha carinata Hbst. — Upsala, Sundryberg, på vägar.

Buprestis haemorrhoidalis Hbst. — Boden på furutimmer.

Lytta vesicatoria L. — Resmo, Öland På syrén 5/6 1942. Ett exemplar.

Oryctes nasicornis L. — Borgholm. En dvärghona i gammal sågspån.

Geotrupes stercorosus Scriba. — Boden. — Denna art, som ju mest påträffas i skogarna, har, synes mig, avtagit liksom övriga arter av släktet sista åren. På Öland t. ex. anträffades den sommaren 1942 nedgrävd i gångar under kospillning på de sandiga lokaler, där tidigare alltid *spiniger* hittades.

Sinodendron cylindricum L. — Boden.

Dorcus parallelipedus L. — Vanlig i ekskog på Öland. Anträffas oftast under barken på ruttna stubbar men har också setts förtära utsipprande eksaft. Uppges vanligen tillhöra bokregionen.

Rhagium mordax De G. — Boden på timmerupplag tillsammans med *inquisitor*.

Rhagium sycophanta Schh. — Denna på Öland så vanliga art uppträder ibland på utsipprande eksaft, på gamla ekar och stubbar, ingalunda bara på färska ekstubbar, som vanligen anges.

Strangalia nigripes De G. — Boden, på *Epilobium angustifolium*.

Necydalis major L. — Boden. Ett exemplar på timmerupplag av blandved.

Acanthoderes clavipes Schrk. — Boden. Vanlig på fällt björktimmer och bland björkved tillsammans med *Saperda scalaris*, *Toxotus cursor* och

Upis ceramboides. *Cursor* uppges vanligen höra hemma i barrskog men åtminstone i Göteborgstrakten uppträder den tillsammans med *meridianus* i lövskog.

Melasoma populi L. — Boden, på asp.

Melasoma tremulae F. — Boden, enstaka exemplar tillsammans med *populi*.

Liliocercis lilii Scop. — Källered, Västergötland.

Attelabus nitens Scop. — Källered, Västergötland.

Barynotes squamosus Germ. — Stora Rör, Öland. Ett exemplar, troligen dessutom en hane.

Folke Kinnmark

Oedemera croceicollis Gyll. återfunnen i Sverige.

Som framgår av sidorna 83 och 115, 116 i E. Tidskr. häfte 1—2 detta år, har jag i en sumpmark i Nora villastad, vid sjön Edsviken N. om Stockholm, återupptäckt denna stora raritet. Det första fyndet, anmält sid. 83 av jägm. Th. Palm, var en enstaka ♂ som P. fann i ett konvolut jag sänt honom och som jag fångat ovetande. På min begäran hade han sedan godheten överlämna exemplaret till Riksmuseum, som förut saknade arten. I somras dök djuret upp ånyo, första gången d. 7/7 i 15 ♂♂ och 4 ♀♀. Det visade sig så småningom, att arten förekom uteslutande på sumpområdet, men blott under högsommaren, och att den gärna satt i älggräsblommor. Medan »säsongen» ännu fortfor hade jag nöjet demonstrera lokalen för jägm. Palm, lektor Lindroth och stud. Landin, som alla funno den lovande. — Detta löfte hade för min del redan infriats i fråga om parasit- och andra steklar. Som exempel må nämnas, att biet *Prosopis Rinki* Gorski ej är sällsynt där, och att jag funnit ichneumoniden *Exochus Fletcheri* Bridg. under 2—3 somrar på ett bestämt ställe, varifrån den nu försvunnit, sedan kor varit utsläppta i den delen av området.

Den sid. 115 nämnda exkursionen till sjön Laduviken företogs egentligen för att eftersöka *Oedemera*'n på dess strand åt Experimentalfältet till, som rätt mycket påminner om Nora-lokalen. Resultatet blev noll, men en tröst var ju fyndet av *Neorhacodes*, en liten egendomlig ichneumonid som är speciell parasit på vår minsta rovstekel, *Spilomena troglodytes* v. d. Ld.

A. Roman.

Rättelse. I min uppsats om *Philonthus Lederi* i häftet 1—2 för 1943 av denna tidskrift bör på sid. 70, raderna 25—26 uppifrån, ordet *addendus* ersättas av ordet *rectangulus*.

Anton Jansson.