

detta har varit en del blandt dessa levande arter nu är släktet borta, det nämnd släktet nästan bara, här är dock upptäckt en annan, nämligen den med särskilt utmärkande alltsammans att se att de nästan endast äldre individer förekommer i den i juli nästan röda stranden vid Åsunden. I äldre åldrar förekommer i den parkerade området ännu flera arter från området.

Macrolepidopterafaunan i Älvkarleby.

Av

HUGO ELIASSON.

(Forts. från årgång 66 sid. 154.)

Tillägg till artförteckningen: *Anarta cordigera* Thnbg. Täml. sälls. på Bm.

Sedan artförteckningen i maj 1945 färdigskrevs, har förekomsten av ytterligare några arter konstaterats inom omr. *Euoxoa cursoria obscura* Stgr. Na. 9/8 1945 i ♀ funnen sittande vid basen av ett *Elymus*-bestånd på det nästan sterila, dimunitiva flygsandsomr. efter havsstranden. (E.) — *Polia glauca* Hb. 12/6 1945 i avflugen ♂ samt juli 1945 larver i kärrkant vid gästrikegränsen. — *Lithophane lamda* F. Larver i antal i juli på *Myrica* såväl vid Bm. som på *Myrica-Carex*-kärr mellan Ä—ö och Båtf. — *Pyrrhia umbra* Hufn. Ä—ö 14/7 1945 i ex. sugande i *Silene*-blommor. (S.) — *Earias chlorana* L. Ä—ö flera larver på *Salix*-buskar första veckan i aug. 1945. (S.) — *Celama confusalis* H.—S. Ö. 10/6 1945 i ♂ på staket. (E.) — *Acanthopsyche atra* L. Samma lokal som *P. glauca* 27/5 1945 i ♂ sittande på stammen av torrfura. (E.) — *Sterrhopteryx hirsutella* Hb. Bm. larver vid håvning 1944. i ♂ kläckt 1945. (S.)

Av intresse att omnämna är också, att ♂♂ av *Ph. grasilinella* och *Fumea casta* under 1945 kläckts ur puppmaterial från omr., att 10-tals *H. amphidamas* i början av juni 1945 flögo på Kmä. och att ingen enda *Colias hyale* observerades under 1945.

Områdets djurgeografiska karaktär.

Ehuru det kunde ha sitt intresse att skärskåda faunans sammansättning ur ekologisk synpunkt, skulle dock en sådan utredning föra allt för långt. Som inledningsvis framhållits kan området trots sin ringa utsträckning uppvisa en mångfald biotoper av skiftande karaktär. Den största rollen för fjärillivet spela lundar och lövängsmarker huvudsakligen förekommande omkring Dalälven och — fastän i mindre grad — vid kusten. Såsom redan Palm påvisat ha områdena kring nedre Dalälven åtskilligt av intresse att bjuda ur entomogeografisk synpunkt. En analys av fjärilfaunan efter de principer Palm följt har därför allt-

sedan han 1942 publicerade sina resultat, framstått som ett önskemål. Härnedan följer en gruppering av områdets macrolepidoptera efter exakt samma grunder, som P. begagnat.

Palm söker på basis av coleopterfaunans sammansättning delvis förklara områdets rel. artfattigdom med en tes, att söder- och norrifrån kommande »invasionstrupper» ännu ej nått området. All sannolikhet talar för, att en sådan förklaring äger giltighet även betr. andra insektordningar. Vad angår macrolep. måste dock framhållas, att antalet arter från omr. är rel. stort (540) eller omkring 55 % av landets. De fjärlarter, som hittills undgått upptäckt, kunna nog icke vara många. Endast från Dalarna känner förf. en liknande lokal inventering av faunan från senare tid. Frendin (1943) nämner för Tunabygden siffran 471. En jämförelse med denna undersökning haltar dock i väsentliga stycken. Ur topografisk och klimatologisk såväl som ur storlekssynpunkt uppvisa områdena rel. stora olikheter. En framtida undersökning av Älvkarlebyomr. kommer kanske att vid jämförelse med den föreliggande kunna klärlägga spörsmålet beträffande pågående invandring till omr. Förmodligen kan man förutsätta, att fjärlarna i stort sett ha möjligheter till tidigare uppnående av sina existensgränser än vad fallet är med de i allmänhet mindre spridningsdugliga coleoptererna. Bortsett från mera regelmässigt uppträdande växlingar i fjärlifaunans sammansättning får man säkerligen utgå ifrån, att vissa arter s. a. s. »komma och gå». Även detta är ett spörsmål, som kan lösas först efter planmässiga studier under lång tid.

Fördelade på de gängse brukade familjegrupperna ter sig materialet på följande sätt: dagfjärilar 64, svärmare 12, spinnare 33, nattfly 204, mätare 187 och övriga 40 arter.

I. Arter med vidsträckt utbredning.

»Till denna grupp räknas sådana arter, som äro utbredda över hela eller större delen av Sverige och övriga nordiska länder. Om deras invandringsvägar kan intet med säkerhet utsägas, enär invandringsstammarna, i de fall de varit två eller flera, redan sammansmält.» (Palm 1942, s. 35.) Till denna grupp räknas 229 arter eller 43 % (Palm 51 %) av områdets samtliga arter. De kunna av utrymmesskäl ej uppagas här.

II. Sydliga arter.

a) »Arter med nuvarande nordgräns inom området, d. v. s. söderifrån invandrade arter, som i Sverige ha en någorlunda jämn utbredning från Skåne till undersökningsområdet och som därjämte förekomma i Danmark.» (Palm 1942, s. 35). Till denna undergrupp om 73 arter ha även medtagits sådana, som — i de flesta fall sporadiskt — äro funna i Gävletrakten och till ungefär samma breddgrad i Dalarna. De upptagas i efterföljande tablå, som även visar deras förekomst i övriga

nordiska länder jämte norra Tyskland. Förekomst i Dalarna markeras med »D» och Gävletrakten med »G». Beträffande förekomsten i Finland har jag följt Grönblom (1936) »Verzeichnis der Gross-Schmetterlinge Finlands . . .» med tillägg av nyfynd publicerade i »Notulae Entomologicae» 1937—1945. För Norges vidkommande har Haanshus (1933) »Fortegnelse over Norges lepidoptera» följts. I övrigt har Nordström (1943) »Förteckning över Sveriges storfjärilar» samt Hoffmeyer-Knudsen (1938) »De Danske Storsommerfugle» tjänat som underlag för uppgifterna. För såväl Finland som Norge avser begreppet »södra» omr. till omkr. 62 breddgraden, »mellersta» ungefär omr. mellan 62—65 och »norra» omr. ovan 65 breddgraden. För många arters vidkommande äro begreppen norra, mellersta och södra något svävande. För en grövre översikt som denna torde det dock ej inverka på totalbilden, om en eller annan arts utbredning blir något för snävt eller rikligt tilltagen.

Artens namn	Förekommer i								Anm.	
	Dann.	norra		Norge		Finland				
		Tyskland	södra	mell.	norra	södra	mell.	norra		
<i>Strymon w-album</i> Knoch.....	+	+	+	+	—	—	—	—	G D	
* <i>Ruralis quercus</i> L.....	+	+	+	+	—	—	—	—	D	
<i>Pygaera anastomosis</i> L.....	+	+	—	—	—	—	—	—	G D	
<i>Orgyia gonostigma</i> F.....	+	+	—	—	—	—	—	—	G D	
<i>Acronycta cuspis</i> Hb.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Craniophora ligustris</i> F.....	+	+	+	—	—	—	—	—	G D	
<i>Euxoa cursoria</i> Hufn.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Rhyacia depuncta</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	G D	
— <i>triangulum</i> Hufn.....	+	+	+	+	—	—	—	—	D	
<i>Triphaena fimbria</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	G D	
<i>Harmodia albimacula</i> Bkh.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Aplecta nebulosa</i> Hufn.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
* <i>Monima stabilis</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
*— <i>pulverulenta</i> Esp.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Hyphilare lithargyria</i> Esp.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Calophasia lunula</i> Hufn.....	+	+	+	+	—	—	—	—	G	
<i>Lithophane socia</i> Hufn.....	+	+	+	—	—	—	—	—	G D	
<i>Xylina exsoleta</i> L.....	+	+	—	—	—	—	—	—	D	
<i>Meganephria oxyacanthae</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
* <i>Griposia aprilina</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
* <i>Dryobotodes protea</i> Bkh.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Amathes macilenta</i> Hb.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
* <i>Cosmia citrago</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Amphipyra pyramididea</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Dipterygia scabriuscula</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	G D	
<i>Parastichtis unanimis</i> Hb.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Trachea atriplicis</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	D	
<i>Ipmorpha retusa</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	G D	
<i>Arenostola fluxa</i> Hb.....	+	+	—	—	—	—	—	—	D	
<i>Pyrinia umbra</i> Hufn.....	+	+	—	—	—	—	—	—	G D	

Artens namn	Förekommer i								Anm.	
	Dann.	norra Tyskland		Norge		Finland				
		södra	mell.	norra	södra	mell.	norra			
* <i>Sarrothripus revayanus</i> Scop.....	+	+	+	—	—	—	+	—	—	
* <i>Hylophilina bicolorana</i> Fussl.....	+	+	—	—	—	—	—	—	—	
* <i>Mormonia sponsa</i> L.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
* <i>Catocala promissa</i> Esp.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
<i>Aethia emortualis</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	—	+	—	D	
<i>Rivula sericealis</i> Scop.....	+	+	+	—	—	—	+	—	D	
<i>Zanclognatha tarsiipennalis</i> Tr.....	+	+	+	—	—	—	+	—	G D	
— <i>nemoralis</i> F.....	+	+	+	—	—	—	+	—	G D	
<i>Herminia cribrumalis</i> Hb.....	+	+	—	—	—	—	+	—	D	
<i>Chlorissa viridata</i> L.....	+	+	+	—	—	—	+	—	G D	
* <i>Cosymbia punctaria</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	—	
<i>Sterrha muricata</i> Hufn.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G	
— <i>biselata</i> Hufn.....	+	+	+	—	—	—	+	—	G D	
— <i>seriata</i> Schrank.....	+	+	+	—	—	—	+	—	G D	
— <i>emarginata</i> L.....	+	+	+	—	—	—	+	—	G D	
<i>Oporinia dilutata</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	—	—	—	—	
<i>Triphosa dubitata</i> L.....	+	+	+	—	—	—	+	—	—	
* <i>Philereme transversata</i> Hufn.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
<i>Cidaria derivata</i> Schiff.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
— <i>cucullata</i> Hufn.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G D	
<i>Eupithecia valerianata</i> Hb.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
— <i>centaureata</i> Schiff.....	+	+	—	—	—	—	+	—	D	
— <i>denotata</i> Hb.....	+	+	—	—	—	—	+	—	D	
— <i>pimpinellata</i> Hb.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
<i>Gymnoscelis pumilata</i> Hb.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G D	
<i>Bapta temeraria</i> Schiff.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G D	
<i>Plagodis dolabraria</i> L.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
<i>Ennomos alniaria</i> L.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G D	
*— <i>erosaria</i> Schiff.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
<i>Phalaena syringaria</i> L.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
<i>Angerona prunaria</i> L.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G D	
<i>Lithina chlorosata</i> Scop.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G D	
<i>Colotois pennaria</i> L.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G D	
<i>Erannis defoliaria</i> Cl.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G D	
<i>Phigala pedaria</i> F.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
<i>Boarmia ribeata</i> Cl.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G D	
*— <i>roboraria</i> Schiff.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
<i>Perconia strigillaria</i> Hb.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G	
* <i>Roselia strigula</i> Schiff.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
* <i>Celama confusalis</i> H.-S.....	+	+	—	—	—	—	+	—	D	
— <i>centonalis</i> Hb.....	+	+	—	—	—	—	+	—	G	
<i>Atolmis rubricollis</i> L.....	+	+	—	—	—	—	+	—	D	
<i>Lithosia deplana</i> Esp.....	+	+	—	—	—	—	+	—	—	
Summa +	73	73	59	8	2	69	14	1		

Av tablån framgår, att nästan alla arterna också förekomma i Finland, där en (*Triphosa dubitata*) även är funnen i norra delen av landet.

I Norge återfinnas ett något mindre antal, men där ha 2 (*Oporinia dilutata*¹, *Gymnoscelis pumilata*²) påträffats i norra delen.

Vid en jämförelse med Palm (1942, s. 40), finner man, att de 14 % som bilda denna undergrupp något bättre motsvara bilden av en sydkontingents nordfront än hans grupp om 18 %. Om man t. ex. ser på tablåns finska siffror ge dessa vid handen, att av gemensamma arter av fjärilar har Finland 14 (20 %) i mellersta delen av landet och 1 art (1 1/2 %) i norra. Av coleoptera är motsvarande tal hos Palm 79 (38 %) resp. 26 (13 %). P. förutsätter själv, att en hel del arter ur hans sydgrupp kunna förväntas rycka ytterligare norrut. Vad det gäller fjärilarna får nog läget i stort sett anses stabilare. En och annan av arterna förekommer väl, fastän ännu upptäckt, längre upp i kustlandet och andra höra till expansionsarterna, som komma att fortsätta sin vandring norrut. De arter, som i första hand kunna tänkas ha sin existensgräns inom omr. (i tablåns markerade genom asterisk) belöpa sig till 16. Som näringsväxter ha de alla ek eller andra växter, som i omr. äga nordgränsen för sin samlade förekomst.

b) »Övriga sydliga arter, vilkas svenska utbredning sträcker sig norr om undersökningsområdet men som genom en tydligt markerad större lucka är skild från samma arters eventuella finska utbredning.» (Palm 1942, s. 41.) Samtliga dessa arter finns också i Danmark och norra Tyskland. De är till antalet 178 och redovisas i nedanstående tablå uppställd efter samma grunder som föregående. Det nordligaste svenska fyndlandskapet har tillika angivits i tablå.

Artens namn	Förekommer i						i Sverige nordligast i		
	Danm.	Norge		Finland					
		norra Tyskland	södra Tyskland	mell.	norra	södra	mell.		
<i>Parnassius apollo</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	-	Ång.
<i>Colias hyale</i> L.	+	+	-	-	-	+	-	-	Hls.
<i>Leptidea sinapis</i> L.	+	+	+	+	-	+	+	-	Vb., Ly. Lpm.
<i>Limenitis populi</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	-	Ång.
<i>Vanessa io</i> L.	+	+	+	-	-	+	-	-	Vb., Lu Lpm.
<i>Melitaea aurinia</i> Rott.	+	+	-	-	-	+	-	-	Hls.
— <i>dictynna</i> Esp.	+	+	+	+	-	+	-	-	Hls.
<i>Mesodryas paphia</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	-	Hls., As. Lpm.
<i>Fabriciana cydippe</i> L.	+	+	+	+	-	+	+	-	Ly. Lpm.
<i>Aphantopus hyperantus</i> L.	+	+	+	+	-	+	+	-	Ång.
<i>Epinephele jurtina</i> L.	+	+	+	+	-	+	-	-	Hls.
<i>Coenonympha arcania</i> L.	+	+	+	-	-	+	-	-	Ång.

¹ Finnes säkert ej i Nordnorge (Nordström).

² Osannolik men möjlig i Nordnorge (Nordström).

Artens namn	Danm.	Förekommer i						i Sverige nordligast i
		norra Tyskland	Norge			Finland		
			södra	mell.	norra	södra	mell.	norra
<i>Pararge maera</i> L.....	+	+	+	+	+	+	+	— Ly. Lpm.
<i>Ruralis betulae</i> L.....	+	+	+	—	—	+	—	— Hls.
<i>Polyommatus amandus</i> Schn.....	+	+	+	—	—	+	+	— Hls.
<i>Augiaades sylvanus</i> Esp.....	+	+	+	+	—	+	+	— Ång.
<i>Urbicola comma</i> L.....	+	+	+	+	—	—	—	— Vb.
<i>Hesperia malvae</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
<i>Nisoniades tages</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	— Jmt.
<i>Sphinx ligustri</i> L.....	+	+	+	—	—	+	—	— Ång.
<i>Smerinthus ocellatus</i> L.....	+	+	+	+	—	+	+	— Hls.
<i>Haemorrhaea tityus</i> L.....	+	+	+	+	—	+	+	— Ång.
— <i>fuciformis</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
<i>Pergesa elpenor</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ås. Lpm.
— <i>porcellus</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
<i>Pheosia tremula</i> Cl.....	+	+	+	—	—	+	+	— Nb.
<i>Epicauta ilicifolia</i> L.....	+	+	+	+	—	+	+	— Ly. Lpm.
<i>Thyatira batis</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	— Jmt.
<i>Arsilonche albovenosa</i> Goeze.....	+	+	—	—	—	+	+	— Nb.
<i>Acronycta aceris</i> L.....	+	+	+	—	—	+	—	— Dlr.
— <i>alni</i> L.....	+	+	+	—	—	+	—	— Dlr.
— <i>tridens</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	+	—	— Hls.
— <i>psi</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	— Vb.
<i>Euxoa tritici</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
<i>Agrotis ypsilon</i> Rott.....	+	+	+	+	—	+	+	— Ång.
— <i>segetum</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
— <i>clavis</i> Hufn.....	+	+	+	—	—	+	+	— Nb.
<i>Opigena polygona</i> Schiff.....	+	+	—	—	—	+	+	— Ång.
<i>Rhyacia subrosea subcoerulea</i> Stgr.....	+	+	+	—	—	+	+	— Vb.
— <i>simulans</i> Hufn.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
— <i>varia</i> Vill.....	+	+	+	—	—	+	+	— Vb.
— <i>dahlii</i> Hb.....	+	+	—	—	—	+	+	— Ly. Lpm.
— <i>brunnea</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	+	+	— Hls.
— <i>baja</i> F.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
— <i>xanthographa</i> Schiff.....	+	+	—	—	—	+	—	— Hls.
<i>Eurois prasina</i> F.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
<i>Orthosia caecimacula</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	+	—	— Hls.
<i>Naenia typica</i> L.....	+	+	+	—	—	+	—	— Ång.
<i>Triphaena pronuba</i> L.....	+	+	+	—	—	+	—	— Jmt.
<i>Actinotia polyodon</i> Cl.....	+	+	+	—	—	+	—	— Ång.
<i>Scotogramma trifolii</i> Hufn.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
<i>Polia contigua</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
<i>Harmodia lepida</i> Esp.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
— <i>bicurvis</i> Hufn.....	+	+	+	—	—	+	+	— Nb.
— <i>conspersa</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	+	+	— n. Ång.
<i>Aplecta advena</i> F.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
— <i>hepatica</i> Cl.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
<i>Tholera popularis</i> F.....	+	+	+	—	—	+	—	— Ly. Lpm.
— <i>cespitis</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
<i>Monima incerta</i> Hufn.....	+	+	+	—	—	+	+	— Ång.
— <i>opima</i> Hb.....	+	+	—	—	—	+	+	— Ång.

Artens namn	Förekommer i								i Sverige nordligast i	
	Dann.	norra Tyskland	Norge			Finland				
			södra	mell.	norra	södra	mell.	norra		
<i>Sideridis conigera</i> Schiff.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Jmt.	
— <i>obsoleta</i> Hb.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Äng.	
<i>Cucullia umbratica</i> L.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Äng.	
— <i>lucifuga</i> Schiff.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Hls.	
<i>Brachionycha nubeculosa</i> Esp.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Nb.	
<i>Bombycia viminalis</i> F.....	+	+	+	+	+	+	+	-	Ly. Lpm.	
<i>Lithophane furcifera</i> Hufn.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Nb.	
— <i>ingrica</i> H.-S.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Nb.	
<i>Calotaenia celsia</i> L.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Hls.	
<i>Eumichtis satura</i> Schiff.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Hls.	
<i>Antitype polymita</i> L.....	+	+	+	-	-	-	-	-	Hls.	
<i>Eupsilia satellitia</i> L.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Hls.	
<i>Conistra vaccini</i> L.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Äng.	
<i>Amathes lota</i> Cl.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Hls.	
— <i>circellaris</i> Hufn.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Äng.	
— <i>helvola</i> L.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Vb.	
— <i>litura</i> L.....	+	+	+	+	-	+	-	-	Hls.	
<i>Stygiostola umbratica</i> Goeze.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Vb.	
<i>Parastichtis monoglypha</i> Hufn.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Nb.	
— <i>obscura</i> Hw.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Äng.	
— <i>secalis</i> L.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Äng.	
<i>Procus strigilis</i> L.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Äng.	
— <i>latrunculus</i> Schiff.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Äng.	
<i>Sidemia fissipuncta</i> Hw.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Äng.	
<i>Euplexia lucipara</i> L.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Ly. Lpm.	
<i>Hoplodrina alsines</i> Brahm.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Jmt.	
— <i>blanda</i> Schiff.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Äng.	
<i>Elaphria selini</i> B.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Nb.	
<i>Petilampa arcuosa</i> Hw.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Äng.	
<i>Gortyna leucostigma</i> Hb.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Äng.	
<i>Apamea lucens</i> Frr.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Dlr.	
<i>Ipmorpha subtusa</i> F.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Dlr.	
<i>Calymnia trapezina</i> L.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Jmt.	
<i>Enargia paleacea</i> Esp.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Hls.	
<i>Phragmitiphila typhae</i> Thnbg.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Äng.	
<i>Eustrotia uncula</i> Cl.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Nb.	
<i>Sarothripus degeneranus</i> Hb.....	+	+	-	-	-	+	-	-	Vb.	
<i>Earias chlorana</i> L.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Hls.	
<i>Hylophila prasinana</i> L.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Hls.	
<i>Catocala fraxini</i> L.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Nb.	
<i>Phytometra bractea</i> Schiff.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Äng.	
— <i>jota</i> L.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Med.	
<i>Polyptychus moneta</i> F.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Äng.	
<i>Abrostola triplasia</i> L.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Äng.	
— <i>tripartita</i> Hufn.....	+	+	+	+	-	+	+	-	Äng.	
<i>Toxocampa pastinum</i> Tr.....	+	+	+	+	-	+	-	-	Med.	
<i>Laspeyria flexula</i> Schiff.....	+	+	+	-	-	+	-	-	Hls.	
<i>Parascotia fuliginaria</i> L.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Dlr.	
<i>Prothymia viridaria</i> Cl.....	+	+	+	-	-	+	+	-	Gstr.	

Artens namn	Förekommer i										i Sverige nordligast i	
	Dann.	norra Tyskland	Norge			Finland						
			södra	mell.	norra	södra	mell.	norra				
<i>Pechipogo barbalis</i> Cl.	+	+	+	-	-	+	+	-			Ång.	
<i>Bomolocha fontis</i> Thnbg.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
<i>Hypena rostralis</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	+			Dlr.	
<i>Schränkia turfosalis</i> Wocke.	+	+	+	-	-	+	+	+			Dlr.	
<i>Jodis lactearia</i> L.	+	+	+	+	+	+	+	+			Ång.	
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> Cl.	+	+	+	-	-	+	-	-			Hls.	
<i>Calothysanis amataria</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	+			Hls.	
<i>Scopula floslactata</i> Hw.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
— <i>immutata</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
<i>Sterha humiliata</i> Hufn.	+	+	-	-	-	+	+	-			Hls.	
— <i>dimidiata</i> Hufn.	+	+	+	-	-	+	-	-			Dlr.	
— <i>inornata</i> Hw.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ang.	
<i>Larentia clavaria</i> Haw.	+	+	-	-	-	+	+	-			Hls.	
<i>Acasis viretata</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
<i>Oporinia christyi</i> Prt.	+	+	-	-	-	+	-	-			Dlr.	
<i>Philereme vetulata</i> Schiff.	+	+	+	-	-	+	+	-			Hls.	
<i>Lygris mellinata</i> F.	+	+	+	-	-	+	+	+			Gstr.	
— <i>pyraliata</i> Schiff.	+	+	+	-	-	+	+	+			Dlr.	
<i>Cidaria ocellata</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
— <i>firmata</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	-			Dlr.	
— <i>siterata</i> Hufn.	+	+	+	-	-	+	+	-			Jmt.	
— <i>lignata</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	+			Med.	
— <i>olivata</i> Schiff.	+	+	+	-	-	+	+	-			Jmt.	
— <i>parallelolineata</i> Retz.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
— <i>bilineata</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
— <i>albicillata</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	+			Dlr.	
— <i>flavofasciata</i> Thnbg.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
<i>Hydrelia flammeolaria</i> Hufn.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
<i>Euchoea nebulata</i> Scop.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ang.	
<i>Asthenia albulata</i> Hufn.	+	+	+	-	-	+	+	-			Hls.	
<i>Eupithecia exigua</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
— <i>venosata</i> F.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ang.	
— <i>goossensiata</i> Mab.	+	+	-	-	-	+	+	+			Ång.	
— <i>castigata</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
— <i>icterata</i> Vill.	+	+	+	-	-	+	+	-			Ang.	
— <i>nanata</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
<i>Chloroclystis chloerata</i> Mab.	+	+	+	-	-	+	+	+			Nb.	
— <i>rectangulata</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
— <i>debiliata</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
<i>Anticollis sparsata</i> Tr.	+	+	+	-	-	+	+	+			Nb.	
<i>Horisme tersata</i> Schiff.	+	+	+	-	-	+	+	+			Med.	
<i>Crocallis elinguaria</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
<i>Epione vespertaria</i> F.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ang.	
<i>Semiothisa alternaria</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	+			Hls.	
— <i>signaria</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
<i>Erannis aurantiaria</i> Hb.	+	+	+	-	-	+	+	-			Dlr.	
<i>Boarmia cinctaria</i> Schiff.	+	+	+	-	-	+	+	+			Vb.	
— <i>repandata</i> L.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ång.	
— <i>jubata</i> Thnbg.	+	+	+	-	-	+	+	+			Ang.	

Artens namn	Förekommer i								i Sverige nordligast i	
	Dann.	norra Tyskland	Norge			Finland				
			södra	mell.	norra	södra	mell.	norra		
<i>Boarmia punctulata</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	+	+	+	Hls.	
<i>Gnophos obscurata</i> Schiff.....	+	+	+	—	—	+	—	—	Äng.	
<i>Siona lineata</i> Scop.....	+	+	+	—	—	+	+	—	Dlr.	
<i>Nola cucullatella</i> L.....	+	+	+	—	—	+	—	—	Äng.	
<i>Cybosia mesomella</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	+	Hls.	
<i>Lithosia lurideola</i> Zinck.....	+	+	+	+	—	+	+	—	Nb.	
— <i>complana</i> L.....	+	+	+	—	—	+	—	—	Nb.	
— <i>lutarella</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	—	Äng.	
<i>Diaphora mendica</i> Cl.....	+	+	+	—	—	+	+	—	Hls.	
<i>Spilosoma lubricipedum</i> L.....	+	+	+	+	—	+	+	—	Äng.	
<i>Coscinia cribaria</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	—	Nb.	
<i>Anthrocera lonicerae</i> Schev.....	+	+	+	+	—	+	+	—	Äng.	
— <i>filipendulae</i> L.....	+	+	+	+	+	+	—	—	Dlr.	
<i>Canephora unicolor</i> Hb.....	+	+	+	—	—	+	+	—	Med.	
<i>Aegeria apiformis</i> L.....	+	+	+	—	—	+	+	—	Äng.	
<i>Bembecia hylaeiformis</i> Lasp.....	+	+	+	+	+	+	+	—	Nb.	
<i>Synanthedon tipuliformis</i> Cl.....	+	+	+	—	—	+	+	—	Nb.	
<i>Heptolus humuli</i> L.....	+	+	+	—	—	+	—	—	Äs. Lpm.	
— <i>sylvinus</i> L.....	+	+	+	—	—	—	—	—	Jmt.	
Summa +	178	178	167	71	18	177	127	7		

I Finland saknas endast en av tablåns arter (*Nisoniades tages*) under det Norge saknar 11. Denna undergrupp upptar ej mindre än 33 % av områdets hela artantal (Palm 16 %) (1942, s. 45). I realiteten torde vår säkerligen allt för bristfälliga kännedom om de nattflygande arternas förekomst i övre Norrlands kustland förorsaka en för hög uppskattning av denna undergrupp, men om denna ev. felprocent är större i fjärligruppen än beträffande skalbaggruppen är ovisst. Utan tvivel markerar denna stora grupp av sydarter — tillsammans 47 % av områdets samtliga arter (Palm 34 %) (1942, s. 45) — att omr. söderifrån erhållit huvuddelen av sin fauna.

III. Nordliga arter.

a) »Arter med nuvarande sydgräns inom omr., d. v. s. norrifrån invandrade arter, som i Sverige ha en någorlunda jämn utbredning från Norrbotten och Lappland till undersökningsområdet och som icke äro funna i Danmark.» (Palm 1942, s. 46.)

Icke någon art, som kan räknas till denna typ, har anträffats inom omr. Palm (1942, s. 46) anger för coleoptera knappt 1 %.

b) »Övriga nordliga arter, vilkas svenska utbredning sträcker sig söder om undersökningsområdet, men som icke finns i Danmark.» (Palm 1942, s. 46.) Hit härföras 17 arter upptagna i efterföljande tablå, som även visar deras sydligaste förekomst i Sverige.

Artens namn	Dann.	Förekommer i						i Sverige sydligast i
		norra Tyskland	Norge			Finland		
			södra	mell.	norra	södra	mell.	norra
<i>Clossiana aphirape ossianus</i> Hbst..	—	(+)	+	—	+	+	+	+
<i>Oeneis jutta</i> Hb.....	—	—	+	+	?	+	+	+
<i>Pararge hiera ominata</i> Krul.....	—	—	+	+	—	+	+	+
<i>Heodes amphidamas lapponica</i> Backh.....	—	(+)	+	—	+	+	+	+
<i>Polyommatus chiron borealis</i> Whlgr.	—	(+)	+	+	+	+	+	Vestm.
<i>Euxoa recussa</i> Hb.....	—	—	+	+	—	+	+	Sk.
<i>Rhyacia alpicola</i> Zett.....	—	—	+	+	+	+	+	Sm.
<i>Aplectoides speciosa</i> Hb.....	+	—	+	+	+	+	+	Sm.
<i>Syngrapha microgamma</i> Hb.....	—	+	+	—	—	+	+	Sm.
<i>Epirranthis diversata</i> Schiff.....	—	+	+	—	+	+	+	Sk.
<i>Cidaria munitata arcticaria</i> Germ.....	—	—	+	+	+	+	+	Sm.
— <i>caesiata</i> Schiff.....	—	+	+	+	+	+	+	Sk.
— <i>luctuata</i> Schiff.....	—	+	+	+	+	+	+	Bl.
— <i>subhastata moestata</i> Nolck.....	—	—	+	+	+	+	+	(Sk.) Upl.
<i>Eupithecia conterminata</i> Zett.....	—	—	+	+	+	+	+	Sk.
<i>Gnophos sordaria</i> Thnbg.....	—	—	+	+	+	+	+	Bl.
<i>Sterrhopteryx hirsutella</i> Hb.....	—	+	+	+	—	+	+	Sm.
Summa +	2	8	17	13	12	17	17	17

Hela det nordliga inslaget i områdets fauna — om man bortser från det som kan rymmas i grupp I — inskränker sig alltså till blott 3 % (Palm 6 % [1942, s. 46]) av samtliga arter. Två arter äro funna i Danmark, men detta har förf. icke ansett böra hindra deras upptagande i gruppen. Beträffande *Cid. caesiata* föreligger nämligen ett enda fynd från norra Jylland 1932, vilket satts i samband med förekomsten i Skandinavien. Samma är förhållandet med de två exx. av *Aplectoides speciosa*, som 1926 erhölls — också i norra Jylland. Denna art förekommer dessutom i Tyskland först i Hartz. I Finland återfinnas samtliga arter genom hela landet, under det Norge endast i södra delen har dem alla. Ej mindre än 15 av gruppens arter äro funna i Småland, 6 ända ned i Skåne. För denna grupp har Palm beträffande skalbaggarna hävdat den nordliga invandringsvägens sannolikhet framför en tolkning av deras förekomst såsom relikter från en tidigt postglacial invandring söderifrån. Beträffande fjärilgruppen torde samma slutsatser gälla. Flertalet — kanske alla — äro att betrakta såsom ostliga i fråga om sin härkomst. Arternas utbredningsbilder ge stöd åt ovannämnda tolkning. Teoretiskt är det naturligtvis möjligt att även tänka sig en ursprungligen sydlig invandring för de arter, som äro kända från Mellaneuropas bergstrakter. Dessa skulle då av vissa orsaker, kanske främst existensekologiska, ha försvunnit från de mellanliggande områden, där de nu saknas.

IV. »*Ostliga arter*, vilkas huvudutbredning är förlagd till östra Europa, stundom också Sibirien, och som i regel icke anträffats i norra Finland eller — i motsatt fall — utan att äga anknytning till den svenska utbredningen.» (Palm 1942, s. 49.) Denna kännetecknas av en tydlig dragning till de östra landskapen i mellersta Sverige. Arterna äro icke anträffade i Danmark (undantag utgöra 3 arter, vilkas medtagande motiveras nedan) och en stor del saknas även i Norge. »Mindre säkra arter inom gruppen ha satts inom parentes och arter, som tagits på Åland, utmärkts med Å.» På denna grupp komma 20 arter eller knappt 4 % redovisade i följande tablå, som även visar »deras utbredning i olika svenska landskap och på kontinenten med särskild hänsyn tagen till Osteuropa och Sibirien.» Palm (1942, s. 50) redovisar för denna grupp 2 %. Det är icke överraskande, att de ostliga invandrarna bland fjärilarna uppvisa dubbelt så hög % som bland skalbaggen. De förra äro ju i regel goda aktiva flygare.

Artens namn	Förekommer i								Utbredning i Sverige	Utbredning i övrigt med sär- skild hänsyn till Osteuropa o. Sibirien
	Dann.	norra Tyskland	Norge		Finland		södra	mell.		
			södra	mell.	norra	södra	mell.	norra		
<i>Pararge aegeria egerides</i> Stgr. ¹	+	+	+	—	—	A	+	—	Sm.-Vrml. och Med.	N., mell. och sydöst. Europa.
<i>Glauopsyche alexis schneideri</i> Strd.	—	+	+	—	—	+	+	—	Sk.-Hls., Jmt., Äng.ejöarna.	Europa, Väst- asien, s. Sibi- rien, Central- asien (Fer- gana), Amur.
<i>Polyommatus nicias Scandicus</i> Whlgr. ¹	—	—	—	—	—	+	+	—	Upl.-Vb. o. Ly. Lpm., Hall.	N. Europa, högalperna, Asien.
<i>Cyclopides silvius</i> Kn. ¹	—	+	+	—	+	+	+	—	Gotl., Upl.- Vb. Vg., n. Vstm., s. Dlr., n. Vrml.	Schlesien, Ryssl., gm Asien.
<i>Odontosia sieversi</i> Mén.	—	—	—	—	—	+	+	—	Sk., Sm., Upl., Vrml., Vstm., Dlr., Hls., Vb.	Schlesien, Galizien, Ryssl., Asien.
<i>Palimpsestis ocularis</i> L.	—	+	—	—	—	+	—	—	Sk., Bl., Ög., Sdm., Upl., Vrml., Hls., Med.	N. och mell. Europa, Spa- nien, Italien, Korsika, Ryssl., Ural.
(<i>Rhyacia cuprea</i> Schiff.)	—	—	+	+	—	Å	+	—	Sk.-Boh. och Vb.	Sv. Tyskland, Schles., Karp., Alp., Ryssl., Ural.

¹ Utbredningskarta i Sv. Fjärilar sid. 49 a.

Artens namn	Förekommer i										Utbredning i Sverige	Utbredning i övrigt med sär- skild hänsyn till Osteuropa o. Sibirien	
	Dann.	norra Tyskland		Norge			Finland						
		södra		mell.		norra	södra		mell.		norra		
(<i>Amphitrota ravidus</i> Schiff.)	-	-	+	-	-	-	A	+	+	-	Sk.-Jmt. och Hls., Vb.	Europa, n. o. mell. Asien.	
(<i>Polia proxima</i> Hb.)	-	-	+	+	-	-	Å	+	+	-	Sm., Gotl., Ög., Vg., Boh., Sdm., Upl., Dlr., Gstr., Hls., Jmt.- Nb.	Schles., Böhm., Alperna, Ryssl., Sibi- rien.	
<i>Parastichtis illyria</i> Frr.	-	-	+	-	-	-	Å	+	-	-	Sk., Bl., Sm., Ög., Vg., Boh., Nrk., Sdm., Upl., Vstm., Dlr., Gstr., Hls., Ang.	*Ryssland*, Mellaneuropas bergsområden (Schweiz, Österr., Ung- ern, n. Italien, Steiermark, Sydbayern, Kroatien).	
<i>Elaphria cinerascens</i> Tngstr.	-	-	+	-	-	-	Å?	+	+	-	Sk., Bl., Boh. och Sm.-Dlr. och Ång.	Ryssl., Asien.	
<i>Cosymbia pendularia</i> Cl.	-	+	+	-	-	-	Å	+	-	-	Gotl., Sm., Vg., Ög., Sdm., Hall., Dsl., Upl., Vstm., Dir., Gstr., Hls.	N. och mell. Europa, Ryssl., Sibi- rien.	
(<i>Scopula incanata</i> L.)	-	+	+	+	-	-	Å	+	+	-	Sk.-Hls. (i alla landskap), Ång.	Europa, Asien.	
<i>Acasis appensata</i> Ev.	-	+	-	-	-	-	Å	+	-	+	Upl.	Bayern till Ural, Sibirien.	
<i>Cidaria latefasciata</i> Strg.	-	-	+	-	-	-	Å	+	+	-	Sm.-Ång., Öl., Gotl., Hall.	Estland, Lenin- gradomr., syd- östra Sibirien.	
— <i>otregiata</i> Met.	-	-	+	-	-	-	Å	+	+	-	Sk., Sm., Vg., Nrk., Sdm., Upl., Vstm., Vrml., Dlr., Gstr., Hls.	Eurupa, öst. Asien.	
(— <i>taeniata</i> Steph.)	-	+	+	-	-	-	Å	+	+	-	Sk.-Vb. Ås. Lpm.(ej Hall., Hrj.).	N. och ö. Eu- ropa, Alperna (lokal).	
(<i>Venusia cambrica</i> Curt.)	+	-	+	+	?	+	+	+	-	-	Sk.-Ly. Lpm.	Europa, Asien.	
<i>Hypoxystis pluvialis</i> F.	-	+	-	-	-	-	Å	+	+	+	Upl., Lappl.	Centraleuropa, Asien.	
(<i>Gnophos myrtillata</i> Thnbg.)	+	-	+	+	-	-	Å	+	-	-	Sk.-Ång., Ås. Lpm.	Europa, Asien.	
Summa +		3	9	15	5	1	20	14	2				

Som framgår av tablån saknas 5 av arterna i Norge. För *Pararge aegeria egerides*, som förekommer i D., räknar jag med, att den från Hls. till Sm. förekommande stammen ej sammanhänger med den danska — och numera skånska (Ander 1941). Beträffande de två övriga från D. i några få fynd noterade arterna gäller, att de sakna sammanhängande förbindelse med sydligare stammar. Förekomsten i D. kan därför tolkas som sporadiska utlöpare av den skandinaviska stammen. Att de i D. skulle vara »köldrelikter» är icke troligt.

Hälften av gruppens arter äro tagna på Åland. Palm har utförligt motiverat en tänkt invandring via Åland och i vissa fall också möjlingen via Kvarken för denna ostliga grupp. För att ta en extrem typ ur fjärilgruppen, kan man peka på *Hypoxystis pluviaria*. Arten finnes i hela Finland och är åtminstone ställvis talrikt förekommande (Lingonblad 1944). I nordöstra Uppland är den ej heller ovanlig. Fyndet från »Lappl.» är 100 år gammalt och har tydlig sammankoppling med den finska utbredningen. Om arten fortfarande förekommer i norra Sverige är ovisst, men med tanke på, att den i Finland förekommer ännu nordligare, är det ej uteslutet. Under förutsättning att arten verkligen saknas i landet i övrigt (bortsett från Upl.), och den saken torde åtminstone beträffande delen Sk.—Ång. vara sannolikt, förefaller teorin om invandring till Upl. via Ålandsöarna som den mest hållbara. Beträffande *Acasis appensata* är förhållandet i stort sett detsamma. Arten uppträder endast mycket sparsammare — i vårt land enbart känd från Älvkarleby. Den förekommer också på Åland. I Ent. Tidskr. (1946, sid. 62) har förf. påvisat den ostliga invandringsvägens sannolikhet för en annan av gruppens arter, *Odontosia sieversi*. Intet hinder borde föreligga för en inrangeering av tabellens övriga arter i en grupp, som österifrån invandrat till vårt område via de lämpligaste passagerna över Östersjön och Bottniska viken, Ålands hav resp. Kvarken. När det gäller de arter, som i vårt land ha en rel. vidsträckt utbredning, kan man dock ej värlja sig för tanken, att luckan i norr runt Bottniska viken kan vara skenbar. Men gruppens dagfjärilar torde näppeligen ha undgått upptäckt, därest de funnits i Nb. Detta förhållande stärker på sätt och vis trovärdigheten av de övriga arternas kända utbredningsbild. Avtagande frekvens för flertalet arter i norra och södra delen av utbredningsområdet kan lika väl bero av invandringshistoriska skäl som av existensekologiska. Många av arterna ha under det senaste halvseklet betydligt vidgat sitt område. Detta förhållande torde dock i flertalet fall vara liktydigt med upptäckts- snarare än spridningshistoria.

Av tillfälliga invandrare ha följande 5 arter ertappats inom omr.: *Pyrameis atalanta*, *P. cardui*, *Acherontia atropos*, *Herse convolvuli* och *Macroglossa stellatarum*.

V. Föga kända arter.

Kvar står nu en rest om 18 arter (3 %), som ej nöjaktigt kunnat placeras i tidigare anförda grupper. De flesta äro sällsynta. Många äro

(på grund av sitt levnadssätt?) föga observerade, exempelvis *Nonagria maritima*. Till denna kategori kunna även hänföras *Eupithecierna: inturbata, immundata, actaeata, trisignaria* och *innotata*. Sannolikt kunna alla de nämnda hänföras till sydliga invandrare (enl. tab. II a.); *maritima* dock möjlig ostlig. I tab. II b. synes *Brephos notha* närmast höra hemma. *Lemonia dumi*, *Crymodes rubrirena*, *Nothopteryx polycommata*, *Nola karelica* och *Phalacropteryx grasilinella* visa hän på ostlig härstamning. Med undantag för *dumi* och *polycommata* kan här tänkas såväl nordlig som ostlig invandring. *Cucullia lactucae* uppfattas av Wahlgren (1923, s. 199) som en kontinental art, vars nordiska förekomst ges reliktkaraktär. Arten saknas i D. men upptäcktes på Åland 1943. Den finnes också i Ostbalticum. Ostlig eller sydostlig invandrare? *Procus minimus* är känd endast från Sm., Öl., Gtl., Vg. och Upl. Hos oss liksom i de övriga Östersjöländerna är arten sällsynt och bunden till »varma» lokaler. Kanske en värmetsidsrelikt invandrad från sydost. En något likartad förekomst äger också *Zygaena romeo*. Om nordlig invandring erinrar *Acanthopsyche atra*, om sydlig *Talaepora tubulosa*. *Isturga carbonaria* slutligen visar i sin förekomst en lucka (skenbar?) Hls.—Vb. och artens förekomst i Sydsverige är tvivelaktig. I Finland äger arten sammanhängande utbredning över hela landet. Möjlig ha vi här två skilda stammar: en nordlig med den finska sammanhängande och en sydlig numera i Sydsverige till en del av ekologiska skäl utgången stam.

Sammanfattningsvis kan Älvkarlebyområdets macrolepidopterfauna sägas bestå av följande element:

Ett »utbrett» med inom hela Norden spridda arter omfattande 43 % (Palm 51 % [1942, s. 57]) av samtliga;
 ett sydligt omfattande 47 % (Palm 34 %), av vilka 14 % (Palm 18 %) f. n. ha sin kända nordgräns inom landet i området;
 ett nordligt till 3 % (Palm 6 %) uppgående;
 ett ostligt omfattande knappt 4 % (Palm 2 %).

Beträffande en grupp om 3 % av områdets arter kan intet med bestämdhet utsägas om deras invandringsvägar. De representera sannolikt såväl det nordliga som sydliga, möjlig också ostliga elementet i faunan.

Föreliggande försök till geografisk analys av Älvkarlebyområdets fjärilfauna gör naturligtvis icke anspråk på att vara uttömmande. Där har för övrigt tagits hänsyn enbart till vissa av de faktorer, som vi få räkna med i detta sammanhang. Varje sådan utredning vilar dock på lös grund, därest icke de utbredningsuppgifter — framför allt från vårt eget land — vi begagna som underlag, komma så nära de faktiska som det överhuvud är möjligt. Att så långt ifrån ännu är fallet, trots att fjärilarna under relativt lång tid ägnats omfattande studier, torde vara visst. Mycket skulle här kunna vinnas om lepidopterologerna plan-

mässigt ginge in för faunainventering inom geografiskt sett särskilt betydelsefulla men ännu tämligen utforskade trakter. Som en sådan torde i hög grad låglandet i övre Norrland få betraktas. Men även i Mellansverige finnas vissa biotoper, som säkerligen tarva grundligare undersökning. Av egen erfarenhet skulle jag vilja peka på våra mossar — en biotop som det just här blir allt svårare att träffa i ursprungligt skick. Det gäller därför att handla, medan tid ännu är.

Till exkursionskamraten under otaliga fångstfärder, folkskolläraren A. N. Sandén, vars insats vid utforskandet av Älvkarlebyområdets fjärilfauna varit av oskattbart värde, framför jag mitt hjärtliga tack. För värdefull medverkan, icke minst genom kritisk granskning av manuskriptet, tackar jag dr F. Nordström och jägmästaren Th. Palm.

Litteraturförteckning.

- Almquist, E. 1929: Upplands vegetation och flora. Uppsala. — Ander, Kj. 1936: Några fjärilfynd jämte anknytande djurgeografiska reflektioner. Opusc. Entomol. Lund. — 1941: Fänologiska och djurgeografiska anteckningar om syd- och västsvenska fjärilfynd. Ibidem. — Aurivillius, Chr. 1888—91: Nordens fjärilar. Stockholm. — Eliasson, H. 1946: Odontosia sieversi Mén. i Fennoskandia. Ent. Tidskr. — Frendin, H. 1943: Lepidopterogeografiska iakttagelser i Tunabygden. Ibidem. — Grönblom, T. 1936: Verzeichnis der Gross-Schmetterlinge Finnlands... Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn. Helsingfors. — Haanshus, K. 1933: Fortegnelse over Norges lepidoptera. Norsk entomol. tidskr. Oslo. — Hansson, E. (opubl. manus.) Macrolepidoptera från Film och Dannemora socknar. — Hoffmeyer, S. og Knudsen, S. 1938: De danske Storsommerfugle. Köpenhamn. — Lingonblad, B. 1944: Bidrag till kännedom om Vasa-nejdens fjärilsfauna. Arkiv för svenska Österbotten. Vasa. — Nordman, A. F. 1942: Till kännedom om fjärilfaunan i ett landområde i det centrala Skärgårdshavet i SW-Finnland. Mem. Soc. Fauna et Fl. Fenn. Helsingfors. — Nordström, F. 1931: Dysstroma Hb. (Cidaria Tr.), infuscata Tgstr. och latefasciata Stgr. i Sverige. Ent. Tidskr. — 1943: Förteckning över Sveriges storfjärilar. Opusc. Entomol. Lund. — och Wahlgren, E. 1935—41: Svenska fjärilar. Stockholm. — Palm, Th. 1942: Coleopterafaunan vid Nedre Dalälven. Ent. Tidskr. — Spuler, A. 1908: Die Schmetterlinge Europas. Stuttgart. — Wahlgren, E. 1923: Cucullia lucifuga Hb. och lactucae Esp. i Sverige. Ent. Tidskr. — Öslund, R. (opubl. manus.) Förteckning över Gävle-trakten macrolepidoptera.