

## En ny art av släktet *Solieria* R. D. (Diptera: Tachinidae).

Av

O. RINGDAHL.

I min översikt av svenska tachinider i denna tidskrift 1945 hft. 4 har jag på sid. 204 upptagit *Solieria tibialis* v. Ros. efter ex. från Jämtland. Från början var jag ganska tveksam vid bestämningen av detta fynd inte minst på grund av den nordliga förekomsten och tillika inne i fjällvärlden. Arten är nämligen förut nordligast känd från Danmark.

För att kunna erhålla säkert bestämda exemplar av nämnda art vände jag mig till den berömde engelske dipterologen Mr. J. E. Collin i Newmarket, som var vänlig nog att sända mig ♂♂ av arten i fråga. Vid granskningen visade det sig genast, att de svenska exemplaren ej överensstämde med dessa och omöjligt kunde tillhöra *tibialis*, trots att denna art synes kunna variera rätt betydligt i fråga om benens och palpernas färg.

Då jag ej kunnat finna någon annan art på vilken beskrivningen passar in, förmodar jag, att de jämtländska ex., som jag tagit vid Undersåker i reg. sylvatica på blommor av *Salix pentandra*, representera en hittills obeskriven art, som jag nedan kallat för *borealis* och som i ♂-könet skiljes från *tibialis* genom följande kännetecken:

### *Solieria borealis* n. sp.

Etwas breitere Art, Kopf mehr in gelbliches ziehend, Stirn von vorn gesehen nur schwach bestäubt, schwärzlich, Thorax dünn bestäubt, besonders hinten deutlich glänzend, Hinterleib recht stark glänzend, Hinterleibsringe mit ± deutlichen Mittelborsten, Ocularzilien sehr lang, ohne kürzere Zwischenborsten, Flügel an der Basis deutlich gelb, Schüppchen gelblich, I. Hinterrandzelle an der Spitze etwa so weit offen wie die Länge der kleinen Querader (wahrscheinlich nicht konstant).

### *Solieria tibialis* v. Ros.

Langgestreckte Art, der ganze Kopf, Thorax und Schildchen dicht hellgrau bestäubt, Hinterleib kaum glänzend, ohne Mittelborsten, Ocularzilien mässig lang und mit kürzeren Borsten intermischt, Flügelbasis nicht gelb, Schüppchen weiss, I. Hinterrandzelle am Rande meistens geschlossen?