

Nya fynd av holometopa flugor.

Av

O. RINGDAHL.

I det följande omnämnes ett 70-tal arter Diptera av olika familjer inom gruppen *Muscidae acalypterae*. Av dessa äro 15 ej förut kända från landet. De övriga utgöras av sådana arter, som förut ej äro antecknade från de anförda landskapen.

Platystomatidae.

Homalocephala albitalis Zett. Förut var denna art känd sydligast från Östergötland. Förf. har dock anträffat den även i norra Skåne vid Åsljunga och Arkels-torp. Dessutom har jag funnit den i Småland vid Bolmen och i Jämtland vid Åre. Det synes vara den vanligaste av våra Homalocephalaarter, som väl i allmänhet äro ganska sällsynta, och förekommer gärna i sällskap, t. ex. på döda aspar och popplar, där de springa omkring med viftande vingar.

H. apicalis Wahlb. Öl: Färjestaden på ett verandafönster 3/7 46.

H. bipunctata Loew. Nb: Luleå 14/7 17 1 ex. Arten dessutom känd från Abisko.
Rivellia syngenesiae Fabr. Gtl: Visby på strandäng.

Trypetidae.

Orellia falcata Scop. Hjd: Tännndalen 24/7 38 1 ex. Arten var hittills nordligast känd från Uppland.

Sphenella marginata Fall. Öl: Byerum 5/7 46. Vid Hälsingborg har jag tagit den så sent på hösten som 1/10.

Tephritis bardanae Schr. Sm: Ålem 11/7 46 1 ex.

T. conura Loew Sk: Skäralid, Hall: Laholm, Jtl: Undersåker, Åre (reg. sylv.), maj—okt.

Lonchaeidae.

Psilolonchaea albiceps Mall. Denna för faunan nya art har jag anträffat på Gotland vid Persnäs, i Jämtland vid Undersåker och Åre (reg. sylv.) samt i Lappland vid Abisko (reg. subarkt.).

Lonchaea Deutschi Zett. Arten var förut känd Lpl-Upl, men förf. har påträffat den längre söderut såsom i Småland vid sjön Bolmen och i Skåne i Skäralid, maj—sept.

L. palposa Zett. Sm: Bolmen 27/6 43.

L. peregrina Beck. Sk: Hälsingborg, Sm: Bolmen, juli—aug., sälls. Ny för Sverige.

Earomyia lonchaeoides Zett. Sk: Bökeberg på vedstaplar 28/4 42.

Spermatoronchaea nigra Meig. Arten är enligt Svensk Insektafauna möjlig på-

träffad av Zetterstedt i Lappland och på Gotland. Av förf. är den tagen i Skåne: Helsingborg, Ängelholm, Hallands Väderö, Ringsjön och Arkelstorp, Sm: Ålem, Jtl: Åre (reg. sylv.), Lpl: Abisko (reg. subarkt.), Nuolja (reg. arct.), juni—sept. *Chaetolonchaea dasyops* Meig. Sk: Helsingborg, Ängelholm, Mölle, Arild, Båstad, Hall: Tylösand, maj, juni.

Eurygnathomyia bicolor Zett. 1 ex. påträffat under hävning bland videbuskar på stranden av Åresjön, 22/6 34.

Sepsidae.

Sepsis simplex Goethg. et Bast. Sk: Råå ängar, juli, aug. Ny för Sverige.

S. ciliforceps Duda Gtl: Klintehamn 27/7 20 1 ex. Ny för Sverige.

Nemopoda pectinulata Loew Sk: Helsingborg, Ringsjön, Arkelstorp, Sm: Bolmen, Jtl: Undersåker, Åre (reg. sylv.), Nb: Övertorneå, juni—sept., allm.

Meroplus stercorarius R. D. Sm: Markaryd, maj—sept.

Protoschemira albitalvis Zett. Denna sällsynta art, tidigare funnen av mig i Jämtland och på Gotland (Ent. Tidskr. 1934 s. 3) har jag även funnit i Småland vid Bolmen, där ett ex. togs på hästspillning på en landsväg 25/6.

Pandora scutellaris Fall. Gtl: Persnäs i en ogräsvall på blommor av Chrysanthemum leucanthemum, maj—aug.

Piophilidae.

Piophila varipes Meig. Sm: Bolmen på ett fågelkadaver, Gtl: Klintehamn.

Psilidae.

Psila obscuritarsis Loew. Denna för vår fauna nya art tillhör undersläktet *Tetrapsila* Frey och skiljs från övriga särskilt genom antalet skutellarborst, som är 4, under det alla andra arter ha 2. F. ö. liknar den till färgen vår största art, den allmänna *fimetaria* och är endast obetydligt mindre än denna. Sk: Helsingborg, Jtl: Undersåker och Åre (reg. sylv.).

P. limbatella Zett. Sk: Båstad, Skälerviken och Råå på strandängar, Gtl: Klintehamn, juni—aug.

Loxocera fulviventris Meig. Var förut endast känd från s. Sv. (Sk-Upl) men är förf. även funnen i Undersåker (reg. sylv.).

L. sylvatica Meig. Synes övervägande ha en nordligare utbredning men är av förf. även funnen i östra Småland vid Sandbäckshult 9/7 46.

Chyliza leptogaster Panz. Sk: Helsingborg, Arkelstorp, Öl: Vickleby. Sällsyn-
tare än *annulipes* Macq.

Strongylophthalmyia ustulata Zett. Sk: Fagerhult.

Sciomyzidae.

Ditaeniella grisescens Meig. I Svensk Insektafauna uppges endast Skåne för denna art. Den är dessutom av mig funnen i Småland, Öland, Jämtland (Frösön) samt på Gotland, juni—aug.

Oxytaenia brunnipes Meig. Förut endast känd från Lappland. Har påträffats den i Jämtland i Undersåker (reg. sylv.) samt i Skåne, varför arten sannolikt är utbredd över hela landet, juni—aug.

Antichaeta analis Meig. Det enda ex. jag anträffat, avviker något från gängse beskrivningar, i det mesonotum är nästan helt mörk och abdomen utan det stora uppsvällda, rödgula hypopyget rent svart, Jtl: Undersåker (reg. sylv.).

Ectinocera borealis Zett. Sk: Ängelholm, maj, juni.

Limnia fumigata Scop. Sk: Åhus 28/7 10 1 ex.

Dryomyzidae.

Dryomyza decrepita Zett. Arten, som är ganska vanlig i norra och mellersta Sverige, var hittills känd söderut till Ög. Men den förekommer ända ned till Skåne, där jag funnit den i Skäråns dalgång på Söderåsen, juni—aug.

Lauxaniidae.

Meiosimyza platycephala Loew Sk: Hälsingborg 31/8 1 ex. Ny för Sverige.
Homoneura notata Fall. Bl: Mörrum 17/8 1 ex.

Helomyzidae.

Chaetomus confusus Wahlgr. I en sammanställning över helomyzider jag påträffat i nv. Skåne, huvudsakligen i Hälsingborgstrakten (Opusc. Entom. 1944 s. 18) saknas ifrågavarande art. Sedermera har jag nog så överraskande funnit den även här i Pålsgö skog, juni—aug. Förut var den mig bekant endast från Hjd och Jtl.

Trichoscelis frontalis Fall. Sm: Bolmen, juli.
T. obscurella Fall. Gtl: Fårön 5/7 36.

Clusiidae.

Paraclusia tigrina Fall. Denna stora, präktiga, lätt igenkännliga art är sällsynt. Den var förut ej känd från Skåne, men jag har ett par gånger tagit enstaka ex. i den förut nämnda Skäråns dalgång, där jag fångat den på liggande murkna trädstammar, 11/8, 1/9.

Clusiodes apicalis Zett. Hjd: Tänndalen, Jtl: Undersäker, Gaddede.

C. pictipes Zett. 1 ex. funnet vid Tärnaby i Lpl. Den var förut endast känd från Sk.

C. caledonica Collin Sk: Ängelholm 12/8 1 ex. Ny för Sverige. Den är lik *albimanus* Meig., från vilken den säkrast skiljs på hypopyget.

Acartophthalmus bicolor Oldenb. Sk: Arkelstorp, Sm: Bolmen på ett fågelkada-ver, juni, juli. Arten är förut ej antecknad för vårt land. Den skiljs från den närliggande *nigrinus* Zett. på vingens framkant, som särskilt mot spetsen är brunaktig, och på pannan, som framtill är gul.

Opomyzidae.

Geomysa Hendeli Czerny Sk: Hallands Väderö 6/8 34 1 ex. En mycket liten art, 2 mm, med korta och mycket smala vingar och glänsande svart bakkropp. Ny för Sverige.

Tethinidae.

Pelomyia cinerella Hal. Sk: Skälderviken 29/6 1 ex. Ny för Sverige.

Tethina cinerea Loew Sk: Hälsingborg 28/5 1 ex., Hall. Tylösand ej sällsynt på flygsandsstrand 28/6. Ny för Sverige.

Drosophilidae.

Stegana Strobli Mik. En av våra egendomligaste flugor. Där den långsamt kryper fram på en trädstam med de svartaktiga vingarna tätt liggande över bakkroppen erinrar den längt mera om en skalbagge än en fluga. Men söker man gripa den med fingrarna, flyger den kvickt bort, och kanhända först då märker man misstaget. Flugan, som är sällsynt, träffas gärna på bokstammar eller upplagda vedstaplar. I Pålsgö skog i Hälsingborg har jag under flera år kunnat iakttaga den på ett gammalt sjukt bokträd — nu nedsågat — där den alltid visade sig på samma

ställe, krypande omkring längs en svart strimma i barken. Alla ex. jag insamlat har varit honor. Skäralid är en annan lokal för arten. Vid sjön Bolmen i Småland tog jag ett ex. med helt svartfärgad thoraxrygg och skutell. Hos huvudformen är mesonotum så gott som helt gulröd, juni—sept.

S. coleoptrata Scop. Sk: Åsljunga, Sm: Bolmen, Hjd: Tänndalen, Jtl: Gäddede, juni—aug.

Leucophenga maculata Duf. Denna prydliga art har jag fångat i Skäralid i Skäråns dalgång, där man kan få se den på skuggiga ställen sittande på undersidan av trädgrenar, maj—aug.

Chymomyza nigrimana Meig. Sk: Hälsborg, Jtl: Åre (reg. sylv.) maj—okt.

Phortica variegata Fall. Öl: Borgholm 1 ex. 10/7 33.

Drosophila phalerata Meig. Sk: Hälsborg, Väderön, Skäralid, Ringsjön, ej sälls. på säriga ekar, juni—okt.

Drosophila macularis Villen. Sk: Hälsborg 2 ex., april, maj. Ny för Sverige.

D. Buscki Coqu. Sk: Höör 1 ex. 15/8 45 på trädsvamp. Ny för Sverige.

D. immigrans Sturtev. Sk: Hälsborg sept, okt. Ny för Sverige. Arten tillhör ett särskilt undersläkte, *Spinulophila* Duda, karakteriserat av en rad mycket korta, tätställda borst på framlärets undersida.

Diastatidae.

Diastata nebulosa Fall. Jtl: Undersåker i reg. sylv. 3/7 25 1 ex.

Tryptochaeta punctum Meig. Sk: Skäralid, Hälsborg, aug, sept.

Ephydriidae.

Notiphila annulipes Stenh. Sm: Markaryd, Bolmen, Jtl: Åre (reg. sylv.) Nb: Övertorneå, Lpl: Gällivare, juli, aug.

N. uliginosa Hal. Sm: Bolmen, Öl: Borgholm, Nb: Luleå, Piteå, maj—aug.

N. brunnipes R. D. Sm: Markaryd.

N. venusta Loew Gl: Visby, 2 ex. på strandäng, juni, juli. Ny för Sverige.

Discocerina pulicaria Hal. Sk: Hälsborg, maj—aug.

Hydrina flavipes Fall. Jtl: Vallbo 15/7 35.

Hyadina nitida Macq. Sk: Hälsborg, maj.

Scatophila caviceps Stenh. Sk: Skälderviken, aug.

Parhydra coarctata Fall. Jtl: Undersåker i reg. sylv.

P. fossarum Hal. Nb: Piteå.

P. aquila Fall. Jtl: Åre (reg. sylv.).

Cordyluridae.

Scatophaga maculipennis Ringd. Arten, som beskrevs efter ex. från Dalarna, har sedermera anträffats även i Västerbotten vid Bodarna (leg. Heqvist).