

önskemål, att även *Staphyliniderna*, trots J. P. Johansen's »Danmarks Rovbillers» (1914) likaledes bleve föremål för en modärn bearbetning av Victor Hansen.

Så återstår endast att begrunda, hur en Højesteretsdommer med dagen fylld av maktpåliggande ämbetsuppgifter kan finna tid att producera vetenskaplig entomologi av högsta kvalitet, och därtill att vara en sällskaplig och hjälpsam människa. Förmodligen har han vant sig av med att sova.

Carl H. Lindroth.

## Smärre meddelanden och notiser.

### Om spridningen av *Antherophagus nigricornis* Fbr.

Intill Älta, söder om Stockholm, undersökte jag i början på juli 1947 ett stort bestånd Umbellater, som växte intill en bergknalle. Marken var något fuktig med riklig vegetation; runtom växte hassel och sälg. På en av blommorna fick jag se en humla, *Bombus terrestris*, som satt ovanligt stilla med tillbakalagda vingar i vilande ställning. Försiktigt tog jag humlan i vingarna för att titta närmare på den. Den visade inte några som helst livstecken och för att se om den företedde några yttre skador började jag undersöka den mera ingående. Då fick jag på sugsnabeln se en stor, avlång, gul klump, som vid närmare påseende visade sig vara en skalbagge. Med en sticka började jag försiktigt peta bort skalbaggen och förpassade den kvickt ned i eterröret.

Vid bestämning av skalbaggen visade det sig vara *Antherophagus nigricornis* Fbr. Detta, att skalbaggen hade klamrat sig fast vid en humla har tidigare iakttagits av en fransman vid namn Perris. Den hade då klamrat sig fast vid en humlas (*Bombus montanus*) antenn. Då *A. nigricornis* utvecklas och lever i humlebon på exkrementer och annat avfall, kan man kanske dra den slutsatsen, att skalbaggen efter det den svärmat, uppsöker de blommor, där humlorna söker sin näring, klamrar sig fast vid en humla och på så sätt blir buren till humleboet, där den lägger sina ägg.

Arne Jädergård.

### *Pipiza austriaca* Meig. in Schweden.

Ein Weibchen dieser Art wurde in Ryssby, Kronobergs län, Südschweden von C. B. Gaunitz am 11/7, 1922 gefunden. Die braunschwarzen Flügel-flecke sind gross und deutlich hervortretend. Körperlänge 10 mm. *Pipiza austriaca* Meig. ist nicht früher aus Schweden bekannt. In Dänemark ist die Art selten nach Angabe von Lundbeck in *Diptera Danica*.

Sven Gaunitz.