

För Medelpad nya skalbaggar (Coleoptera)

TOR-ERIK LEILER & PER PRÜTZ

Leiler, T.-E. & Prütz, P.: För Medelpad nya skalbaggar (Coleoptera). [Beetles new to the province of Medelpad (Coleoptera).] – Ent. Tidskr. 98:132 (1977). Lund, Sweden 10 December 1977. ISSN 0013-886X.

A list of 58 species of beetles new to the province of Medelpad collected by the authors on 11–15 July 1977 near the mouth of the river Indalsälven is given. One of these, *Bledius litoralis* Heer, is reported for the first time from Sweden.

T.-E. Leiler, Sörgården 135, S-186 00 Vallentuna, Sweden
P. Prütz, Karlskronavägen 17, S-121 52 Johanneshov, Sweden

Vid ett besök vid Indalsälvens mynning den 11–15 juli i år fann vi nedanstående 58 för Medelpad nya skalbaggar, av vilka en, *Bledius litoralis* Heer, är ny för landet. Efter varje art ges insamlingslokalen enligt följande: (F.)= Fagervik, (L.)= Lögdö, (Lj.)= Ljustorp och (S.)= Sörberge.

Bembidion litorale Ol. (L., Lj.), *lunatum* Dft. (L.), *virens* Gyll. (Lj.) nykläckta ex., *Platambus maculatus* L. (Lj.), *Amphicyllis globus* F. (L.), *Ptilolum croaticum* Matth. (Lj.), *Omalium brevicolle* Th. (S.), *Mannerheimia divergens* Mäkl. (Lj.), *Thinobius praetor* Smet. (Lj.) tidigare funnen i Vs, Nb, Pi, *Bledius litoralis* Heer (L., Lj.) i efter översvämningar med tunt lerlager belagda sandrevlar rätt långt från vattenlinjen. Ny för Sverige. *Gabrius exspectatus* Smet. (Lj.), *Philonthus politus* L. (S.), *Quedius pseudolimbatus* A. Str. (L.), *Mycetoporus aequalis* Th. (L.), *Conosoma marshami* Steph. (Lj.), *Oligota pusillima* Gr. (L.), *Hygronoma dimidiata* Gr. (S.), *Notothecta flavipes* Gr. (L.), *Atheta basicornis* M. & Rey (F.), *Rybaxis longicornis* Leach (S.), *Platysoma*

frontale Payk. (Lj.), *Dolichosoma lineare* Rossi (Lj.), *Hylecoetus dermestoides* L. (Lj.), *Hypolithus rivularis* Gyll. (L.), *Pheletes aeneoniger* De G. (S.), *Throscus carinifrons* Bouv. (L.), *Heterocerus intermedius* Kies. (L.) tidigare funnen Sk., Gtl., Nb., *Pocadius ferrugineus* F. (S.), *Triplax aenea* Schall. (Lj.), *Dacne bipustulata* Thbg. (F.), *Micrambe bimaculata* Panz. (L.), *Cryptophagus quercinus* Kr. (Lj.), *Atomaria fimetarii* Hbst. (F.) i antal i *Coprinus comatus*, längd 1,5–2,5 mm, *Atomaria fuscicollis* Mnh. (L.), *Cerylon deplanatum* Gyll. (L.), *Anisosticta 19-punctata* L. (S.), *Ernobius mollis* L. (L.), *Rhinosimus planirostris* F. (Lj.), *Notoxus monocerus* L. (L.), *Scaphidema metallicum* F. (L.), *Judolia sexmaculata* L. (L.), *Aromia moschata* L. (L.), *Xylotrechus rusticus* L. (Lj.), *Saperda carcharias* L. (Lj.), *Haltica oleracea* L. (S.), *Apion gyllenhali* Kby. (S.), *hookeri* Kby. (L.), *seniculus* Kby. (S.), *spencei* Kby. (L.), *Dorytomus taeniatus* F. (L.), *Anthonomus pomorum* L. (L.), *rubi* Hbst. (S.), *Cryptorrhynchus lapathi* L. (L.), *Rhynchaenus populi* F. (L.) nordligaste fyndet av arten, *Hylurgops glabratus* Zett. (Lj.), *palliatius* Gyll. (Lj.), *Polygraphus poligraphus* L. (Lj.), *punctifrons* Th. (Lj.).